

# Antigua y Barbuda

## 2009 – Hoja resumida de resultados

La GSHS de **Antigua y Barbuda**, en el 2009, midió el consumo de alcohol; las conductas alimentarias; el consumo de drogas; la higiene; la salud mental; la actividad física; los factores protectores; las conductas sexuales; el consumo de tabaco; la violencia y daños no intencionales .

En la GSHS de Antigua y Barbuda, en el 2009, se encuestaron estudiantes en los grados de formación 1<sup>o</sup>-4<sup>o</sup> y los grados 7<sup>o</sup>-9<sup>o</sup>. El diseño de la muestra fue por conglomerados en dos etapas para producir datos representativos de todos los estudiantes en los grados de formación 1<sup>o</sup>-4<sup>o</sup> y los grados 7<sup>o</sup>-9<sup>o</sup> en Antigua y Barbuda. En la primera etapa se seleccionaron las escuelas con una probabilidad proporcional al número de estudiantes matriculados. En la segunda etapa, se seleccionaron las clases al azar y todos los estudiantes en las clases seleccionadas fueron invitados a participar. La tasa de respuestas de las escuelas fue de un 95%, la tasa de respuestas de los estudiantes fue de un 71%, y la tasa total de respuesta fue de un 67%. En total, 1.266 estudiantes participaron en las GSHS de Antigua y Barbuda. Los estudiantes escribieron sus contestaciones a cada pregunta en una hoja de respuestas diseñada para lectura óptica por computadora. Para facilitar comparaciones, esta hoja resumida de resultados solo incluye estudiantes de 13 a 15 años.

Resultados para estudiantes de 13-15 años	Total	Varones	Mujeres
<b>Consumo de alcohol</b>			
Entre los estudiantes que tomaron alguna vez una bebida con alcohol, el porcentaje que tomaron por primera vez una bebida con alcohol antes de los 14 años	86,5 (81,6-90,3)	85,9 (78,4-91,0)	88,2 (82,9-91,9)
Porcentaje de estudiantes que tomaron alguna bebida con alcohol, al menos uno o más días, durante los últimos 30 días	45,1 (40,9-49,5)	43,8 (38,4-49,3)	45,7 (39,7-51,9)
Porcentaje de estudiantes que en una o más ocasiones en su vida tomaron tanto alcohol que llegaron a emborracharse	22,7 (19,7-26,0)	26,1 (21,8-30,8)	19,5 (16,0-23,5)
<b>Conductas alimentarias</b>			
Porcentaje de estudiantes que tomaron bebidas gaseosas, una o más veces al día, en los últimos 30 días,	58,8 (55,1-62,4)	59,6 (55,7-63,4)	57,7 (52,1-63,1)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente fruta, dos o más veces al día, en los últimos 30 días,	40,8 (37,5-44,1)	44,1 (39,6-48,6)	36,0 (31,8-40,4)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente vegetales, tres o más veces al día, en los últimos 30 días,	22,4 (19,6-25,5)	24,7 (21,2-28,6)	19,5 (16,0-23,6)
Porcentaje de estudiantes que comieron habitualmente frutas y vegetales, cinco o más veces al día, en los últimos 30 días,	26,7 (23,9-29,7)	30,7 (26,8-34,7)	21,4 (17,4-26,1)
<b>Consumo de drogas</b>			
Entre los estudiantes que alguna vez consumieron drogas, el porcentaje que consumieron drogas antes de los 14 años	79,1 (73,7-83,6)	78,6 (71,4-84,4)	79,6 (71,5-86,0)
<b>Higiene</b>			
Porcentaje de estudiantes que se cepillaron los dientes menos de una vez al día, en los últimos 30 días	3,0 (2,2-4,0)	3,8 (2,5-5,7)	2,0 (1,3-3,2)
Porcentaje de estudiantes que nunca o raramente se lavaron las manos, después de usar el inodoro o la letrina, en los últimos 30 días	5,2 (3,9-6,8)	5,4 (3,7-7,9)	4,9 (3,4-7,0)
<b>Salud Mental</b>			
Porcentaje de estudiantes que no tienen amigos muy cercanos	8,5 (6,8-10,6)	11,3 (8,5-14,8)	5,7 (4,0-8,3)
Porcentaje de estudiantes que consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse en los últimos 12 meses	17,4 (15,1-19,8)	12,6 (9,4-16,5)	22,5 (18,9-26,5)
Porcentaje de estudiantes que intentaron suicidarse en los últimos 12 meses	12,3 (10,3-14,6)	9,3 (7,0-12,2)	15,7 (12,1-20,0)

# Antigua y Barbuda

## 2009 – Hoja resumida de resultados

Resultados para estudiantes de 13-15 años	Total	Varones	Mujeres
<b>Actividad física</b>			
Porcentaje de estudiantes que realizaron, en total, al menos 60 minutos de actividad física al día, durante cinco o más días, en los últimos 7 días	31,8 (27,3-36,8)	36,5 (29,7-43,8)	27,0 (22,7-31,7)
Porcentaje de estudiantes que asistieron a clase de educación física tres días o más cada semana durante el año escolar	26,4 (22,2-31,2)	28,5 (23,2-34,4)	23,8 (19,5-28,6)
Porcentaje de estudiantes que habitualmente pasaron tres o más horas al día sentados o realizando actividades sedentarias	54,8 (50,6-58,9)	50,3 (45,2-55,3)	59,5 (53,9-64,9)
<b>Factores Protectores</b>			
Porcentaje de estudiantes que faltaron a clase o a la escuela sin permiso, uno o más días, en los últimos 30 días	24,4 (20,9-28,2)	27,1 (22,1-32,6)	21,3 (16,7-26,8)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores entendieron sus problemas o preocupaciones siempre o casi siempre, en los últimos 30 días	32,7 (29,7-35,8)	31,9 (27,6-36,5)	34,4 (29,5-39,7)
Porcentaje de estudiantes cuyos padres o tutores siempre o casi siempre sabían realmente lo que hacía el estudiante en su tiempo libre, en los últimos 30 días	39,4 (36,2-42,8)	35,5 (30,8-40,5)	43,7 (38,4-49,1)
<b>Conductas sexuales</b>			
Porcentaje de estudiantes que han tenido alguna vez relaciones sexuales,	37,1 (32,7-41,7)	49,4 (44,1-54,7)	23,8 (18,8-29,7)
Entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, el porcentaje que tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años	76,3 (70,8-81)	82,8 (77,6-87)	61,8 (50,3-72,2)
Entre los estudiantes que alguna vez tuvieron relaciones sexuales, porcentaje que usaron condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales	68,4 (63-73,4)	67,7 (61,1-73,6)	68,5 (59,4-76,4)
<b>Consumo de tabaco</b>			
Porcentaje de estudiantes que fumaron cigarrillos, uno o más días en los últimos 30 días,	7,4 (5,8-9,4)	8,2 (6,2-10,8)	6,1 (4,2-8,8)
Entre los estudiantes que alguna vez fumaron cigarrillos, el porcentaje que fumaron su primer cigarrillo antes de los 14 años	89,9 (84,4-93,7)	89,0 (82,6-93,2)	90,4 (83,3-94,7)
Porcentaje de estudiantes que reportaron que otras personas fumaron cerca de ellos, uno o más días, en los últimos 7 días	53,2 (49,1-57,1)	55,4 (49,6-61)	49,7 (45-54,3)
<b>Violencia y lesiones no intencionales</b>			
Porcentaje de estudiantes que fueron intimidados, uno o más días, durante los últimos 30 días	24,9 (21,8-28,3)	23,5 (19,3-28,2)	26,7 (22,2-31,8)
Porcentaje de estudiantes que participaron en una pelea física, una o más veces, en los últimos 12 meses	47,5 (43,2-51,9)	55,1 (49,9-60,1)	38,4 (31,8-45,5)
Porcentaje de estudiantes que sufrieron alguna lesión seria en los últimos 12 meses	50,8 (46,3-55,3)	53,5 (47,6-59,3)	46,2 (40,2-52,3)

**Para mayor información favor contactar:**

Cleo Clothilda Hampson, MCH coordinator  
Ministry of Health, Antigua, hampson\_ccm@hotmail.com