

2017

Weekly / Semanal **Influenza Report EW 34/ Reporte de Influenza SE 34**


Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios



**September 6, 2017
de septiembre, 2017**


FluID

FluID frequency of reporting in EW 31-34, 2017
FluID frecuencia de los reportes en SE 31-34, 2017



FluNet

FluNet frequency of reporting in EW 31-34, 2017
FluNet frecuencia de los reportes en SE 31-34, 2017



Countries reporting to FluID
Países que reportan a FluID



Countries Reporting to FluNet
Países que reportan a FluNet



Map Production /Producción del mapa: PAHO/WHO, OPS/OMS.

Data Source / Fuente de datos:
Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States
Reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and /
Informe de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de
Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas
globales de [FluNet](#) y [FluID](#)

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the informatics global platforms

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/

and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/ ;

and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [FluID](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/hip/viz/ed_flu.asp

PAHO FluID: <http://ais.paho.org/hip/viz/flumart2015.as>

Influenza Regional Reports / Informes regionales de influenza:

In English: <http://www.paho.org/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARInet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org>

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	Weekly Summary / Resumen Semanal	5
2	Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VSR	6
3	Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados	7
4	Epidemiological and Virologic update by country / Actualización epidemiológica y virológica por país	8
5	Acronyms / Acrónimos	31

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: Overall, influenza and other respiratory virus activity has decreased in North America. Influenza A(H3N2) and influenza B co-circulated in the region, but with low detections reported.

Caribbean: Low influenza and other respiratory virus activity were reported throughout most of the sub-region. In [Cuba](#), SARI activity slightly increased in recent weeks, with increased RSV activity.

Central America: Epidemiological indicators remained at moderate levels and increased influenza and RSV circulation were reported. In [El Salvador](#), [Costa Rica](#) and [Guatemala](#) SARI-associated hospitalizations slightly increased from recent weeks, with increased RSV activity.

Andean Region: Overall influenza and other respiratory virus activity remained low. Moderate RSV activity and SARI-related hospitalizations with co-circulation of influenza A(H3N2) and B continued in [Colombia](#).

Brazil and Southern Cone: Influenza levels trended downward and at seasonal levels, throughout most of the sub-region. Overall ILI and SARI activity began to decrease in recent weeks with influenza A(H3N2) predominating. RSV activity remained at moderate levels in [Argentina](#), [Brazil](#), [Chile](#) and [Uruguay](#).

Global: In the temperate zone of the southern hemisphere and in some countries of South and South East Asia, high levels of influenza activity continued to be reported. In Central America and the Caribbean influenza activity continued to be reported in a few countries. Influenza activity remained at low levels in the temperate zone of the northern hemisphere. Worldwide, influenza A(H3N2) viruses are predominating.

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios ha disminuido en América del Norte. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la región, pero con detecciones bajas reportadas.

Caribe: Se ha notificado baja actividad de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la sub-región. En [Cuba](#), la actividad de IRAG aumentó ligeramente en semanas recientes, con aumento de la circulación de VSR.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen moderados y se ha reportado actividad aumentada de influenza y de VSR. En [El Salvador](#), [Costa Rica](#) y [Guatemala](#), las hospitalizaciones asociadas a IRAG aumentaron ligeramente en semanas recientes, con aumento de la actividad de VSR.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja. La actividad moderada de VSR y hospitalizaciones asociadas a IRAG con co-circulación de influenza A(H3N2) y B continuaron en [Colombia](#).

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza reflejaron una tendencia al descenso, a niveles estacionales, en toda la sub-región. La actividad de ETI y la actividad de IRAG comenzaron a descender en semanas recientes, con predominio de influenza A(H3N2). Se mantiene actividad moderada de VSR en [Argentina](#), [Brasil](#), [Chile](#) y [Uruguay](#).

Nivel global: En la zona templada del hemisferio sur y en algunos países del Sur y Sudeste asiático, elevados niveles de actividad de influenza continúan siendo reportados. En América central y el Caribe continuó reportándose aumentada actividad de influenza en contados países. La actividad de influenza permaneció a niveles bajos en la zona templada del hemisferio norte. En todo el mundo, predominaron los virus influenza A(H3N2).


Influenza circulation by region. 2012-17

Circulación virus influenza por región. 2012-17



Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by region. 2012-17

Circulación de virus sincicial respiratorio por región. 2012-17



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory virus, by country and EW, 2017¹ Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2017²

		EW 34, 2017 / SE 34, 2017														
		N samples/ muestras	Influenza A (H3N2)	Influenza A (H1N1)pdm09	Influenza A No subtipificado	Total Influenza B	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/RSR	% RSV/RSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovirus	Rhinovirus	% All Positive Samples (+)
Caribbean/ Caribe	Cuba	48	3	0	0	0	6.3%	0	0	15	31%	0	0	0	3	43.8%
	Dominican Republic	5				0	0.0%			1	20%					20.0%
	Jamaica	15	0	1	0	0	6.7%									6.7%
	Suriname	2				0	0.0%	1						1		100.0%
	Trinidad and Tobago	1				0	0.0%			1	100%					100.0%
Central America/ América Central	Costa Rica	64	1	0	0	7	12.5%	4	1	28	44%					64.1%
	El Salvador	72	0	0	0	1	1.4%	0	1	36	50%					52.8%
	Guatemala	6	0	0	0	0	0.0%	0	0	4	67%	0	0	0	0	66.7%
	Honduras	8	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%					0.0%
	Nicaragua	351	78			31	31.1%							1		35.9%
	Panama	76	5	0	0	0	6.6%	1	7	28	37%			10	12	82.9%
Andean Region/ Región Andina	Bolivia	39	0	0	0	1	2.6%	0	0	0	0%	0	0	0	0	2.6%
	Ecuador	25	1			0	4.0%									4.0%
	Ecuador IRAG	16	1	0	0	0	6.3%	0	0	0	0%			0		6.3%
	Peru	46	0	0	0	0	0.0%	1	3	0	0%	0	0	1	3	17.4%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Brazil_ILI	19	0	0	0	0	36.8%	1	0	0	0%					42.1%
	Chile	1,278	4		16	30	3.9%	29	23	221	17%			86		32.0%
	Chile_IRAG	64	0	0	3	3	9.4%	1	1	11	17%	0	0	13	2	53.1%
	Paraguay	48	0	0	0	1	2.1%	1	0	1	2%	0	0	0	0	6.3%
	Uruguay	24	0	0	0	2	8.3%	0	1	6	25%	0	0	0	0	37.5%
	Uruguay IRAG	24					8.3%		1	6	25%					37.5%
Grand Total		2,231	93	1	19	76	8.9%	39	38	358	16%	0	0	112	20	35.0%
		EW 33, 2017 / SE 33, 2017														
		*Note: These countries reported in EW 34, but have provided data up to EW 33. *Nota: Estos países reportaron en la SE 34, pero han enviado los datos hasta la SE 33.														
		N samples/ muestras	Influenza A (H3N2)	Influenza A (H1N1) pdm09	Influenza A No subtipificado	Total Influenza B	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/RSR	% RSV/RSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneu...	Rhinovirus	% All Positive Samples (+)
Caribbean/ Caribe	Cuba IRAG	37	2	0	0	0	5.4%	0	2	14	38%	0	0	0	3	56.8%
Andean Region/ Re...	Venezuela	8	0	0	0	2	25.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	25.0%
Brazil & Southern C...	Argentina	854	0	0	4	15	2.2%	13	76	164	19%			63		39.2%
Grand Total		899	2	0	4	17	2.6%	13	78	178	20%	0	0	63	3	39.8%
		Cumulative, EW 31-34, 2017 / Acumulado, SE 31-34, 2017														
		N samples/ muestras	Influenza A (H3N2)	Influenza A (H1N1) pdm09	Influenza A No subtipificado	Total Influenza B	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/RSR	% RSV/RSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovirus	Rhinovirus	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte	Canada	3,244	23	4	13	10	1.5%									1.5%
	Mexico	405	38	1	0	9	11.9%	0	0	1	0%	0	0	0	4	13.1%
	USA	10,669	25	3	160	89	2.6%									2.6%
Caribbean/ Caribe	Barbados	1				0	0.0%		1							100.0%
	Belize	1	0	0	1	0	100.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	100.0%
	Cuba	164	8	0	0	0	4.9%	0	3	63	38%	0	2	0	12	53.7%
	Cuba IRAG	163	7	0	0	0	4.3%	0	3	63	39%	0	2	0	12	53.4%
	Dominican Republic	58				0	0.0%		1	5	9%			7		22.4%
	Haiti	33	3	0	0	0	9.1%	0	0	0	0%	0	0	0	0	9.1%
	Jamaica	37	0	1	0	1	5.4%									5.4%
	Suriname	28				0	0.0%	3		10	36%			4		60.7%
Central America/ América Central	Trinidad and Tobago	8				0	0.0%			5	63%			1		75.0%
	Costa Rica	293	5	0	0	29	11.6%	23	9	94	32%					54.6%
	El Salvador	323	0	0	0	1	0.3%	0	3	158	49%					50.2%
	Guatemala	81	0	0	0	0	0.0%	2	0	51	63%	0	0	2	0	67.9%
	Honduras	73	1	0	0	0	1.4%	1	0	4	5%					8.2%
	Nicaragua	953	186			91	29.1%		11	5	1%			9		33.9%
	Panama	359	23	0	0	15	10.6%	5	33	93	26%			35	52	71.3%
	Bolivia	176	2	0	0	8	5.7%	0	1	1	1%	0	0	0	0	6.8%
Andean Region/ Región Andina	Colombia	437	17	0	0	6	5.3%	30	14	34	8%	19	12	7	10	35.0%
	Ecuador	134	2			0	1.5%	1	1							3.0%
	Ecuador IRAG	105	1	0	0	0	1.0%	0	1	0	0%			0		1.9%
	Peru	188	6	0	0	2	4.3%	3	9	7	4%	0	0	5	9	21.8%
	Venezuela	13	1	0	0	3	30.8%	0	0	0	0%	0	0	0	0	30.8%
	Argentina	3,785	7	0	40	80	3.4%	53	230	1,003	27%			181		42.3%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Brazil_ILI	677	17	0	1		10.9%	32	7	17	3%					31.0%
	Chile	5,534	58		47	107	3.8%	77	108	1,234	22%			349		35.8%
	Chile_IRAG	388	11	0	6	12	7.5%	7	9	87	22%	0	0	48	4	47.4%
	Paraguay	285	2	0	0	18	7.0%	2	0	2	1%	0	0	13	0	13.0%
	Paraguay IRAG	268	2	0	0	7	3.4%	1	2	5	2%	0	0	7	0	9.0%
	Uruguay	138	2	0	0	4	4.3%	1	5	48	35%	0	0	1	0	44.2%
Grand Total	Uruguay IRAG	133	2				4.5%	1	5	47	35%			1		45.1%
		29,134	449	9	268	492	4.4%	242	456	3,037	10%	19	16	670	103	20.3%
		Total Influenza B, EW 24-34, 2017														
		Total Influenza B		B Victoria		B Yamagata		B lineage not determined		% B Victoria		% B Yamagata				
North America/ América del Norte		1,079		38		128		913		22.9%		77.1%				
Caribbean/ Caribe		82		21		0		61		100.0%		0.0%				
Central America/ América Central		495		19		31		445		38.0%		62.0%				
Andean Region/ Región Andina		99		17		19		63		47.2%		52.8%				
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur		920		100		236		835		29.8%		70.2%				
Grand Total		2,675		195		414		2,317		32.0%		68.0%				

1. The detection of respiratory viruses other than influenza depends on the diagnostic capacity of each country and monitoring system. The absence of report of other respiratory viruses does not indicate the absence of their circulation.


2. La detección de otros virus respiratorios diferentes a influenza depende de la capacidad diagnóstica de cada país y del sistema de vigilancia establecido. El que no se reporten otros virus respiratorios, no significa, ni indica la ausencia de circulación viral.

North America / América del Norte:

Canada

- **Graph 1.** During EW 33, influenza activity remained at low levels as compared to the previous week, with an influenza percent positivity of ~3%; influenza A(H3N2) and B co-circulated in recent weeks. / Durante la SE 33, la actividad de influenza permaneció a niveles bajos en relación a la semana previa con un porcentaje de positividad de influenza de ~3%; con predominio de influenza B en las últimas semanas
- **Graph 2.** The percent of ILI visits to healthcare professionals among all consultations slightly decreased during EW 34 (0.8%). / El porcentaje de consultas por ETI a profesionales de la salud sobre el total de consultas disminuyó ligeramente durante la SE 34 (0,8%).
- **Graph 3,4.** During EW 34, 5 influenza-associated hospitalizations were reported and the counts have decreased from prior weeks, all cases due to influenza A. No ICU admissions and no deaths were reported. To date this season, 67% of all hospitalizations were in adults over 65 years of age. During EW 34, sentinel sites reported no pediatric hospitalizations, while surveillance for adult hospitalizations has ended for this season. The number of pediatric (≤ 16 years of age) hospitalizations reported in EW 34 remains below the six year average for the same time period. / Durante la SE 34, se han reportado 5 hospitalizaciones asociadas a influenza y los casos han disminuido respecto a semanas previas, todos los casos debidos a influenza A. No se han notificado admisiones a UCI o fallecidos. Hasta la fecha, 67% de todas las hospitalizaciones en este período se observaron en adultos mayores de 65 años. Durante la SE 34, los sitios centinela no notificaron hospitalizaciones pediátricas, en tanto la vigilancia de hospitalizaciones en adultos ha finalizado para esta temporada. Las hospitalizaciones en pediátricos (≤ 16 años de edad) notificadas en SE 34 se encontraron por debajo del promedio de seis años para el mismo período.

Graph 1. Canada: Distribución de virus de influenza por SE, 2016 -17. SE 33




Graph 3. Canada: Número de hospitalizaciones, admisiones de UCI, y fallecidos por edad y tipo de influenza, 2016-17. SE 34.

Table 2 - Cumulative number of hospitalizations, ICU admissions and deaths by age and influenza type reported by participating provinces and territories, Canada 2016-17, week 34

Age Groups (years)	Cumulative (August 28, 2016 to August 26, 2017)						
	Hospitalizations			ICU Admissions		Deaths	
	Influenza A Total	Influenza B Total	Total (# (%))	Influenza A and B Total	%	Influenza A and B Total	%
0-4	448	95	543 (8%)	20	7%	2	1%
5-19	241	99	340 (5%)	20	7%	3	1%
20-44	298	53	351 (5%)	27	10%	5	1%
45-64	766	143	909 (14%)	83	30%	37	10%
65+	3976	427	4403 (67%)	124	45%	341	88%
Total	5729	817	6546 (100%)	274	100%	388	100%

Graph 2. Canada: ILI consultation rates by sentinels and EW, 2016-17. EW 34
Tasa de consultas de ETI por vigilancia centinela y SE, 2016-17. SE 34


Figure 4 - Percentage of visits for ILI reported by sentinels by report week, Canada, 2016-17, week 34
Number of Sentinels Reporting Week 34: 88



Delays in the reporting of data may cause data to change retrospectively. In BC, AB, and SK, data are compiled by a provincial sentinel surveillance program for reporting to FluWatch. Not all sentinel physicians report every week.

Graph 4. Canada: Número de hospitalizaciones pediátricas, por SE, 2016-17, SE 34

Figure 7 - Number of pediatric hospitalizations (≤ 16 years of age) with influenza reported by the IMPACT network, by week, Canada, 2016-17, week 34




The shaded area represents the maximum and minimum number of cases reported by week from seasons 2010-11 to 2015-16.


The number of hospitalizations reported through IMPACT represents a subset of all influenza-associated pediatric and adult hospitalizations in Canada. Delays in the reporting of data may cause data to change retrospectively.

- **Graph 1.** During EW 33, influenza activity slightly increased (2.7% of samples tested were positive for influenza) with influenza A predominating. / Durante la SE 33, la actividad de influenza disminuyó ligeramente (2,7% de todas las muestras fueron positivas para influenza) con predominio de influenza A.
- **Graph 2.** In EW 34, RSV positivity (12.5%) slightly increased while adenovirus positivity and parainfluenza positivity remained at low levels as compared to the previous week. / En la SE 34, la positividad de VSR (12,5%) aumentó ligeramente mientras que la positividad de adenovirus y la positividad de parainfluenza permanecieron a niveles bajos en comparación a lo observado en la semana previa.
- **Graph 3,4.** During EW 32, pneumonia and influenza mortality slightly decreased as compared the prior week (5.1%) but was below the epidemic threshold (5.9%) for EW 32. During EW 34, no influenza-associated pediatric deaths were reported. A total of 104 influenza-associated pediatric deaths were reported during the 2016-2017 season./ Durante la SE 32, la tasa de mortalidad por neumonía e influenza disminuyó ligeramente en comparación a la semana previa (5,1 %) aunque estuvieron por debajo del umbral epidémico (5,9%) para la SE 32. Durante la SE 34, no se notificaron muertes pediátricas asociada a influenza. Un total de 104 muertes pediátricas asociadas a influenza fueron notificadas durante la temporada 2016-2017.
- During EW 34, national ILI activity continued at low levels (0.9% of visits) and was below the national baseline of 2.2%. All ten regions reported a proportion of ILI visits below their region-specific baseline levels. / Durante la SE 34, la actividad nacional de ETI continuó en niveles bajos (0,9% de las consultas) y se ubicó por debajo de la línea de base nacional de 2,2%. Todas las diez regiones notificaron una proporción de consultas por ETI por debajo de sus líneas de base regionales.


Graph 1. US: Influenza virus distribution by EW 33, 2016-17
Distribución de virus de influenza por SE 33, 2016-17



Graph 3. US: Pneumonia and influenza mortality. EW 32
Mortalidad por neumonía e influenza. SE 32




Graph 2. US: Percent positivity for respiratory virus EW 34
Porcentaje de positividad para virus respiratorios, por SE 34, 2013/14-2016/17




Graph 4. US: Numero de fallecidos pediatricos asociados a influenza, 2013/14-2016/17, SE 34

Number of Influenza-Associated Pediatric Deaths by Week of Death: 2013-2014 season to present




- **Graph 1.** Influenza activity slightly increased in EW 33 from levels observed in previous weeks (influenza positivity increased slightly to 12%) with influenza A(H3N2) predominating. / La actividad de influenza aumentó ligeramente en la SE 33 de los niveles observados en semanas previas (la positividad de influenza aumentó ligeramente a 12%) con predominio de influenza A(H3N2).
- **Graph 2.** No RSV detections were reported in EW 33. During EW 33, influenza positivity (12%) was higher as compared to the previous season. / No se notificaron detecciones de VSR en la SE 33. Durante la SE 33, la positividad de influenza (12%) fue mayor a lo observado en la temporada previa.
- **Graph 3.** During EW 33, the ARI rate slightly decreased from levels observed in previous weeks (~300 ARI cases per 100,000 inhabitants) and was below the alert threshold. / Durante la SE 33, la tasa de IRA disminuyó ligeramente de los niveles observados en semanas previas (~300 casos por 100.000 habitantes) y se ubicó debajo del umbral de alerta.
- **Graph 4.** During EW 33, at the national-level, pneumonia activity remained at similar levels to the prior week, and remained below the seasonal threshold (1.4 per 100,000). / Durante la SE 33, a nivel nacional, la actividad de neumonía permaneció a niveles similares en relación a los niveles de la semana previa, por debajo del umbral estacional (1,4 por 100.000).
- **Graph 5,6.** As of EW 35, 2017, 353 influenza-positive SARI/ILI cases were reported. Activity was slightly higher as compared to the previous week and was similar to the previous seasons, for the same period. Eleven states reported higher cumulative influenza-related SARI cases in 2017 than the 2016-2017 season: Campeche (35), Chiapas (61), Coahuila (104), Nuevo León (264), Querétaro (178), Quintana Roo (413), San Luis Potosí (89), Sonora (117), Tabasco (216), Tamaulipas (94) and Yucatan (95). / Hasta la SE 34, 2017, se reportaron 342 casos de IRAG/ETI positivos para influenza. La actividad fue ligeramente mayor en comparación con la semana previa y similar a las temporadas anteriores, para el mismo período. Once estados reportaron mayor número de casos de IRAG asociados a influenza que la temporada 2015-2016: Campeche (35), Chiapas (61), Coahuila (104), Nuevo León (264), Querétaro (178), Quintana Roo (413), San Luis Potosí (89), Sonora (117), Tabasco (216), Tamaulipas (94) y Yucatan (95).
- **Graph 7.** As of EW 34, four states reported a proportion of influenza positive SARI/ILI cases above 15%: Quintana Roo (16%), Sonora (27.6 %), Tamaulipas (21.1%) and Tabasco (16.1%). / Hasta la SE 34, cuatro estados reportaron una proporción de casos de IRAG/ETI positivos para influenza superior a 15%: Quintana Roo (16%), Sonora (27,6 %), Tamaulipas (21,1%) y Tabasco (16,1%).
- **Graph 8.** As of EW 35, 2017, 14 cumulative influenza-related SARI deaths were reported; activity was similar as compared to the previous week and to the levels observed in previous seasons for the same period. / Hasta la SE 35 de 2017, se notificaron 14 muertes acumuladas por IRAG asociadas a influenza; la actividad fue similar en comparación a la semana previa y a los niveles observados en temporadas previas para el mismo período.
- During EW 34, sixteen states reported higher cumulative SARI deaths associated with influenza in 2017 than during the 2016-2017 season: Aguascalientes (15), Campeche (2), Chiapas (4), Chihuahua (5), Coahuila (29), Distrito Federal (1), Durango (11), Guanajuato (7), Hidalgo (5), Nuevo León (49), Querétaro (33), Quintana Roo (7), San Luis Potosí (8), Sonora (3), Tabasco (21), and Zacatecas (2). / Durante la SE 34, dieciséis estados reportaron un número mayor de fallecidos por IRAG asociados a influenza en 2017 que durante la temporada 2015-2016: Aguascalientes (15), Campeche (2), Chiapas (4), Chihuahua (5), Coahuila (29), Distrito Federal (1), Durango (11), Guanajuato (7), Hidalgo (5), Nuevo León (49), Querétaro (33), Quintana Roo (7), San Luis Potosí (8), Sonora (3), Tabasco (21), y Zacatecas (2).


Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution by EW 2014-17, EW 33.
Distribución de virus influenza por SE 2014-17, SE 33.




Graph 2. Mexico: Influenza and RSV distribution, 2015-17
Distribución de virus influenza y VSR, 2015-17



Graph 3. Mexico: ARI Endemic Channel, EW 33, 2016-17
Canal Endémico de IRA, SE 33, 2016-17



Graph 5. Mexico: SARI-flu cases by state, EW 35, 2017
Casos de IRAG positivos para influenza por estado, SE 35, 2017



Graph 7. Mexico: Flu cases and deaths by state. EW 34, 2016-2017
Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según estado. SE 34, 2016-2017


Entidad Federativa	Casos ETWRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETWRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	172	5	2.9	0	MORELOS	159	1	0.6	0
BAJACALIFORNIA	47	2	4.3	0	NAYARIT	52	1	1.9	0
BAJACALIFORNIA SUR	95	2	2.1	0	NUEVO LEÓN	140	8	5.7	0
CAMPECHE	178	10	5.6	0	OAXACA	207	4	1.9	0
COAHUILA	91	0	0.0	0	PUEBLA	201	10	5.0	0
COLIMA	136	3	2.2	0	QUERÉTARO	172	1	0.6	0
CHIASPAS	317	14	4.4	1	QUINTANA ROO	430	89	16.0	3
CHIHUAHUA	140	2	1.4	0	SAN LUIS POTOSÍ	118	14	11.9	0
CIUDAD DE MÉXICO	412	1	0.2	0	SINALOA	49	0	0.0	0
DURANGO	39	1	2.6	0	SONORA	98	27	27.6	2
GUANAJUATO	49	1	2.0	0	TABASCO	236	38	16.1	4
GUERRERO	288	14	4.9	0	TAMULIPAS	90	19	21.1	0
HIDALGO	83	2	2.4	0	TLAXCALA	192	0	0.0	0
JALISCO	201	3	1.5	1	VERACRUZ	693	38	5.5	2
ESTADO DE MÉXICO	444	4	0.9	0	YUCATÁN	450	45	10.0	1
MICHOACÁN	224	11	4.9	0	ZACATECAS	242	3	1.2	0
Total general						6,445	353	5.5	14

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETWRAG


Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 31/8/2017.

% de casos positivos a influenza respecto a los casos de ETI/IRAG / % influenza-positive cases among ILI/SARI
 ○ >10% de casos positivos / >10% positivity
 ● >15% de casos positivos / >15% positivity

Graph 4. Mexico: Pneumonia Endemic Channel, 2016-17.EW 33.
Canal endémico de neumonía, 2016-17.SE 33.




Graph 6. Mexico: SARI/ILI-flu cases EW 35, 2012/13-2016/17
Casos de IRAG/ETI asociados a influenza SE 35, 2012/13-2016/17



- Adjustment made to data by cumulating cases and deaths during seasons in which counts were not consistently reported from beginning to end of the season- Numbers from interseasonal levels were added to 2016/17 seasonal numbers

- # of Sentinel Sites: - 2016/2017=360 - 2015/2016=560 - 2014/2015=598 - 2013/2014=572 - 2012/2013=583

Graph 8. Mexico: SARI/ILI-flu deaths EW 35, 2012/13- 2016/17
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza SE 35, 2012/13-2016/17




- Adjustment made to data by cumulating cases and deaths during seasons in which counts were not consistently reported from beginning to end of the season- Numbers from interseasonal levels were added to 2016/17 seasonal numbers

- # of Sentinel Sites: - 2016/2017=360 - 2015/2016=560 - 2014/2015=598 - 2013/2014=572 - 2012/2013=583


CARPHA

- Graph 1.** During EW 33, few influenza detections were reported, with influenza B predominating in recent weeks. / Durante la SE 33, se reportaron escasas detecciones de influenza, con predominio de influenza B en semanas previas.
- Graph 2.** During EW 33, the proportion of influenza positive samples slightly decreased to less than 1%, while the proportion of RSV samples increased from previous weeks. Influenza and RSV proportion were higher as compared to levels observed during the 2015-2016 season for the same period. / Durante la SE 33, la proporción de muestras positivas para influenza disminuyó a menos de 1%, mientras que la proporción de muestras de VSR aumentó respecto a las semanas previas. La proporción de influenza y VSR fueron superiores en relación a los niveles observados durante la temporada 2015-2016 para el mismo período.
- Countries that reported during EW 25 and 33 include: Barbados and Trinidad and Tobago. / Los países que reportaron entre la SE 25 y SE 33 incluyen: Barbados y Trinidad y Tobago.

Graph 1. CARPHA. Influenza virus distribution EW, 2014-17. EW 33.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-17. SE 33.




Graph 2. CARPHA. Influenza and RSV distribution, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, 2014-17




Cuba

- Graph 1.** During EW 36, the number of SARI cases slightly decreased, as compared to the prior week, but was lower than the counts observed earlier in the year and is higher than levels observed during the 2016 season. / Durante la SE 36, el número de casos de IRAG disminuyó ligeramente, en relación a la semana previa, si bien fue menor que los recuentos observados anteriormente en el año y es mayor a los niveles observados durante la temporada 2016.
- Graph 2.** During EW 34, influenza detections slightly increased from the prior week with percent positivity at 10%. Influenza A(H3N2) predominated in recent weeks. / Durante la SE 34, las detecciones de influenza aumentaron respecto a la semana previa con porcentaje de positividad a 10%. En semanas recientes, predominó influenza A(H3N2).
- Graph 3.** During EW 34 the proportion of influenza positive samples slightly increased (10%) while the proportion of RSV samples slightly decreased (35%) from previous weeks. Influenza and RSV proportion were higher as compared to levels observed during the 2015-2016 season for the same period. / Durante la SE 34, la proporción de muestras positivas para influenza aumentó ligeramente (10%) mientras que la proporción de muestras de VSR disminuyó ligeramente (35%) respecto a las semanas previas. La proporción de influenza y VSR fueron superiores en relación a los niveles observados durante la temporada 2015-2016 para el mismo período.


Graph 1. Cuba: Number of SARI cases by EW, EW 36, 2013-17
Número de casos IRAG by EW, EW 36, 2013-17



Graph 2. Cuba: Influenza virus distribution by EW, 2014-17
Distribución de virus influenza por SE, 2014-17




Graph 3. Cuba Influenza and RSV distribution, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, 2014-17




Dominican Republic / República Dominicana

- Graph 1.** During EW 34, no influenza detections were reported and influenza B predominated in recent weeks. / Durante la SE 34, no se reportaron detecciones de influenza y predominó influenza B en semanas previas.
- Graph 2.** During EW 34, low RSV activity was reported (~10% positivity). / Durante la SE 34, se reportó baja actividad de VSR (~10% de positividad).

Graph 1. Dominican Republic: Influenza virus distribution EW, 2014-17. EW 34.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-17. SE 34.




Graph 2. Dominican Republic Influenza and RSV distribution, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, 2014-17



Haiti

- Graph 1.** During EW 32, few influenza detections were reported, with influenza A(H3N2) predominating. / Durante la SE 32, se reportaron escasas detecciones de influenza, con predominio de influenza A(H3N2).

Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW, 2014-17. EW 32.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-17. SE 32.




Jamaica

- Graph 1.** During EW 34, the proportion of SARI hospitalizations among all hospitalizations slightly increased but remained below the average epidemic curve and the alert threshold as compared to previous weeks. / Durante la SE 34, la actividad de IRAG aumentó ligeramente, pero se mantiene por debajo de la curva epidémica promedio y el umbral de alerta, en relación a semanas previas.
- Graph 2.** During EW 32, the number of SARI cases slightly increased as compared to previous weeks and was lower than the previous seasons for the same period. / Durante la SE 32, el número de casos de IRAG aumentó ligeramente en relación a semanas previas y fue menor que en las temporadas previas para el mismo período.
- Graph 3.** During EW 33, pneumonia case-counts slightly increased to less than 50 cases and were below the levels observed in the prior season. / Durante la SE 33, el número de casos de neumonía aumentó ligeramente menos de 50 casos, y resultó por debajo de los niveles observados en la temporada anterior.
- Graph 4.** During EW 33, ARI cases decreased as compared to previous weeks, and was similar to levels observed in previous season for the same period. / Durante la SE 33, el número de casos de IRA disminuyó

en relación a las semanas previas, y fue similar a lo observado en temporadas previas para el mismo período.


- **Graph 5.** During EW 34, few influenza detections were reported, with slightly increased activity (10% positivity) and influenza B predominating. / Durante la SE 34, se reportaron escasas detecciones de influenza, con ligera disminución de la actividad (10% de positividad) y predominio de influenza B.

Graph 1. Jamaica: % hospitalizaciones de casos IRAG entre total de hospitalizaciones por SE 34, 2011-2017.




Graph 2. Jamaica: Percent of SARI cases per total hospitalizations, by EW, EW 32, 2017

Porcentaje de casos IRAG por las hospitalizaciones totales, por SE, SE 32, 2017




Graph 3. Jamaica: Number of pneumonia cases by EW 33, 2017 (compared to 2014-2016)

Número de casos de neumonía, hasta SE 33, 2017 (en comparación a 2014-2016)




Graph 4. Jamaica: Number of ARI cases by EW 33, 2017 (compared to 2012-2016)

Número de casos de IRA, hasta SE 33, 2017 (en comparación a 2012-2016)



Graph 5. Jamaica: Influenza virus distribution by EW, 2014-17

Distribución de virus influenza por SE, 2014-17




Puerto Rico

- **Graph 1,2.** Influenza detections remained below the seasonal threshold in recent weeks, with increased detections during EW 34. Influenza A(H3N2) and influenza B co-circulated. / Las detecciones de influenza permanecieron por debajo del umbral estacional en semanas previas, con aumento de detecciones durante la SE 34. Co-circularon influenza A(H3N2) e influenza B.
- **Graph 3.** During EW 34, ILI activity³ continued to decrease, as compared to the previous week, and remained below the average epidemic curve. / Durante la SE 34, la actividad de ETI continuó en disminución, en comparación con la semana previa, y permaneció por debajo de la curva epidémica promedio.


Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive cases by EW 34, 2016-17

Casos positivos a influenar SE 34, 2016-17




Graph 2. Puerto Rico: PCR influenza-positive results by subtype by EW, 2016-2017.EW 34.

GRÁFICA 5. Resultados de RT-PCR por semana de resultado Puerto Rico, Temporada 2016 - 2017



³ Report available at: <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm>

Graph 3. Puerto Rico: ILI epidemic rates by EW 34, 2017




Saint Lucia

- **Graph 1.** During EW 33, the number of cases with respiratory symptoms among children under 5 years of age slightly decreased and remained below the seasonal threshold. The highest incidence rates were reported in Vieux Fort. / Durante la SE 33, el número de casos con síntomas respiratorios en niños menores de 5 años de edad disminuyó ligeramente y permaneció por debajo del umbral estacional. Las tasas de incidencia más elevadas fueron reportadas en Vieux Fort.
- **Graph 2,3.** The number of cases of fever and respiratory symptoms among 5 years-of-age and older slightly decreased but remained below the alert threshold and the average epidemic curve during EW 33. Most of the cases were notified in Dennery. / El número de casos de fiebre y síntomas en el grupo de 5 años y mayores disminuyó ligeramente si bien permaneció debajo del umbral de alerta y la curva epidémica promedio durante la SE 33. La mayoría de los casos fueron detectados en Dennery.
- **Graph 4.** In EW 33, SARI activity slightly decreased as compared to the previous week, representing 5.1% of total hospitalizations. SARI admissions were below the levels observed for 2014-2016. / En la SE 33, la actividad de IRAG disminuyó ligeramente en comparación a la semana anterior, representando 5,1% del total de hospitalizaciones. Las admisiones por IRAG fueron bajas en relación a los niveles observados para 2014-2016.


Graph 1. Saint. Lucia: Total number of cases for respiratory symptoms in <5 years of age, EW 33, 2017

Número total de casos respiratorios en > 5 años, SE 33, 2017




Graph 3. Saint. Lucia: Distribution of respiratory cases by province, EW 33, 2017

Distribución de los casos respiratorios por provincia, SE 33, 2017




Graph 2. Saint. Lucia: Total number of cases for respiratory symptoms in >5 years of age, EW 33, 2017

Número total de casos respiratorios en >5 años, SE 33, 2017




Graph 4. Saint. Lucia: Número y porcentaje de casos IRAG, SE 32, 2017




- **Graph 1,2.** During EW 35, SARI-related hospitalizations decreased, as compared to the previous weeks and were lower than the previous season for the same period. As of EW 35, few ILI cases were reported, with low activity in recent weeks. / Durante la SE 35, las hospitalizaciones asociadas a IRAG disminuyeron, en relación a las semanas previas y estuvieron bajas que en temporadas previas para el mismo período. Hasta la SE 35, contados casos de ETI se han reportado, con baja actividad en semanas recientes.
- **Graph 3.** During EW 34, no influenza activity was reported, with influenza B predominating in recent weeks. / Durante la SE 34, no se reportó actividad de influenza, con predominio de influenza B en semanas recientes.
- **Graph 4.** During EW 34, no influenza activity was reported and RSV positivity slightly increased as compared to the previous season. / Durante la SE 34, no se reportó actividad de influenza y la positividad de VSR aumentó ligeramente en comparación a la temporada anterior.

Graph 1. Suriname: Number of ILI cases, by age, by EW, 2017.EW 35
Número de casos ETI, en grupo de edad, por SE, 2017.SE 35




Graph 2. Suriname: % SARI hospitalizations among all causes, by EW, 2017.EW 35.


Casos % de hospitalizaciones IRAG entre todas las causas, por SE, 2017.SE 35.



Graph 3. Suriname: Influenza virus distribution by EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza por SE 34, 2014-17




Graph 4. Suriname: Influenza and RSV distribution, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, 2014-17




Costa Rica

- **Graph 1.** During EW 34, influenza activity slightly decreased with a lower percent positivity (10%) than the previous week with influenza B predominating. / Durante la SE 34, la actividad de influenza disminuyó ligeramente con un porcentaje de positividad (10%) más bajo que en semanas previas con predominio de influenza B.
- **Graph 2.** During EW 34, RSV percent positivity increased from levels observed in previous weeks. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad de VSR aumentó en relación a los niveles de semanas previas.
- **Graph 3.** During EW 34, the proportion of SARI-associated deaths (11%) and the proportion of SARI-associated hospitalizations (4%) slightly decreased from recent weeks; while ICU admissions (11%) increased from previous weeks. / Durante la SE 34, la proporción de fallecidos asociados a IRAG (11%) y la proporción de hospitalizaciones asociadas a IRAG (4%) disminuyeron ligeramente en relación a semanas previas; en tanto, las admisiones a UCI (11%) aumentaron respecto a semanas previas.

Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, Lab-confirmed samples, by EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza, confirmados por laboratorio, hasta SE 34, 2014-17




Graph 2. Costa Rica: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2015-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2015-17



Graph 3. Costa Rica: Number of Hospitalizations, ICU admissions, Deaths, SE 34, 2014-2017

IRAG (%): Hospitalizaciones, admisiones a UCI y fallecidos.
Hospitales Centinela, CCSS, Costa Rica,
CCSS, SE N°34. Año 2014 - 2017.




El Salvador

- **Graph 1.** During EW 34 and in recent weeks, decreasing influenza activity was reported (less than 2% positivity in EW 34), with influenza A(H3N2) predominating. / Durante la SE 34 y en semanas previas, se ha reportado una disminución de la actividad de influenza (menor a 2% de positividad en la SE 34), con predominio de influenza A(H3N2).
- **Graph 2.** As of EW 34, RSV positivity increased and was higher than levels observed in the previous season; influenza positivity was lower than levels observed during the 2015-2016 season for the same period. / En la SE 34, la positividad de VSR aumentó y fue superior a los niveles observados en la temporada previa; la positividad de influenza fue menor a los niveles observados durante la temporada 2015-2016, para el mismo período.
- **Graph 3.** During EW 35, SARI case counts reported to slightly increased from the previous weeks. / Durante la SE 34, el número de casos de IRAG se reportó en ligero aumento en relación a las semanas previas
- **Graph 4.** During EW 34, pneumonia case counts slightly decreased as compared to recent weeks, and was higher than 2016 season for the same period. / Durante la SE 34, el recuento de casos de neumonía disminuyó ligeramente en comparación a semanas recientes, y fue superior a la temporada 2016 para el mismo período.
- During EW 34, 2017, higher pneumonia cumulative rates (506 cases per 100,000 population) were reported as compared to the rates observed in 2016 season, for EW 34 (446). The highest rates were reported in 3 departments: San Miguel (999), La Union (905), and Usulután (821). / Durante la SE 34 de 2017, se

reportaron mayores tasas acumuladas de neumonía (506 casos por 100.000 habitantes) en comparación a las tasas observadas en la temporada 2016, para la SE 34 (446). Las tasas más elevadas se reportaron en 3 departamentos: San Miguel (999), La Unión (905), y Usulután (821).


- **Graph 5.** During EW 34, SARI case counts from sentinel sites slightly decreased from the previous weeks but remained above the alert threshold. / Durante la SE 34, el recuento de casos de IRAG de sitios centinela disminuyó ligeramente en relación a las semanas previas pero permaneció sobre el umbral de alerta.
- During EW 34, 2017, lower ARI cumulative rates (578 cases per 100,000 population) were reported as compared to the rates observed in EW 33 (680). As of EW 34, 2017, higher cumulative ARI rates were reported (22,529 cases per 100,000 population), as compared levels notified during 2016 season for the same period (21,473 cases per 100,000 population). The highest rates were reported in 3 departments: Chalatenango (30,480), San Salvador (29,013) and Usulután (23,895). / Durante la SE 34 de 2017, se reportaron menores tasas acumuladas de IRA (578 casos por 100.000 habitantes) en comparación a las tasas observadas en la SE 33 (680). Hasta la SE 34 de 2017, se reportaron tasas acumuladas de IRA más elevadas (22.529 casos por 100.000 habitantes), en relación a los niveles notificados durante la temporada 2016 para el mismo período (21.473 casos por 100.000 habitantes). Las tasas más elevadas se reportaron en 3 departamentos: Chalatenango (30.480), San Salvador (29.013) y Usulután (23.895).
- **Graph 6.** During EW 34, the percent positivity for influenza reported to decrease from previous weeks and was below the alert threshold and at the average epidemic curve. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad para influenza se reportó en disminución respecto a las semanas previas y se ubicó por debajo del umbral de alerta y en la curva epidémica promedio.
- **Graph 7.** During EW 34, the percent positivity for RSV reported to increase above the average epidemic curve during the last 8 weeks, and was above the alert threshold from EW 32 to EW 34. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad para VSR se reportó en aumento sobre la curva epidémica promedio durante las últimas 8 semanas, y se ubicó por encima del umbral de alerta desde la SE 32 hasta las SE34.

Graph 1. El Salvador: Influenza virus distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza, SE 34, 2014-17




Graph 3. El Salvador: SARI hospitalizations, by EW, 2016-2017.EW 35.

Número de hospitalizaciones por IRAG, por SE, 2016- 2017.SE 35




Graph 2. El Salvador: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17

Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17




Graph 4. El Salvador: Number of pneumonia cases, by EW, 2016-2017.EW 34.


Número de casos neumonía, por SE, 2016- 2017.SE 34




Graph 5. El Salvador: SARI cases endemic channel, EW 34, 2017.
Corredor endémico de casos IRAG, SE 34, 2017



Graph 6. El Salvador: Baseline for the percent positivity for influenza, 2017 (in comparison to 2010-2016)
Linea basal para el porcentaje de positividad de influenza, 2017 (en comparación a 2010-2016)




Graph 7. El Salvador: Baseline for the percent positivity for RSV, 2017 (in comparison to 2010-2016)
Linea basal para el porcentaje de positividad de VSR, 2017 (en comparación a 2010-2016)




Guatemala

- Graph 1.** During EW 34, influenza detections decreased with influenza positivity less than 1% and with influenza B and A(H3N2) co-circulating in recent weeks. The influenza proportion was similar to previously reported levels from 2015-2016 season for the same period. / Durante la SE 34, las detecciones de influenza disminuyeron con positividad de influenza menor a 1% y con co-circulación de influenza B y A(H3N2) en semanas recientes. La proporción de influenza fue similar a los niveles reportados de la temporada 2015-2016, para el mismo período.
- Graph 2.** During EW 34, RSV positivity increased from levels in previous weeks / Durante la SE 34, la positividad de VSR aumentó en relación a los niveles de semanas previas.
- Graph 3.** During EW 33, 2017 the percent of SARI hospitalizations decreased from previous weeks. / Durante la SE 33, el porcentaje de hospitalizaciones por IRAG disminuyó en relación a las semanas previas.
- Graph 4.** During EW 33, 2017 the percent of ILI cases among all consultations decreased as compared to previous weeks. / Durante la SE 33, el porcentaje de casos de ETI sobre el total de consultas disminuyó en relación a las semanas previas.
- Graph 5.** During EW 35, the percent positivity for influenza reported to slightly decrease from previous weeks below the average epidemic curve and the alert threshold. / Durante la SE 35, el porcentaje de positividad para influenza se reportó en ligero descenso respecto a las semanas previas debajo de la curva epidémica promedio y el umbral de alerta.

Graph 1. Guatemala. Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de influenza SE 34, 2014-17




Graph 2. Guatemala: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2015-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2015-17




Graph 3. Guatemala: Percent of SARI hospitalizations, by EW, 2016- 2017.EW 33.

Porcentaje de hospitalizaciones IRAG, por SE, 2016- 2017.SE 33




Graph 4. Guatemala: Percent of ILI cases per total consultations, by EW, 2016- 2017.EW 33.

Porcentaje de casos ETI por todas consultas, por SE, 2016- 2017.SE 33



Graph 5. Guatemala : Baseline for the percent positivity for influenza, 2017 (in comparison to 2010-2016)
Linea basal para el porcentaje de positividad de influenza, 2017 (en comparación a 2010-2016)


Porcentaje de positividad para influenza para Guatemala durante 2017, en comparación al período 2011-2016. SE1 a 52.




Honduras

- Graph 1.** During EW 34, slightly decreased influenza activity was reported; influenza A(H3N2) predominated in recent weeks. / Durante la SE 34, se reportó un ligero descenso de la actividad de influenza; predominó influenza A(H3N2) en semanas recientes.
- Graph 2.** As of EW 34, influenza percent positivity and RSV positivity slightly decreased to less than 1%; the percent positivity was higher than levels observed during 2016 for the same period. / Durante la SE 34 la positividad de influenza y la positividad de VSR disminuyeron ligeramente a menos de 1%; el porcentaje de positividad fue superior a los niveles observados durante 2016 para el mismo período.
- Graph 3.** During EW 34, the percent positivity for influenza reported to decrease from previous weeks and was below the alert threshold and the average epidemic curve. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad para influenza se reportó en disminución respecto a las semanas previas y se ubicó por debajo del umbral de alerta y la curva epidémica promedio.

Graph 1. Honduras. Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de influenza SE 34, 2014-17




Graph 2. Honduras: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17



Graph 3. Honduras : Baseline for the percent positivity for influenza, 2017 (in comparison to 2010-2016)
Linea basal para el porcentaje de positividad de influenza, 2017 (en comparación a 2010-2016)


Porcentaje de positividad de influenza para Honduras durante el año 2017, en relación al período 2010-2016 (excluyendo 2015)




Nicaragua

- **Graph 1.** During EW 34, influenza activity increased (25% positivity), with influenza A(H3N2) and B predominating. / Durante la SE 34, la actividad de influenza aumentó (25% de positividad) con predominio de influenza A(H3N2) y B.
- **Graph 2.** As of EW 34, influenza positivity slightly increased in comparison to previous weeks, and was higher than the 2015-2016 season for the same period. / Durante la SE 34, la positividad de influenza aumentó ligeramente, en comparación a las semanas previas, y se ubicó por encima de los niveles registrados en la temporada 2015-2016 para el mismo período.
- **Graph 3.** During EW 34, 2017, lower pneumonia rates (5 cases per 10,000 population) were reported as compared to the rates observed in the previous week, below the average epidemic curve. ⁴ / Durante la SE 34 de 2017, se reportaron menores tasas de neumonía (5 casos por 10.000 habitantes) en comparación con la semana previa, por debajo de la curva epidémica promedio.
- **Graph 4.** During EW 34, 2017, lower ARI rates (600 cases per 10,000 population) were reported as compared to the rates observed in the previous week, below the alert threshold. / Durante la SE 34 de 2017, se reportaron menores tasas de neumonía (600 casos por 10.000 habitantes) en comparación a las tasas observadas en la semana previa, debajo del umbral de alerta.


Graph 1. Nicaragua. Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de influenza SE 34, 2014-17




Graph 2. Nicaragua: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2015-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2015-17



Graph 3. Nicaragua: Pneumonia Rate 2017 (x10,000 pop) by EW compared to years 2007-2016 (excluding 2009)
Nicaragua: Tasa de neumonías 2017 (x 10,000 hab) por SE comparado con años 2007-2016 (excluido 2009)



Graph 4. Nicaragua: ARI Rate 2017 (x10,000 pop) by EW compared to years 2007-2016 (excluding 2009)
Nicaragua: Tasa de IRAs 2017 (x 10,000 hab) por SE comparado con años 2007-2016 (excluido 2009)




Panama


- **Graph 1.** During EW 34, few influenza detections were reported, with an increasing percent positivity. / Durante la SE 34, se ha reportado contadas detecciones de influenza con un porcentaje de positividad en ascenso.
- **Graph 2.** During EW 34, influenza positivity slightly decreased to 14% and RSV positivity remained lower than levels observed during the 2015-2016 season for the same period / Durante la SE 34, la positividad de influenza disminuyó ligeramente a 14% y la positividad de VSR permaneció por debajo de los niveles observados durante la temporada 2015-2016 para el mismo período.
- **Graph 3.** During EW 34, the percent positivity for influenza slightly decreased from previous weeks and was below the alert threshold and above the average epidemic curve. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad para influenza se reportó en ligero descenso respecto a las semanas previas y se ubicó debajo del umbral de alerta y sobre la curva epidémica promedio.

⁴ Weekly report available [here](#)


Graph 1. Panama. Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de influenza SE 34, 2014-17



Graph 2. Panama: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2015-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2015-17




Graph 3. Panama : Baseline for the percent positivity for influenza, 2017 (in comparison to 2010-2016)
Linea basal para el porcentaje de positividad de influenza, 2017 (en comparación a 2010-2016)




Bolivia

- Graph 1.** During EW 34, in La Paz, slightly increased influenza activity was reported (~10%), with few detections and influenza A(H3N2) predominating. / Durante la SE 34, en La Paz, se ha reportado actividad ligeramente aumentada de influenza (~10%), con escasas detecciones y predominio de influenza A(H3N2).
- Graph 2.** As of EW 34, the percent positivity for influenza and for RSV were lower than the previous season for the same period. / Durante la SE 34, el porcentaje de positividad para influenza y para VSR fueron menores que los registrados en la temporada previa para el mismo período.
- Graph 3.** As of EW 34, the number of SARI cases was reported to be below the alert threshold and the average epidemic curve for this season. / Durante la SE 34, el número de casos de IRAG se reportó por debajo del umbral de alerta y de la curva epidémica promedio para esta temporada.
- Graph 4.** As of EW 34, in Santa Cruz, influenza activity slightly decreased with influenza B predominating. / Durante la SE 34, en Santa Cruz, la actividad de influenza aumentó ligeramente con predominio de influenza B.
- Graph 5.** As of EW 34, in Santa Cruz, influenza positivity increased to 5% from previous weeks. / Durante la SE 34, en Santa Cruz, la positividad de influenza aumentó a 5% en relación a semanas previas.
- Graph 6.** During EW 34, in Santa Cruz, SARI cases decreased from previous weeks and were below the seasonal threshold. / Durante la SE 34, en Santa Cruz, los casos de IRAG disminuyeron en relación a las semanas previas por debajo del umbral estacional.


Graph 1. Bolivia INLASA (La Paz). Influenza virus distribution EW 34, 2014-17




Graph 2. Bolivia INLASA (La Paz): Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17




Graph 3. Bolivia INLASA (La Paz): SARI baseline, EW 34, 2014-17




Graph 4. Bolivia CENETROP (Santa Cruz). Influenza virus distribution EW 34, 2014-17



Graph 5. Bolivia CENETROP (Santa Cruz): Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17




Graph 6. Bolivia CENETROP (Santa Cruz): SARI baseline, EW 34, 2014-17




- **Graph 1.** During EW 34, influenza activity slightly decreased to 5% positivity, with co-circulation of influenza A(H3N2) and B. / Durante la SE 34, la actividad de influenza disminuyó ligeramente a 5% de positividad, con co-circulación de influenza A(H3N2) y B.
- **Graph 2.** As of EW 34, RSV positivity and influenza positivity remained at similar levels as compared to previous weeks. Influenza and RSV counts were lower than levels observed during the 2015-2016 season. / En la SE 34, la positividad de VSR y la positividad de influenza permanecieron a niveles similares de las semanas previas. Los recuentos de influenza y VSR fueron menores que los niveles observados durante el período 2015-2016.
- **Graph 3.** During EW 35, SARI/ILI activity decreased as compared to prior weeks and was below the levels observed in 2016 for the same period. / Durante la SE 34, la actividad de ETI/IRAG disminuyó en comparación a las semanas previas y se ubicó por debajo de los niveles observados en 2016 para el mismo período.
- **Graph 4.** During EW 35, counts of pneumonia cases slightly decreased and were within levels observed in prior years. / Durante la SE 35, los casos de neumonía disminuyeron ligeramente y fueron similares a los observados en años previos.
- **Graph 5.** As of EW 35, the ARI rate slightly decreased as compared to previous weeks, and was similar to those observed in previous years (2015-2016). / En la SE 35, la tasa de IRA disminuyó ligeramente en comparación a las semanas previas, y fue similar a los niveles observados en años previos (2015-2016).
- **Graph 6.** During EW 34, ARI mortality rates in children under 5 years of age was 6.8 per 100,000 children under 5; three states reported the highest rates: Vichada (86.7), Guainía (75.5), and Chocó (27.6). / En la SE 34, la mortalidad por IRA en niños menores de 5 años fue 6,8 por cada 100.000 menores de 5 años de edad; tres estados reportaron las tasas más elevadas: Vichada (86.7), Guainía (75.5), y Chocó (27.6).
- **Graph 7.** As of EW 34⁵, the ARI-related deaths reported among children under 5 years of age (n=9) were similar to those observed in previous weeks and 294 ARI-related cumulative deaths were reported in children under 5 during 2017. During EW 34, the highest ARI-related deaths were reported in North of Santander and Valle del Cauca. / En la SE 34, las muertes asociadas a IRA en niños menores de 5 años (n=9) fueron similares a las observadas en semanas previas y un total de 294 muertes asociadas a IRA fueron notificadas en niños menores de 5 en 2017. Durante la SE 34 las tasas más elevadas de muertes asociadas a IRA en relación a las temporadas previas fueron reportadas en el norte de Santander y Valle del Cauca.


Graph 1. Colombia. Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza SE 34, 2014-17




Graph 3. Colombia: Number of SARI cases, EW 35, 2017
Número de casos IRAG, SE 35, 2017



Graph 2. Colombia: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17




Graph 4. Colombia: Number of pneumonia-related hospitalizations, by EW 35, 2017 (in comparison with 2012-16)
Número de hospitalización asociado a neumonía, por SE 35, 2017 (en comparación con 2012-16)




⁵ Report available at: <http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Paginas/default.aspx>

Graph 5. Colombia: Number of ARI cases (from all consultations), by EW 35, 2017 (in comparison with 2012-16)
Número de los casos IRA (de todas consultas), por SE 35, 2017 (en comparación con 2012-16)



Graph 6. Colombia: ARI-related deaths rates in children under 5 years of age, by EW 34, 2017
Mortalidad por IRA en niños menores de 5 años, por SE 34, 2017.




Graph 7. Colombia: ARI-related deaths reported among children under 5 years of age by territorial entity, EW 34, 2017, as compared to 2014-2016.




Ecuador

- Graph 1.** During EW 34, influenza activity remained at levels similar to prior weeks (~7% positivity), but with overall few detections; influenza B predominated. / Durante la SE 34, la actividad de influenza permaneció a niveles similares de semanas previas (~7% de positividad), pero con escasas detecciones en general; influenza B predominó.
- Graph 2.** As of EW 34, the influenza proportion slightly increased and RSV proportion increased to 5% positivity, as compared to prior weeks. / En la SE 34, la proporción de influenza aumentó ligeramente y la proporción de VSR aumentó hasta 5% de positividad, en relación a las semanas previas.
- Graph 3.** During EW 35, SARI percent positivity was lower than levels from 2011-2016 seasons for the same period. / Durante la SE 35, el porcentaje de positividad por IRAG fue bajo en relación a los niveles de las temporadas 2011-2016 para el mismo período.
- Graph 4.** During EW 35, pneumonia case counts decreased from recent weeks and was lower than levels from 2013-2016 seasons for the same period. / Durante la SE 35, el recuento de casos de neumonía descendió en relación a semanas recientes y fue menor a los niveles de temporadas 2013-2016 para el mismo período.


Graph 1. Ecuador: Influenza virus distribution by EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza por SE 34, 2014-17




Graph 2. Ecuador: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17



Graph 3. Ecuador: Percentage of SARI cases out of all hospitalizations, by EW 35, 2017 (in comparison with 2011-16)
Porcentaje de casos IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE 35, 2017 (en comparación con 2011-16)




Graph 4. Ecuador: Pneumonia case counts, by EW 35, 2017 (in comparison with 2013-16)
Recuento de casos de neumonía, por SE 35, 2017 (en comparación con 2013-16)




- **Graph 1.** During EW 34, influenza A(H3N2) predominated, with positivity slightly decreasing to less than 1% this week. / Durante la SE 34, influenza A(H3N2) predominó, con ligera disminución de la positividad a menos de 1% durante esta semana.
- **Graph 2.** As of EW 34, influenza positivity (1%) slightly decreased and RSV slightly decreased to 2%, as compared to prior weeks. Influenza and RSV counts were lower than levels observed during the 2015-16 season. / Durante la SE 34 la positividad de influenza (1%) disminuyó ligeramente y la de VSR disminuyó ligeramente a 2%, en comparación a semanas previas. Los recuentos de influenza y de VSR fueron menores a los niveles observados en la temporada 2015-2016.
- **Graph 3.** During EW 34, ARI activity among children under 5 years of age slightly increased but remained within expected levels. / Durante la SE 34, la actividad de IRA entre los niños menores de 5 años aumentó ligeramente pero se encuentra dentro de lo esperado.
- **Graph 4,5.** During EW 34, pneumonia cases slightly decreased from the prior week and below the alert threshold with the highest rates in the Eastern (Madre de Dios) and Northern/Northwestern (Arequipa, Ucayali) regions for the year 2017. Ucayali reported the highest cumulative incidence rate at 180 cases (per 10,000 cases). During EW 34, one department reported pneumonia cases above its specific alert threshold: Tumbes. / Durante la SE 34, los casos de neumonía disminuyeron ligeramente en relación a la semana previa y bajo del umbral de alerta con las tasas más altas en las regiones este (Madre de Dios) y norte/noroeste (Arequipa, Ucayali) para el año 2017. Ucayali ha reportado la tasa de incidencia acumulada más alta con 180 casos (por 10.000 casos). Durante la SE 34, un departamento reportó casos de neumonía sobre su umbral de alerta específico: Tumbes.
- **Graph 6.** During EW 34, eleven departments reported pneumonia rates among children under 5 years of age to be higher than the pneumonia rates at national level (63 per 10,000 population): Amazonas, Arequipa, Callao, Huanuco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tumbes and Ucayali. / Durante la SE 34, once departamentos reportaron tasas de neumonía en niños menores de 5 años mayores a la tasa de neumonía a nivel nacional (63 por 10.000 habitantes): Amazonas, Arequipa, Callao, Huanuco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tumbes y Ucayali.

Graph 1. Peru: Influenza virus distribution by EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza por SE 34 2014-17




Graph 2. Peru: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17




Graph 3. Peru. ARI endemic channel in children under 5 years, by EW 34, 2017

Canal de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en menores de 5 años, Perú 2017*




Graph 4 Peru: Map of pneumonia cases and deaths in children under 5 years, by EW 34, 2017


Mapa de Riesgo para neumonía y sus defunciones en niños menores de 5 años, Perú 2017*



Graph 5. Peru: Pneumonia endemic channel in children under 5 years, by EW 34, 2017



Graph 6. Peru: Pneumonia cumulative incidence in children under 5 years, by department. EW 34




Argentina

- **Graph 1.** As of EW 33, estimated ILI activity decreased and remained within expected levels in the epidemic channel (security zone) as compared to previous years. During EW 33, all regions reported decreased ILI cases below its specific seasonal threshold, as compared to the 2012-2016 period⁶. / Durante la SE 33, la actividad estimada e ETI disminuyó y permaneció dentro de los niveles esperados del canal epidémico (zona de seguridad), en comparación a los años previos. Durante la SE 33, todas las regiones reportaron menos casos de ETI por debajo de su umbral estacional específico, en comparación con el período 2012-2016.
- **Graph 2.** As of EW 33, estimated SARI activity decreased from levels observed in previous weeks and was at the alert threshold. / Durante la SE 33, la actividad estimada de IRAG disminuyó en relación a los niveles observados en semanas previas y se ubicó en el umbral de alerta.
- **Graph 3.** As of EW 33, estimated pneumonia activity decreased from levels observed in previous weeks, and were at expected levels in the epidemic channel (security zone); most cases were among children under 5 years of age. During EW 33, all five regions reported lower pneumonia cumulative rates, as compared to the 2016-2017 season for the same period. / Durante la SE 33, la actividad estimada de neumonía disminuyó en relación a los niveles observados en semanas previas, y se ubicó dentro de los niveles esperados del corredor endémico (zona de seguridad); la mayoría de los casos se registraron en niños menores de 5 años. Durante la SE 33, todas las cinco regiones reportaron menores tasas acumuladas de neumonía, en comparación a las observadas en la temporada 2016-2017 para el mismo período.
- **Graph 4.** As of EW 33, estimated bronchiolitis activity among children under 2 years of age slightly decreased and remained within expected levels in the epidemic channel (security zone) as compared to previous years. All the five regions reported lower bronchiolitis cumulative rates, as compared to the 2016 season for the same period. / Durante la SE 33, la actividad estimada de bronquiolitis en niños menores de 2 años disminuyó ligeramente y permaneció dentro de los niveles esperados del canal endémico (zona de seguridad) en comparación a años previos. Todas las cinco regiones reportaron menores tasas acumuladas de bronquiolitis, en comparación a la temporada 2016-2017 para el mismo período.
- **Graph 5.** During EW 34, influenza activity continued to decrease, with 2.5% positivity; influenza A(H3N2) and B co-circulated. / Durante la SE 34, la actividad de influenza continuó en descenso, con 2,5% de positividad; co-circularon influenza A(H3N2) e influenza B.
- **Graph 6.** As of EW 34, influenza positivity slightly decreased and RSV positivity slightly decreased and both were higher than levels reported in prior weeks and similar to the prior season. / Durante la SE 34, la positividad de influenza disminuyó ligeramente y la positividad de VSR disminuyó ligeramente, y ambos fueron superiores a los niveles reportados en las semanas previas y similares a la temporada anterior.
- **Graph 7.** From EW 1 to EW 33, 2017, 92 influenza-associated deaths were reported in 15 provinces: Buenos Aires (26), Buenos Aires City (31), Córdoba (4), Entre Ríos (1), Santa Fe (9), Misiones (1), Salta (3), Santiago del Estero (1), Tucumán (1), Mendoza (1), Chubut (1), La Pampa (1), Neuquén (2), Rio Negro (9), and Santa Cruz (1). 60 cases were influenza A(H3N2) positive and 30 influenza A(unsubtyped), mostly among persons 50 years of age and older, 94.5% reported comorbidities and 61.92% without influenza vaccine history. Influenza-associated deaths during the 2017 season (n=92) were lower than levels observed during the 2016 season (n=250) for the same period. / Desde la SE1 a la SE 33 de 2017, se reportaron 92 muertes asociadas a influenza en 15 provincias: Buenos Aires (26), Buenos Aires City (31), Córdoba (4), Entre Ríos (1), Santa Fe (9), Misiones (1), Salta (3), Santiago del Estero (1), Tucumán (1), Mendoza (1), Chubut (1), La Pampa (1), Neuquén (2), Rio Negro (9) y Santa Cruz (1). 60 casos resultaron positivos para influenza A(H3N2) y 30 influenza A(sin subtipificar), en su mayoría en mayores de 50 años, 94,5% reportaron comorbilidades y 61,922% sin antecedente de vacunación antigripal. Las muertes asociadas a influenza durante la temporada 2017 (n=92) fueron menores que los niveles observados durante la temporada 2016 (n=250) para el mismo período.


⁶ Report available at: <http://www.msal.gob.ar/index.php/home/boletin-integrado-de-vigilancia>

Graph 1. Argentina. ILI cases. Endemic channel, EW 33, 2017
Gráfico 1 - Argentina: Corredor endémico semanal de ETI 2017. Curva de casos y estimaciones hasta la SE33. Total país. Históricos 5 años: 2012 a 2016.



Graph 2. Argentina. SARI cases. Endemic channel, EW 33, 2017


Gráfico 2. Argentina: Corredor endémico semanal de IRAG. Curva de 2017 hasta SE33. Históricos 5 años: 2012 a 2016.



Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2.


Graph 3. Argentina. Pneumonia cases. Endemic channel, EW 33, 2017

Gráfico 3. Argentina: Corredor endémico semanal de Neumonía 2017. Curva de casos y estimaciones hasta la SE33. Total país. Históricos 5 años: 2012 a 2016.




Graph 4. Argentina. Bronchiolitis cases. Endemic channel, EW 33, 2017.


Gráfico 4. Argentina: Corredor endémico semanal de Bronquiolitis 2017. Curva de casos y estimaciones hasta la SE33. Total país. Históricos 5 años: 2012 a 2016.




Graph 5. Argentina. Influenza virus distribution by EW 33, 2014-17
Distribución de virus influenza por SE 33, 2014-17



Graph 6. Argentina: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17



Graph 7. Argentina: Influenza-associated deaths by EW. EW 1 to EW 33, 2017. Muertes asociadas a influenza por SE. SE 1 a 33, 2017. (n=92)




Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de Epidemiología en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) SIVILA - C2 - UCIRAG.

Brazil


- Graph 1-3.** During EW 34, SARI hospitalizations slightly increased. The case fatality proportion among all SARI hospitalizations was 13.2% (2,233 SARI-related deaths/ 16,917 SARI-related hospitalizations), which was higher than the levels reported in previous seasons for the same period. Overall, 79.8% (n=288) of deaths were reported to have underlying risk-factors. Most SARI cases were reported in the southwest region of Brazil, most highly concentrated in Sao Paulo/ Durante la SE 34, las hospitalizaciones asociadas a IRAG aumentaron ligeramente. La proporción de casos fallecidos entre las hospitalizaciones por IRAG fue 13,2% (2.233 muertes asociadas a IRAG/ 16.917 hospitalizaciones por IRAG) que son superiores a los niveles observados en temporadas anteriores para el mismo período. En general, 79,8% (n=288) de todos los fallecidos presentaban factores de riesgo. La mayoría de los casos asociados a IRAG han sido reportados en la región suroeste de Brasil, principalmente provenientes de Sao Paulo.

- **Graph 4,5.** The cumulative number of SARI cases (16,917) and deaths (2,233) as of EW 34 was reported to be above the levels in 2015 and lower than 2016. / Los casos (16.917) y fallecidos (2.233) acumulados asociados a IRAG hasta la SE 34 han sido por encima de los niveles notificados en 2015 y menores a los de 2016.
- **Graph 6,7.** The cumulative number of influenza-positive SARI cases and deaths as of EW 34 was reported to be slightly higher than the levels in 2014-2015, but lower than 2016. / Los casos y fallecidos acumulados asociados a IRAG positivos para influenza hasta la SE 34 se han reportado ligeramente superiores a los niveles observados en 2014-2015, pero menores que en 2016.
- **Cumulative SARI Cases (Flu+):** During EW 34, four states reported higher cumulative influenza-positive SARI cases than the 2016 season: Amazonas (6), Pernambuco (16), Piauí (1), and Tocantins (1). / **Casos acumulados de IRAG (flu+):** Durante la SE 34, cuatro estados reportaron casos acumulados de IRAG positivos para influenza mayores a los observados en la temporada 2015-2016: Amazonas (6), Pernambuco (16), Piauí (1), y Tocantins (1).
- **Cumulative SARI Deaths (Flu+):** During EW 34, 2017, one state reported higher cumulative influenza-positive SARI deaths than the 2016 season: Tocantins (1). / **Fallecidos acumulados de IRAG (flu+):** Durante la SE 34, 2017, un estado reporto mayor número de muertes por IRAG positivas para influenza acumuladas que en la temporada 2015-2016: Tocantins (1).
- **Graph 8.** During EW 34, influenza activity slightly increased, with 24% positivity and influenza B predominated. / Durante la SE 34, la actividad de influenza aumentó, con 24% de positividad y predominio de influenza B.
- **Graph 9.** As of EW 34, influenza positivity slightly increased and RSV positivity among ILI cases slightly decreased, as compared to levels from the previous weeks. / Durante la SE 34, la positividad de influenza aumentó ligeramente y la positividad de VSR entre los casos de ETI disminuyó ligeramente, en relación a los niveles de las semanas previas.
- **Graph 10.** As of EW 34, ILI case counts decreased, as compared to previous weeks, and to levels observed in the prior season for the same period. / Durante la SE 34, el recuento de casos de ETI disminuyó, en comparación a las semanas previas, y a los niveles observados en la temporada previa para el mismo período.

Graph 1. Brazil. Cumulative case fatality proportion for SARI cases (%) by EW. 2014-2017 period. EW 34.
Proporción de casos fatales de IRAG acumulados (%). Período 2014-2017. EW 34.




Graph 3. Brazil. SARI-related deaths, by EW 34, 2017
Distribución de fallecidos por IRAG, por SE 34, 2017




Fonte: SINAN Influenza Web. Dados atualizados em 28/8/2017, sujeitos a alteração.

Graph 2. Brazil. SARI-related hospitalizations, by EW 34, 2017
Hospitalizaciones asociadas con IRAG, por SE 34, 2017




Fonte: SINAN Influenza Web. Dados atualizados em 28/8/2017, sujeitos a alteração.

Graph 4. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related cases, by EW 34 2017
Distribución de casos acumulados de IRAG, por SE 34, 2017




Graph 5. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related deaths, by EW 34, 2017

Distribución de fallecidos acumulados de IRAG, por SE 34, 2017




Graph 7. Brazil. Distribution of cumulative flu(+) SARI-related deaths, by EW 34, 2017

Distribución de flu (+) fallecidos acumulados de IRAG, por SE 34, 2017




Graph 9. Brazil- ILI: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2017
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2017




Graph 6. Brazil. Distribution of cumulative flu(+) SARI-related cases, by EW 34, 2017


Distribución de flu(+) casos acumulados de IRAG, por SE 34, 2017



Graph 8. Brazil- ILI. Influenza virus distribution by EW 34, 2017
Distribución de virus influenza por SE 34, 2017



Graph 10. Brazil- Number of ILI cases, EW 35, 2017
Número de casos ETI, SE 35 2017




Chile


- **Graph 1,2.** During EW 34, ILI activity slightly decreased below the alert threshold and the average epidemic curve. / Durante la SE 34, la actividad de ETI disminuyó ligeramente por debajo del umbral de alerta y la curva epidémica promedio.
- **Graph 3.** During EW 34, the percentage of hospital emergency visits for ILI slightly decreased below the season threshold and was similar from levels observed in previous weeks. / Durante la SE 34, el porcentaje de consultas de urgencia hospitalaria por ETI disminuyó ligeramente por debajo del umbral estacional y fue similar a los niveles observados en semanas previas.
- **Graph 4.** During EW 34, the proportion of SARI cases among all hospitalizations decreased from the prior week/ Durante la SE 34, la proporción de casos de IRAG sobre el total de hospitalizaciones disminuyó en relación a la semana previa
- **Graph 5.** During EW 34, the percentage of hospital emergency visits for pneumonia slightly decreased below the season threshold and was lower than levels observed in previous weeks. / Durante la SE 34, el porcentaje de consultas de urgencia hospitalaria por neumonía disminuyó ligeramente por debajo del umbral estacional y fue menor a los niveles observados en semanas previas.
- **Graph 6.** During EW 34, influenza detections slightly decreased from the previous week with 5% positivity reported, with influenza A(H3N2) and B co-circulating. / Durante la SE 34, las detecciones de influenza disminuyeron ligeramente de la semana previa con 5% de positividad reportada, con co-circulación de influenza A(H3N2) y B.
- **Graph 7,8.** During EW 34, influenza proportion slightly decreased (5%) and RSV activity remained moderate with decreased positivity of 20%. / Durante la SE 34, la proporción de influenza disminuyó ligeramente (5%) y la actividad de VSR se mantiene moderada con disminuida positividad de 20%.

- **Graph 9.** During EW 34, the number of ILI cases slightly decreased from levels observed in previous weeks and was lower than the previous season for the same period. / Durante la SE 34, el número de casos de ETI disminuyó ligeramente en relación a los niveles observados en semanas previas y fue menor a la temporada anterior para el mismo período.
- **Graph 10.** During EW 34, Aisén region reported higher ILI case counts as compared to previous seasons. Most of the cases were reported among children less than 14 years of age. / Durante la SE 34, la región de Aisén reportó un incremento de casos de ETI en comparación con las temporadas previas. La mayoría de los casos fueron reportados en el grupo de menores de 14 años de edad.
- **Graph 11.** During EW 34, Aisén region reported decreased RSV positive samples as compared to previous weeks. / Durante la SE 34, la región de Aisén reportó un descenso de muestras positivas para VSR, en comparación a las semanas previas.
- **Graph 12.** During EW 35, Aisén region reported a decrease trend of SARI case counts as compared to previous weeks. Most of the cases were reported among children less than 1 year old. / Durante la SE 35, la región de Aisén reportó una tendencia decreciente de casos de IRAG en comparación con las semanas previas. La mayoría de los casos fueron reportados en el grupo de menores de 1 año.


Graph 1. Chile. ILI rate in primary care, EW 34, years 2013-2017




Graph 3. Chile. Percentage of hospital emergency visits for ILI, by EW 34, 2017, in comparison to 2012-16




Graph 5. Chile. Percentage of hospital emergency visits for pneumonia, by EW 34, 2017, in comparison to 2012-16




Graph 2. Chile. ILI rate, Alert threshold by EW 34, 2017; in comparison to 2012-2016




Graph 4. Chile. Percent of SARI cases from all hospitalizations, EW 34, 2015-2017, Percentaje de casos IRAG por las hospitalizaciones totales, SE 34, 2015-2017




Graph 6. Chile: Influenza virus distribution by EW 34, 2014-17 Distribución de virus de influenza, por SE 34, 2014-17




Graph 7. Chile: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17



Graph 9. Chile. Number of ILI cases, EW 34, 2017 in comparison 2015-16
Número de casos ETI, SE 34, 2017, en comparación 2015-16




Graph 8. Chile. SARI cases with samples positive for influenza and RSV, EW 34 2017 in comparison 2015-16
Casos IRAG con muestras positivas por influenza y VSR, SE 34 2017, en comparación 2015-16



Graph 10. Chile. ILI cases, Aisén region, EW 34, 2017 in comparison to 2012-16
Casos ETI, región de Aisén, SE 34, 2017, en comparación a 2012-16



Graph 11. Chile. Influenza and ORV distribution, Aisén region, EW 34 2017.
Distribución de influenza y otros virus respiratorios, región de Aisén, SE 34 2017.



Graph 12. Chile. SARI cases, Aisén region, EW 35, 2017 by age group
Hospitalizaciones por Causa Respiratoria, por grupo etario, Región de Aysén, por Chile 2017




Paraguay


- Graph 1.** During EW 33, ILI activity slightly increased, as compared to the prior week and was below the alert threshold and at the average epidemic curve. / Durante la SE 33, la actividad de ETI aumentó ligeramente, en comparación con la semana previa y se ubicó por debajo del umbral de alerta y en la curva epidémica promedio.
- Graph 2, 3.** During EW 33, SARI activity slightly increased below the alert threshold with the percent of SARI cases among all hospitalizations lower than prior weeks. / Durante la SE 33, la actividad de IRAG aumentó ligeramente por debajo del umbral de alerta con el porcentaje de casos de IRAG sobre el total de hospitalizaciones a niveles menores que en las semanas previas.
- Graph 4.** During EW 33, the number of pneumonia cases slightly decreased from previous weeks and remained at similar levels reported during 2016 for the same period. / Durante la SE 33, el número de casos de neumonía disminuyó ligeramente en relación a las semanas previas y permaneció a niveles similares reportados durante el mismo período de 2016.
- Graph 5.** During EW 33, the number of ARI cases slightly increased from previous weeks and remained at similar levels reported during 2016 for the same period. / Durante la SE 33, el número de casos de neumonía aumentó ligeramente en relación a las semanas previas y permaneció a niveles similares reportados durante el mismo período de 2016.
- Graph 6,7.** During EW 34, RSV case-counts remained at low levels. Influenza activity slightly decreased in EW 34, with 5% positivity and influenza A(H3N2) and B co-circulating. The number of influenza positive

samples was slightly lower than levels observed during 2016. / Durante la SE 34, los casos de VSR asociados con IRAG permanecieron a niveles bajos. La actividad de influenza disminuyó ligeramente en SE 34, con 5% de positividad y co-circulación de influenza A(H3N2) y B. El número de muestras positivas de influenza fue ligeramente menor que los niveles observados durante 2016.


Graph 1. Paraguay: Proportion of ILI consultations, EW 33, 2017




Graph 2. Paraguay: Distribution of SARI cases EW 33, 2017




Graph 3. Paraguay: Number of SARI cases per total hospitalizations, EW 33, 2017
Número de casos IRAG por total hospitalizaciones, SE 33, 2017




Graph 4. Paraguay: Number of cases for pneumonia, EW 33, 2017
Número de casos de neumonía, SE 33, 2017




Graph 5. Paraguay: Number of cases for ARI, EW 33, 2017
Número de casos de IRA, SE 33, 2017



Graph 6. Paraguay: Influenza virus distribution EW 34, 2014-17
Distribución de virus de influenza, SE 34, 2014-17



Graph 7. Paraguay: Influenza and RSV distribution, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR, SE 34, 2014-17



Uruguay


- Graph 1.** As of EW 34, the proportion of SARI-related ICU admissions slightly decreased and SARI-related hospitalizations remained similar from levels observed in previous weeks and were mainly among children under 5 years of age⁷. Overall, from EW 1 to EW 34, 26% of SARI hospitalizations (n=277) and 44% of SARI-related UCI admissions (n=97) had underlying comorbidities. / Hasta la SE 34, la proporción de ingresos a UCI asociados a IRAG y las hospitalizaciones por IRAG aumentaron ligeramente respecto a los niveles observados en semanas previas y se reportaron principalmente en niños menores de 5 años. En general,

⁷ Data available at: <http://colo1.msp.gub.uy/epidemiologia/servlet/iraggrafmenu>


desde la SE 1 hasta la SE 34, 26% de las hospitalizaciones por IRAG (n=277) y 44% de las admisiones a UCI por IRAG (n=97) presentaron comorbilidades asociadas.

- **Graph 2.** There was slightly decreased activity of RSV but remained moderate as of EW 34, with 30% positivity; and influenza detections slightly increased (2% positivity). / Se observó una ligera disminución de la actividad de VSR pero se mantiene moderada a la SE 34, con 30% de positividad; y las detecciones de influenza aumentaron ligeramente (2% de positividad).
- **Graph 3.** During EW 34, there was similar influenza activity among SARI cases as compared to previous weeks, with influenza A(H3N2) predominating / Durante la SE 34, se registró una actividad de influenza entre los casos de IRAG similar a la observada en las semanas previas, con predominio de influenza A(H3N2).
- **Graph 4.** During EW 29, the percentage of SARI cases decreased from levels observed in previous weeks. / Durante la SE 29, el porcentaje de casos de IRAG disminuyó en relación a los niveles observados en semanas previas.


Graph 1. Uruguay: % SARI & ICU admissions by EW 34, 2017
Proporción de IRAG en ingresos hospitalarios e ingresos a UCI y defunciones hospitalarias



Graph 2. Uruguay IRAG: Influenza and RSV distribution among SARI cases, EW 34, 2014-17
Distribución de virus influenza y VSR entre casos de IRAG, SE 34 2014-17



Graph 3. Uruguay: Influenza virus distribution among SARI cases by EW 34, 2017
Distribución de virus de influenza entre casos de IRAG, por SE 34, 2017



Graph 4. Uruguay: Percent of SARI cases per total hospitalizations, EW 29, 2017
Porcentaje de casos IRAG por total hospitalizaciones, SE 29, 2017




In the temperate zone of the southern hemisphere and in some countries of South and South East Asia, high levels of influenza activity continued to be reported. In Central America and the Caribbean influenza activity continued to be reported in a few countries. Influenza activity remained at low levels in the temperate zone of the northern hemisphere. Worldwide, influenza A(H3N2) viruses are predominating. / En la zona templada del hemisferio sur y en algunos países del Sur y Sudeste asiático, elevados niveles de actividad de influenza continúan siendo reportados. En América central y el Caribe continuó reportándose aumentada actividad de influenza en contados países. La actividad de influenza permaneció a niveles bajos en la zona templada del hemisferio norte. En todo el mundo, predominaron los virus influenza A(H3N2).

National Influenza Centres (NICs) and other national influenza laboratories from 64 countries, areas or territories reported data to FluNet for the time period from 07 August to 20 August 2017. The WHO GISRS laboratories tested more than 48,522 specimens during that time period. 7,438 were positive for influenza viruses, of which 6,637 (89.2%) were typed as influenza A and 801 (10.8%) as influenza B. Of the sub-typed influenza A viruses, 746 (14%) were influenza A(H1N1)pdm09 and 4,586 (86%) were influenza A(H3N2). Of the characterized B viruses, 99 (53.8%) belonged to the B-Yamagata lineage and 85 (46.2%) to the B-Victoria lineage. / Los Centros Nacionales de Influenza (NICs) y otros laboratorios nacionales de influenza de 64 países, áreas o territorios, reportaron datos a FluNet en el período del 07 de agosto al 20 de agosto de 2017. Los laboratorios de la OMS GISRS realizaron pruebas a más de 48.522 muestras durante ese período. 7.438 tuvieron resultado positivo para virus influenza, de los cuales 6.637 (89,2%) fueron tipificados como influenza A y 801 (10,8%) como influenza B. De los virus influenza A subtipificados, 746 (14%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 4.586 (86%) fueron influenza A(H3N2). De los virus influenza B caracterizados, 99 (53,8%) fueron del linaje B-Yamagata y 85 (46,2%) fueron del linaje B-Victoria.

Percentage of respiratory specimens that tested positive for influenza By influenza transmission zone

Status as of 01 September 2017



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), FluNet (www.who.int/flu-net).

World Health Organization
©WHO 2017. All rights reserved.

ACRONYMS

ARI	Acute Respiratory Infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological Week
ILI	Influenza-like illness
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
ICU	Intensive Care Unit
RSV	Respiratory Syncytial Virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe/Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad Tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRAG	Infección Respiratoria Aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
VSR	Virus Sincitial Respiratorio