

POLÍTICA DE FRASCOS ABIERTOS MULTIDOSIS

para vacunas precalificadas por la OMS

Hasta
28 días

después de abrir el frasco

- IPV •bOPV
- DPT •TT •DT •Td
- Hepatitis B •Influenza
- Varicela (verificar presentación/proveedor)
- Formulas líquidas de vacuna contra la Hib



Hasta
6 horas

después de haber sido reconstituidas

- BCG •SR •SRP
- Fiebre amarilla
- Varicela (verificar presentación/proveedor)
- Formulas liofilizadas de vacuna contra la Hib

ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR:



Utilizar antes de la fecha de vencimiento



Escribir en el frasco la fecha y hora de apertura



Almacenar y transportar entre +2°C y + 8°C



Manipular con buenas prácticas asépticas



Leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante y los lineamientos nacionales

ATENCIÓN:



No utilizar si el tapón del frasco fue sumergido en el agua del deshielo de los paquetes fríos



Prohibido dejar agujas introducidas en el tapón del frasco



No precargar las jeringas con vacunas

RECOMENDACIÓN

Durante el fin de semana o en preparación a un corte de electricidad, emergencias u otros eventos que puedan afectar la conservación de la cadena de frío, se debe:

- Acondicionar adecuadamente los paquetes fríos y colocarlos dentro del termo
- Empacar y conservar las vacunas en los termos
- Colocar un termómetro dentro del termo
- Ubicar el termo dentro del refrigerador



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas