


2018

Weekly / Semanal **Influenza Report EW 32/ Reporte de Influenza SE 32**


Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios



August 21, 2018
21 de Agosto de 2018

*Data as of August 12, 2018/
Datos hasta 12 de agosto de 2018*

FluID



FluNet



Map Production /Producción del mapa: PAHO/WHO, OPS/OMS.

Data Source / Fuente de datos:

Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States

Reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and /

Informe de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de

Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas

globales de [FluNet](#) y [FluID](#)

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the informatics global platforms

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/

and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/ ;

and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [FluID](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/phil/viz/ed_flu.asp

PAHO FluID: <http://ais.paho.org/phil/viz/flumart2015.as>

Influenza Regional Reports / Informes regionales de influenza:

In English: <http://www.paho.org/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARInet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org>

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	<u>Weekly Summary / Resumen Semanal</u>	5
2	<u>Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VSR</u>	6
3	<u>Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados</u>	7
4	<u>Epidemiological and Virologic update by country / Actualización epidemiológica y virológica por país</u>	8
5	<u>Acronyms / Acrónimos</u>	31

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: Overall, influenza activity was at inter-seasonal levels in [Canada](#) and the [United States](#), with influenza B predominating. In [México](#), elevated influenza and SARI activity was reported with influenza A(H1N1)pdm09 and B co-circulating.

Caribbean: Influenza virus activity slightly increased, and low RSV activity was reported throughout most of the sub-region. In [Cuba](#) and [Haiti](#), influenza A(H1N1)pdm09 activity continued elevated, while in [Jamaica](#), influenza activity decreased, with influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) co-circulating.

Central America: Epidemiological indicators remained at moderate levels and influenza and RSV circulation were reported to decrease throughout the sub-region, except for [Panama](#) and [Guatemala](#) where RSV activity slightly increased. In [Guatemala](#), influenza activity continued elevated with influenza A(H1N1)pdm09 predominating, and SARI activity was similar to the previous season.

Andean Region: Overall influenza and other respiratory virus activity remained stable in the sub-region. SARI activity decreased in [Bolivia](#), with influenza B, A(H1N1)pdm09 and RSV co-circulating. In [Perú](#), influenza A(H1N1)pdm09 and SARI activity remained elevated. In [Colombia](#), influenza A(H1N1)pdm09 and SARI activity slightly decreased.

Brazil and Southern Cone: Influenza activity increased at the seasonal levels throughout most of the sub-region, with influenza A predominance. In [Brazil](#), influenza-associated SARI cases remained elevated from previous seasons, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating. In [Paraguay](#), [Chile](#) and [Uruguay](#), SARI activity steadily increased related to RSV and influenza A(H3N2) levels.

Global: In the temperate zones of the southern hemisphere, influenza activity remained elevated in South America and continued to decrease in Southern Africa. Influenza activity remained below seasonal threshold in Australia and New Zealand and at inter-seasonal levels in most of temperate zone of the northern hemisphere. Reports of influenza activity were reported as decreased in some countries of tropical America. Worldwide, seasonal influenza subtype A viruses accounted for the majority of detections.

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en [Canadá](#) y los [Estados Unidos](#), con predominio de influenza B. En [México](#), se reportó actividad de influenza e IRAG elevada con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de VSR en la mayoría de la subregión. En [Cuba](#), y [Haiti](#), la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 continuó elevada, en tanto en [Jamaica](#), la actividad de influenza disminuyó, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la circulación de influenza y VSR se encontraron en descenso en toda la sub-región, excepto por [Panamá](#) y [Guatemala](#) donde la actividad de VSR aumentó ligeramente. En [Guatemala](#), la actividad de influenza continuó elevada con predominio de influenza A(H1N1)pdm09, y la actividad de IRAG fue similar a la temporada previa.


Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. La actividad de IRAG disminuyó en [Bolivia](#), con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VSR. En [Perú](#), la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 e IRAG permaneció elevada. En [Colombia](#), la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 disminuyó levemente.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza aumentaron a niveles estacionales en toda la sub-región, con predominancia de influenza A. En [Brasil](#), los casos de IRAG asociados a influenza permanecieron elevados en relación a temporadas previas, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. En [Paraguay](#), [Chile](#) y [Uruguay](#), la actividad de IRAG aumentó en forma sostenida asociada a niveles de influenza A(H3N2) y VSR.

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza se mantuvo elevada en América del Sur y continuó disminuyendo en el sur de África. La actividad de influenza se mantuvo por debajo del umbral estacional en Australia y Nueva Zelanda y en niveles interestacionales en la mayoría de las zonas templadas del hemisferio norte. Los informes de actividad de influenza se informaron como disminuidos en algunos países de América tropical. En todo el mundo, los virus del subtipo A de influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.


Influenza circulation by subregion, 2014-18

Circulación virus influenza por subregión, 2014-18



Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by subregion, 2012-18


Circulación de virus sincicial respiratorio por subregión, 2012-18




*To view more lab data, view [here](#). / Para ver mas datos lab, vea [aquí](#).

Genetic Characterization of Influenza Viruses Influenza by Subregion, 2017-18

Caracterización Genética de los Virus por Subregión, 2017-18



These data are from the WHO –Collaborating Center at the U.S. CDC.
Estos datos son recolectados desde el CC de la OMS en el CDC de EE. UU.



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory virus, by country and EW, 2018¹

Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2018²

EW 32, 2018 / SE 32, 2018

		N samples/muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A (H1N1)pdm09	Influenza A not subtyped/no subtipificado	B Victoria	B Yamagata	B lineage no determinado	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	RSV/RSR	% RSV/RSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovirus	Rhinovirus	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte	Mexico	129	1	6	0	0	0	5	9.3%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
	USA	4,652	3	1	0	0	2	6	0.6%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.6%
Caribbean/ Caribe	Dominican Republic	5	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
	Jamaica	7	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Central America/ América Central	El Salvador	18	0	0	0	0	0	0	11.1%	0	1	0	0%	0	0	0	0	16.7%
	Guatemala	33	0	11	0	0	0	0	33.3%	0	0	6	18%	0	0	0	0	51.5%
	Honduras	15	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
	Nicaragua	27	0	1	0	0	0	0	3.7%	0	1	0	0%	0	0	0	0	7.4%
	Panama	25	0	1	0	0	0	0	4.0%	1	2	6	24%	0	0	0	11	84.0%
Andean/ Andina	Bolivia	66	0	2	0	0	1	0	6.1%	0	1	15	23%	0	0	0	0	30.3%
	Colombia	110	1	4	0	0	0	0	4.5%	3	6	12	11%	1	2	1	2	29.1%
	Ecuador	5	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
	Uruguay	44	0	4	0	0	0	0	9.1%	0	0	8	18%	0	0	0	0	27.3%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Brazil	216	4	3	0	0	0	3	4.6%	2	0	4	2%	0	0	0	4	9.3%
	Chile	1,623	53	1	0	0	0	4	15.8%	22	44	341	21%	0	0	54	0	44.2%
	Chile_IRAG	62	3	0	0	0	0	0	8.1%	1	1	17	27%	0	0	4	1	46.8%
	Paraguay	210	57	1	0	0	0	17	35.7%	9	0	26	12%	0	0	14	0	59.0%
	Uruguay	65	0	10	0	0	0	0	15.4%	0	0	11	17%	0	0	0	0	32.3%
	Uruguay IRAG	44	0	4	0	0	0	0	9.1%	0	0	8	18%	0	0	0	0	27.3%
Grand Total		7,312	122	45	0	0	7	38	5.8%	38	56	446	6%	1	2	73	18	14.5%

These are the raw numbers provided in the country's FluNet update (Not the smoothed averages)
Estos son los números crudos proporcionados en la actualización FluNet del país (no los promedios suavizados)

*Please note blank cells indicate N/A.
*Por favor notar que las celulas en blanco indican N/A.

EW 31, 2018 / SE 31, 2018

*Note: These countries reported in EW 32, 2018, but have provided data up to EW 31.
*Nota: Estos países reportaron en la SE 32, 2018, pero han enviado los datos hasta la SE 31.

		N samples/ muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A (H1N1) pdm09	Influenza A No subtipificado	Total Influenza	Influenza (+) %	Adenovirus	RSV/RSR	% RSV/RSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus...	Metapneuv...	Rhinovirus*	Parainfluen...	% All Positive Samples (+)
Caribbean/ Caribe	Suriname	7	0	0	0	0	14.3%	0	1	14%	0	0	0	0	0	28.6%
	Trinidad and Tobago	2	0	2	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
Brazil & Southern C...	Paraguay IRAG	46	5	0	0	2	15.2%	1	12	26%	0	0	6	0	0	56.5%
Grand Total		55	5	2	0	3	18.2%	1	13	24%	0	0	6	0	0	54.5%

EW 29-32, 2018 / SE 29-32, 2018

		N samples/muestras	Influenza (H3N2)*	Influenza A(H1N1)pdm09*	Influenza A non-subtyped*	Influenza B Victoria*	Influenza B Yamagata*	Influenza B lineage undetermined*	Influenza (+) %	Adenovirus*	Parainfluenza*	RSV/RSR*	% RSV/RSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	Metapneumovirus*	Rhinovirus*	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte	Canada	8,626	1	2	5	0	0	0	0.1%	26	80	7	0.1%	0	5	8	147	3.3%
	Mexico	1,023	6	186	0	2	17	14	22.9%	3	3	0	0.0%	0	0	5	5	24.4%
	USA	23,184	18	28	162	2	5	58	1.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2%
Caribbean/ Caribe	Aruba	3	0	2	0	0	0	0	66.7%	0	0	1	33.3%	0	0	0	0	100.0%
	Belize	58	0	5	9	0	0	0	24.1%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	24.1%
	Cuba	15	0	0	2	1	2	0	33.3%	0	2	0	0.0%	0	0	0	1	53.3%
	Cuba IRAG	4	0	0	0	1	1	0	50.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	50.0%
	Dominican Republic	58	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
	French Guiana	8	3	0	0	0	0	0	37.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	37.5%
	Haiti	67	0	1	0	0	0	0	1.5%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	1.5%
	Jamaica	38	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
	Saint Lucia	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0%
	Suriname	20	0	1	0	0	2	0	15.0%	0	0	2	10.0%	0	0	0	0	25.0%
	Trinidad and Tobago	8	0	2	0	0	0	0	25.0%	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0%
Central America/ América Central	Costa Rica	78	0	4	0	0	0	0	5.1%	8	3	0	0.0%	0	0	0	0	19.2%
	El Salvador	101	0	4	3	1	1	0	8.9%	0	3	0	0.0%	0	0	0	0	11.9%
	Guatemala	121	1	28	0	0	0	0	24.0%	3	0	22	18.2%	0	0	4	0	47.9%
	Honduras	89	0	4	0	0	0	0	4.5%	2	2	0	0.0%	0	0	0	0	9.0%
	Nicaragua	240	0	4	0	0	0	0	1.7%	0	10	0	0	0	0	0	0	5.8%
	Panama	250	0	10	0	0	0	0	4.0%	15	32	69	27.6%	0	0	9	54	75.6%
Andean/ Andina	Bolivia	325	3	18	1	0	15	0	11.4%	0	2	100	30.8%	0	0	0	0	42.8%
	Colombia	652	2	60	0	0	0	4	10.1%	15	32	64	9.8%	7	10	8	7	32.2%
	Ecuador	129	1	1	0	0	0	11	10.1%	3	5	5	3.9%	0	0	0	0	20.2%
	Peru	95	0	17	0	0	2	0	20.0%	0	2	16	16.8%	0	0	0	0	38.9%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Argentina	3,213	0	0	81	0	0	85	5.2%	74	156	1,258	39.2%	0	0	111	0	54.9%
	Bolivia	325	3	18	1	0	15	0	11.4%	0	2	100	30.8%	0	0	0	0	42.8%
	Brazil	2,163	90	228	0	0	0	18	15.5%	12	1	24	1.1%	0	0	6	15	18.2%
	Chile	7,178	445	25	454	4	23	31	13.7%	149	218	2,012	28.0%	0	0	226	0	50.0%
	Chile_IRAG	546	68	2	28	0	0	3	18.5%	7	9	154	28.2%	2	7	22	9	57.0%
	Paraguay	864	141	10	0	0	0	56	24.0%	29	0	155	17.9%	0	0	72	0	53.6%
	Paraguay IRAG	456	38	3	2	0	0	15	12.7%	13	1	125	27.4%	0	0	44	0	52.9%
	Uruguay	189	3	18	0	0	2	1	12.7%	0	0	36	19.0%	0	0	1	0	32.3%
	Uruguay IRAG	137	0	8	0	0	1	1	7.3%	0	0	33	24.1%	0	0	1	0	32.1%
	Uruguay IRAG	137	0	8	0	0	1	1	7.3%	0	0	33	24.1%	0	0	1	0	32.1%
Grand Total		50,265	823	689	748	11	86	297	5.3%	359	564	4,183	8.3%	9	22	517	240	17.0%

Total Influenza B, EW 29-32, 2018

	Total Influenza B	B Victoria	B Yamagata	B lineage no determinado	% B Victoria	% B Yamagata
North America/ América del Norte	98	4	22	72	15%	85%
Caribbean/ Caribe	7	2	5	0	29%	71%
Central America/ América Central	2	1	1	0	50%	50%
Andean/ Andina	49	0	17	32	0%	100%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	256	4	42	210	9%	91%
Grand Total	412	11	87	314	11%	89%

1 The detection of respiratory viruses other than influenza depends on the diagnostic capacity of each country and monitoring system. The absence of report of other respiratory viruses does not indicate the absence of their circulation.


2 La detección de otros virus respiratorios diferentes a influenza depende de la capacidad diagnóstica de cada país y del sistema de vigilancia establecido. El que no se reporten otros virus respiratorios, no significa, ni indica la ausencia de circulación viral.

North America / América del Norte

Canada / Canadá

- In EW 29, ILI activity at the national level decreased at the 5-year average (Graph 2). Most of the provinces and territories reported no ILI activity. Influenza detections continued to trend downward (Graph 1); and influenza B viruses predominated among the influenza detections. RSV positivity steadily decreased in recent weeks. The number of pediatric influenza-associated hospitalizations trended downward (Graph 3). / En la SE 29, la actividad de ETI a nivel nacional disminuyó similar al promedio de 5 años (Gráfico 2). La mayoría de los territorios y provincias no reportaron actividad de ETI. Las detecciones de influenza continuaron en descenso (Gráfico 1); y los virus influenza B predominaron entre las detecciones de influenza. La positividad de VSR disminuyó en forma sostenida en semanas recientes. El número de hospitalizaciones pediátricas asociadas a influenza disminuyó (Gráfico 3).


Graph 1. Canada: Influenza virus distribution by EW, 2014-18, EW 29. /
Distribución de virus de influenza por SE, 2014-18. SE 29



Graph 2. Canada: Percentage of ILI visits by sentinel sites, EW 35 2017 – EW 29, 2018 /

Porcentaje de casos de ETI por sitio centinela, SE 35 2017 – SE 29, 2018.


Figure 4 - Percentage of visits for ILI reported by sentinels by report week, Canada, weeks 2017-35 to 2018-29
Number of Sentinels Reporting in Week 29: 140



Graph 3. Canada: Number of influenza pediatric hospitalizations (<16 years of age) by EW, 2017-2018, EW 35, 2017 – EW 29, 2018.

Recuento de hospitalizaciones pediátricas por influenza, por SE, 2017-2018, SE 35, 2017 – SE 29, 2018.

Figure 8 – Number of pediatric hospitalizations (≤16 years of age) with influenza reported by the IMPACT network, by week, Canada, weeks 2017-35 to 2018-29




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

United States / Estados Unidos


- In EW 33, ILI activity at the national level continued to trend downward (Graph 4). Influenza and RSV detections continued to trend downward (Graph 1,2); and influenza A (non-subtyped) viruses predominated among the influenza detections. The proportion of pneumonia and influenza deaths among all deaths was below the epidemic threshold (Graph 3). / En la SE 33, la actividad de ETI a nivel nacional continuó con tendencia descendente (Gráfico 4). Las detecciones de influenza y VSR continuaron en descenso (Gráfico 1, 2); y los virus influenza A (No subtipificado) predominaron entre las detecciones de influenza. La proporción de fallecidos por neumonía e influenza del total de fallecidos se ubicó bajo el umbral epidémico (Gráfico 3).
- In EW 32, 4 new human infections with influenza A(H1N2)v variant virus were reported by three states (California [2] and Michigan [1], Ohio [1]). Three cases reported direct exposure to swine at an agricultural fair during the week preceding illness onset, while one patient attended an agricultural fair but not contact with swine was reported. The cases were an adult <25 years of age and three children < 18 years old, outpatients who fully recovered from their illness. No human-to-human transmission has been identified. During 2018, a total of 9 variant influenza virus were reported in USA: 8 influenza A(H1N2)v and 1 influenza A(H3N2)v virus. / En la SE 32, se informaron 4 nuevas infecciones humanas con virus influenza A(H1N2)v variante en tres estados (California [2], Michigan [1] y Ohio [1]). Tres casos reportaron exposición directa a los cerdos en una feria agrícola durante la semana anterior al inicio de la enfermedad,

en tanto un paciente asistió a una feria agrícola, pero sin contacto con cerdos. Los casos fueron un adulto de <25 años de edad y tres niños <18 años, ambulatorios y con recuperación completa de su enfermedad. No se ha identificado transmisión de persona a persona. Durante 2018, un total de 9 virus influenza variante fueron reportados en EEUU: 8 virus influenza A(H1N2)v y 1 influenza A(H3N2)v.


Graph 1. US: Influenza virus distribution by EW 32, 2014-18
Distribución de virus de influenza por SE 32, 2014-18




Graph 2. US: Percent positivity for respiratory virus EW 31
Porcentaje de positividad para virus respiratorios, por SE 31, 2013/14- 2017/18



Graph 3. US: Pneumonia and influenza mortality. EW 30, 2018
Mortalidad por neumonía e influenza. SE 30, 2018




Graph 4. US: Percentage of visits for ILI, 2017-2018. EW 32,
Porcentaje de visitas por ETI, 2017-2018. SE 32.




Mexico

- During EW 32, influenza activity slightly decreased above the alert threshold, with influenza A(H1N1)pdm09 and both lineages of influenza B predominating; and there were no RSV detections (Graph 1). In recent weeks, influenza-associated SARI/ILI counts were above what was observed during most other seasons (Graph 2) and the influenza-associated SARI/ILI deaths were slightly above levels from previous seasons for the same period (Graph 3). In EW 33, 7 states reported higher influenza-associated SARI/ILI counts than the historic average: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas and Yucatan (Graph 4). In EW 33, 5 states reported higher influenza-associated SARI/ILI deaths counts than the historic average: Baja California, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa and Yucatan (Graph 5). During EW 33, 680 cumulative influenza SARI/ILI cases and 48 cumulative influenza SARI/ILI deaths were reported, with the highest activity in Yucatán and Quintana Roo (Graphs 6, 7). / Durante la SE 32, la actividad de influenza disminuyó ligeramente sobre el umbral de alerta, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 y ambos linajes de influenza B; y no se reportaron detecciones de VSR (Gráfico 1). En semanas recientes, los recuentos de IRAG/ETI asociados a influenza se ubicaron por encima de lo observado durante la mayoría de las restantes temporadas (Gráfico 2) y los casos fallecidos de IRAG/ETI asociados a influenza aumentaron ligeramente de las previas temporadas para el mismo período (Gráfico 3). En la SE 33, 7 estados reportaron mayores recuentos de IRAG/ETI asociados a influenza en comparación con el promedio histórico: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatan (Graph 4). En la SE 33, 5 estados reportaron mayor recuento de fallecidos por IRAG/ETI asociados a influenza en comparación con el promedio histórico: Baja California, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán (Graph 5). Durante la SE 33, fueron reportados un total acumulado de 680 casos de IRAG/ETI asociados a influenza y 48 muertes por IRAG/ETI asociadas a influenza, con la mayor actividad en Yucatán y Quintana Roo.


Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution by EW 2014-18, EW 32.
Distribución de virus de influenza por SE 18-2018, SE 32.



Graph 2. Mexico: SARI/ILI-flu cases EW 33, 2012/13-2017/18
Casos de IRAG/ETI asociados a influenza SE 33, 2012/13-2017/18




Graph 3. Mexico: SARI/ILI-flu deaths EW 32, 2012/13- 2017/18
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza SE 32, 2012/13-2017/18



Graph 4. Mexico: Cumulative SARI/ILI flu cases greater than historic average, EW 21-33 (2013/14- 2017/18)
Casos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza mayor del promedio historico, SE 21-3 (2013/14- 2017/18)

Mexico SARI Flu Cases, as of EW 21-33, 2018
Count of cases greater than 1 SD above historic average (2013/14-2017/18)




Graph 5. Mexico: Cumulative SARI/ILI flu deaths greater than historic average, EW 21-33 (2013/14- 2017/18)
Fallecidos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza mayor del promedio historico, SE 21- 33 (2013/14- 2017/18)


Mexico SARI Flu Deaths, as of EW 21-33, 2018
Count of cases greater than 1 SD above historic average (2013/14-2017/18)



Graph 6. Mexico: SARI/ILI-influenza cases EW 33, 2012/13-2017/18
Casos de IRAG/ETI asociados a influenza SE 33, 2012/13-2017/18



Graph 7. Mexico: SARI/ILI-flu deaths EW 33, 2012/13- 2017/18
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza SE 33, 2012/13-2017/18




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Caribbean/ Caribe


Aruba

- During EW 29, 2 influenza detection were reported as influenza A(H1N1)pdm09 (Graph 1) and SARI activity increased (Graph 3). The proportion of influenza positive samples decreased, and no RSV detections were reported (Graph 2). / Durante la SE 29, se reportaron 2 detecciones de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1), y la actividad de IRAG aumentó (Gráfico 3). La proporción de muestras positivas para influenza disminuyó, así como para VRS (Gráfico 2).


Graph 1. Aruba. Influenza virus distribution EW, EW 29, 2015-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 29, 2015-18.



Graph 2. Aruba. Influenza and RSV distribution, EW 29, 2015-18.
Distribución de virus influenza y VSR, SE 29, 2015-18.




Graph 3. Aruba: Number of SARI cases with samples by EW, EW 29, 2014-18
Numero de casos IRAG con muestra por SE, SE 29, 2014-18




Belize/ Belice

- During EW 32, slightly decreased SARI activity was reported (Graph 1), as compared to the previous five seasons average. The ARI incidence rate among <5 years of age children was lower than the previous seasons for the same period (Graph 2). During EW 31, influenza A(H1N1)pdm09 circulated, with overall few samples (Graph 3). / Durante la SE 32, se reportó ligero descenso en la actividad de IRAG (Gráfico 1), en comparación con el promedio de las cinco temporadas previas. La incidencia de IRA entre los niños <5 años fue menor que en las temporadas previas para el mismo período (Gráfico 2). Durante la SE 31, circuló influenza A(H1N1)pdm09, con escasas muestras en general (Gráfico 3).


Graph 1. Belize: SARI incidence rate per 100,000, EW 32, 2018
Tasa de incidencia de IRAG por 100.000, SE 32, 2018



Graph 2. Belize: ARI incidence rate per 100,000, <5 years old, EW 32, 2018
Tasa de incidencia de IRA por 100.000, <5 años de edad, SE 32, 2018




Graph 3. Belize. Influenza virus distribution EW, EW 31, 2015-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 31, 2015-18.




CARPHA (Aruba , Barbados & Trinidad & Tobago)

- During EW 32, no influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 in recent weeks (Graph 1). The proportion of influenza positive samples decreased, while proportion of RSV remained low (Graph 2). Countries that reported in last 2 weeks, include Aruba, Barbados and Trinidad and Tobago (Graph 3)./ Durante la SE 32, no se reportaron detecciones de influenza con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes (Gráfico 1). La proporción de muestras positivas para influenza disminuyó, mientras que las de VSR se mantuvieron baja (Gráfico 2). Países que se reportaron en las 2 semanas previas, incluyen Aruba, Barbados y Trinidad y Tobago.

Graph 1. CARPHA. Influenza virus distribution EW, EW 32, 2014-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 32, 2014-18.



Graph 2. CARPHA. Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Cuba

- During EW 28, increased influenza detections were reported, with influenza A(H3N2) predominating in previous weeks (Graph 1); while there were no RSV detections (Graph 2). The number of SARI cases decreased and were lower than in the 2014-2017 seasons for the same period (Graph 3), and were among the <5-years-old population, with influenza A(H3N2) predominating. / Durante la SE 28, se reportaron mayores detecciones de influenza, con predominio de influenza A(H3N2) en las semanas previas en tanto no se reportaron detecciones de VSR (Gráfico 2). Los casos de IRAG disminuyeron y estuvieron por debajo de los niveles de las temporadas 2014-2017 para el mismo período (Gráfico 3), y fueron entre la población de < 5 años de edad con predominio de influenza A(H3N2).


Graph 1. Cuba: Influenza virus distribution by EW, EW 28, 2014-18
Distribución de virus influenza por SE, SE 28, 2014-18



Graph 2. Cuba Influenza and RSV distribution, EW 28, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, EW 28, 2014-18



Graph 3. Cuba: Number of SARI cases with samples by EW, EW 27, 2014-18
Numero de casos IRAG con muestra por SE, SE 27, 2014-18




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Dominican Republic / República Dominicana

- During EW 31, no influenza detections were reported, and influenza A(H1N1)pdm09 predominated in previous weeks (Graph 1); RSV data were not reported this week (Graph 2). Influenza positivity was below the alert threshold (Graph 3). During EW 21, the number of SARI cases slightly increased from previous weeks (Graph 4), with a low percentage of influenza positive samples. The SARI and influenza-associated SARI cases predominated among the <5 years old. / Durante la SE 31, no se han reportado detecciones de influenza, en las semanas previas el virus predominante fue A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1); no se reportó actividad de VSR durante esta semana (Gráfico 2). La actividad de influenza se ubicó por debajo del umbral de alerta y del umbral epidémico (Gráfico 3). Durante la SE 21, el número de casos de IRAG aumentó ligeramente en relación a semanas previas (Gráfico 4), con un bajo porcentaje de muestras positivas para influenza. Los casos de IRAG y los casos de IRAG asociados a influenza predominaron en los <5 años.


Graph 1. Dominican Republic: Influenza virus distribution EW, 2014-18. EW 31.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-18. SE 31.




Graph 3. Dominican Republic: Percent positivity for influenza, EW 31, 2018
(in comparison to 2010-2017)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 31, 2018 (en comparación a 2010-2017)



Graph 2. Dominican Republic Influenza and RSV distribution, EW 31, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 31, 2014-18



Graph 4. Dominican Republic: Percent of SARI cases out of total hospitalizations, by EW, EW 21, 2018
Porcentaje de casos de todos IRAG by EW, EW 21, 2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Haiti

- During EW 31, no influenza cases were reported, but influenza A(H1N1)pdm09 predominated in previous weeks (Graph 1). As of EW 31, the number of SARI hospitalizations decreased, as compared to previous weeks; and was lower than the levels observed in 2017 for the same period (Graph 2). Most of the cases were among the <5 years old infants (Graph 3). / Durante la SE 31, no se reportaron casos de influenza, pero influenza A(H1N1)pdm09 predominó en semanas previas (Gráfico 1). Hasta la SE 31, el número de hospitalizaciones por IRAG ha disminuido, siendo menor a los niveles observados en 2017 para el mismo período (Gráfico 2).

Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW, 2014-18. EW 31.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-18. SE 31.



Graph 2. Haiti: Number of SARI cases, EW 31, 2017-2018. /
Número de casos IRAG, SE 31, 2017-2018.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Jamaica

- During EW 32, SARI activity remained below the seasonal threshold, similar to the previous seasons for the same period (Graph 2). The number of ARI cases decreased below the seasonal threshold, as compared to the 2014-2017 seasons for the same period. During EW 31, decreased influenza activity was reported; with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1). / Durante la SE 32, la actividad de IRAG permaneció por debajo del umbral estacional, similar a lo observado en las temporadas previas para el mismo período (Gráfico 2). El número de casos de IRA se ubicó por debajo del umbral de estacional, en comparación a las temporadas 2014-2017 para el mismo período. Durante la SE 31, se reportó menor actividad de influenza; con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1).


Graph 1. Jamaica: Influenza virus distribution by EW, EW 31, 2014-18
Distribución de virus influenza por SE, EW 31, 2014-18



Graph 2. Jamaica: % SARI hospitalizations among total hospitalizations, EW 32, 2016-2018. /
% hospitalizaciones de casos IRAG entre total de hospitalizaciones, SE 32, 2016-2018.



Graph 3. Jamaica: Number of ARI cases (compared to 2014-2018), EW 32
Número de casos de IRA, (en comparación a 2014-2018), SE32




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Puerto Rico

- During EW 32, influenza cases were detected but were below the seasonal threshold, with co-circulation of influenza A(H3N2), A(H1N1)pdm09 and B (Graph 1) in recent weeks. ILI activity remained below the average epidemic curve (Graph 2). / Durante la SE 32, se han detectado casos de influenza aunque por debajo del umbral estacional, con co-circulación de influenza A(H3N2), A(H1N1)pdm09 y B en semanas recientes (Gráfico 1). La actividad del ETI se mantuvo por debajo de la curva epidémica media (Gráfico 2).


Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive cases by EW 32, 2017-18
Casos positivos para influenza SE 32, 2017-18

Gráfica 1. Casos de influenza reportados por semana epidemiológica, Temporada 2018 – 2019, Puerto Rico



Graph 2. Puerto Rico: ILI epidemic rates by EW 32, 2018 /
Tasas de ETI por SE, SE 32, 2018.

GRÁFICA 4. Informe de Niveles Epidemiológicos de Síndromes Grippales, Semana 20, Puerto Rico 2018




Saint Lucia

- During EW 32, the number of cases with respiratory symptoms among children under 5 years of age continued below the seasonal levels (Graph 1). During EW 32, SARI activity was similar as compared to the 2016-2017 seasons (Graph 2), with 48.9% of all SARI admissions among the 1 to 4 years of age population. / Durante la SE 32, el número de casos con síntomas respiratorios en niños menores de 5 años de edad continuo bajo los niveles estacionales (Gráfico 1). Durante la SE 32, la actividad de IRAG es similar en comparación con las temporadas 2016 y 2017 (Gráfico 2), con el 48,9% del total de admisiones por IRAG entre el grupo de 1 y 4 años de edad.

Graph 1. Saint Lucia: ILI cases distribution by EW among the < 5 years of age, EW 32, 2014-18


Distribución de ETI por SE entre los <5 años de edad, SE 32, 2014-18



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Graph 2. Saint Lucia: Percent of SARI cases per total hospitalizations by year, 2016-2018, EW 32. /


Porcentaje de casos de IRAG por todos hospitalizaiones por año, 2016-2018, SE 32.




Suriname

- During EW 32, ILI case counts slightly decreased and SARI-related hospitalizations increased from previous weeks; and both were higher, as compared to the 2017 season, for the same period (Graph 3, 4). Decreased SARI cases were associated with co-circulation of influenza B, RSV, parainfluenza and adenovirus; and predominated among the <5 years-of-age population. During EW 31, increased influenza activity was reported, with influenza B predominating in recent weeks (Graph 1); RSV remained at low levels (Graph 2). / Durante la SE 32, el número de casos de ETI disminuyó ligeramente y las hospitalizaciones relacionadas con IRAG aumentaron en relación a semanas previas; y ambas fueron mayores en comparación a la temporada 2017 para el mismo período (Gráfico 3, 4). El descenso de casos de IRAG se asoció a co-circulación de influenza B, VSR, parainfluenza y adenovirus; y predominó entre la población de <5 años de edad. Durante la SE 32, se reportó mayor actividad de influenza, con predominio de influenza B en semanas previas (Gráfico 1); VSR permaneció a niveles bajos (Gráfico 2).

Graph 1. Suriname: Influenza virus distribution by EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza por SE 32, 2014-18




Graph 3. Suriname: Number of ILI cases, by age, by EW, 2018.EW 32
Número de casos ETI, en grupo de edad, por SE, 2018, SE 32




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Graph 2. Suriname: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2015-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2015-18




Graph 4. Suriname: % SARI hospitalizations per total hospitalizations, by EW, 2018.EW 32.
Casos % de hospitalizaciones IRAG entre todas las hospitalizaciones, por SE, 2018, SE 32.




Trinidad & Tobago

- During EW 32, increased influenza detections were reported, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating in previous weeks (Graph 1). Parainfluenza virus circulated in recent weeks, and there were no RSV detections reported (Graph 2). / Durante la SE 32, se reportaron mayores detecciones de influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 en semanas previas (Gráfico 1). Circuló el virus parainfluenza en semanas recientes y no se reportaron detecciones de VSR (Gráfico 2).

Graph 1. Trinidad & Tobago: Influenza virus distribution by EW, EW 32, 2014-18




Graph 2. Trinidad & Tobago. Other respiratory virus distribution, EW 32, 2015-18




Costa Rica

- During EW 31, influenza activity increased, as compared to the previous week with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1). Influenza activity during EW 31 was similar to the 2017 season for the same period and RSV activity remained at low levels (Graph 1, 2). / Durante la SE 31, la actividad de influenza aumentó, en comparación con las semanas previas con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1). La actividad de influenza durante la SE 31 fue similar a la temporada 2017 para el mismo período y la actividad de VSR permaneció a niveles bajos (Gráficos 1, 2).

Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, Laboratory confirmed samples, by EW 31, 2014-18
Distribución de virus influenza, confirmados por laboratorio, hasta SE 31, 2014-18




Graph 2. Costa Rica: Influenza and RSV distribution, EW 30 2015-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 30, 2015-18




El Salvador

- During EW 32, influenza activity slightly increased but remained below the alert threshold with influenza B and A(H1N1)pdm09 and B co-circulating (Graphs 1, 3). RSV positivity remained lower than the levels observed in the previous season (Graph 2). During EW 32, SARI case counts decreased and were lower to levels observed in the 2016-2017 seasons (Graph 4, 5) / Durante la SE 32, la actividad de influenza aumentó ligeramente aunque permaneció por debajo del umbral de alerta con predominio de influenza B y A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1, 3). La positividad de VSR permaneció menor a los niveles observados en la temporada anterior (Gráfico 2). Durante la SE 32, los casos IRAG disminuyeron y fueron menores a los niveles registrados en las temporadas 2016-2017 (Gráfico 4).


Graph 1. El Salvador: Influenza virus distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza, SE 32, 2014-18




Graph 2. El Salvador: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18



Graph 3. El Salvador: Percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2016)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2018 (en comparación a 2010-2016)



Graph 4. El Salvador: Percent of SARI cases out of total hospitalizations, by EW, 2016- 2018. EW 32.
Porcentaje de casos por IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE, 2016- 2018. SE 32.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Guatemala

- During EW 32, a slight increase was reported in influenza detections from the previous week, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1). Influenza positivity increased above the alert threshold, as compared to the 2010-2017 period (Graph 3). The influenza proportion was higher than the previously reported levels from 2016-2017 season for the same period, while RSV activity increased in the last weeks (Graph 2). During EW 32, pneumonia activity continued low, compared to 2017 levels, and decreased slightly compared to previous weeks (Graph 4). Up to EW 31, the percent of SARI cases was similar to the 2017 season for the same period, with the highest proportion among <5 years old population (Graph 5). / Durante la SE 32, se reportó un ligero aumento en las detecciones de influenza respecto a la semana previa con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1). La positividad de influenza se ubicó por encima del umbral de alerta respecto al período 2010-2017 (Gráfico 3). La proporción de influenza fue mayor a los niveles reportados de la temporada 2016-2017, para el mismo período, y la actividad de VSR se ha incrementado en las últimas semanas (Gráfico 2). Durante la SE 32, la actividad de neumonía se mantuvo baja respecto al 2017, disminuyendo ligeramente respecto a las semanas previas (Gráfico 4). Hasta la SE 31, el porcentaje de casos IRAG fue similar a la temporada 2017 para el mismo período, con la mayor proporción en la población < de 5 años (Gráficos 5)

Graph 1. Guatemala. Influenza virus distribution EW 32, 2014-18




Graph 2. Guatemala: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2015-18




Graph 3. Guatemala: Percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2018 (en comparación con 2010-2017)



Graph 4. Guatemala: Number of pneumonia cases, EW 32, 2017-2018. / Número de casos neumonía, SE 32, 2017-2018.



Graph 5. Guatemala: Number of SARI cases, EW 31, 2017-2018. / Número de casos IRAG, SE 31, 2017-2018.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Honduras


- During EW 32, at the sentinel sites, influenza activity decreased below the seasonal threshold (Graph 3) with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1); no RSV detections were reported (Graph 2). The influenza positive cases were reported mainly from Cortes and Francisco Morazán departments and most cases were among children under 5 years of age. The percent of SARI cases out of total hospitalizations increased compared to previous weeks, similar to the levels of the previous seasons (Graph 4). / Durante la SE 32 de 2018, en los sitios centinela, la actividad de influenza disminuyó bajo el umbral estacional (Gráfico 1) con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1); no se reportaron detecciones de VSR (Gráfico 2). Los casos positivos de influenza fueron reportados principalmente en los departamentos de Cortés y

Francisco Morazán, y la mayoría de los casos fueron en niños menores de 5 años de edad. El porcentaje de IRAG frente al total de los ingresos hospitalarios aumentó respecto a las semanas previas, y fue similar a los niveles observados en las temporadas previas (Gráfico 4).


Graph 1. Honduras. Influenza virus distribution from sentinel surveillance, EW 32, 2014-18



Graph 2. Honduras: Influenza and RSV distribution form sentinel surveillance, EW 32, 2014-18




Graph 3. Honduras : Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance, EW 32, 2018 (in comparision to 2010-2017)
Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 32, 2018 (en comparación con 2010-2017)



Graph 4. Honduras: Percent of SARI cases out of total hospitalizations, EW 32, 2012-2018. /


Porcentaje de casos IRAG de todas hospitalizaciones, SE 32, 2012-2018.




Nicaragua

- During the 2018 season, influenza activity continued at low levels. From EW 29 to EW 32, influenza A(H1N1)pdm09 circulated (Graph 1), and RSV levels remained low in previous weeks (Graph 2). / Durante la temporada 2018, la actividad de influenza continuó a niveles bajos. Desde la SE 29 a la SE 32, circuló influenza A(H1N1)pdm09 (Grafico 1), y los niveles de y las detecciones de VSR se mantuvieron bajas en las últimas semanas (Gráfico 2).

Graph 1. Nicaragua. Influenza virus distribution EW 32, 2014-18
Distribución de influenza SE 32, 2014-18



Graph 2. Nicaragua: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2015-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2015-18




Panama

- During the 2018 season, at national level, influenza activity continued at low levels. In EW 32, low influenza detections were reported, with influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 co-circulating in previous weeks (Graph 1); and RSV detections increased compared to previous weeks (Graph 2). During EW 26, SARI hospitalizations and ILI consultations remained slightly similar to the previous weeks (Graph 4, 5). / Durante la temporada 2018, a nivel nacional, la actividad de influenza continuó en niveles bajos. En la SE 32, se han reportado bajas detecciones de influenza, con co-circulación de influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09 en semanas previas (Gráfico 1); las detecciones de VSR han incrementado respecto a las semanas previas (Gráfico 2). Durante la SE 26, las hospitalizaciones por IRAG y las consultas por ETI permanecieron similares a las semanas previas (Gráficos 4, 5).


Graph 1. Panama. Influenza virus distribution EW 32, 2014-18
Distribución de influenza SE 32, 2014-18




Graph 2. Panama: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18



Graph 4. Panama: % SARI hospitalizations per total hospitalizations, by EW, 2018.EW 25.
Casos % de hospitalizaciones IRAG entre todas las hospitalizaciones, por SE, 2018.SE 25.



Graph 4. Panama: % ILI consultations per total consultations, by EW, 2018.EW 25.
Casos % de consultas ETI entre todas las consultas, por SE, 2018.SE 25.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Bolivia

- During EW 32, at the national level, SARI cases decreased from the previous weeks and were slightly higher than in the 2017 season for the same period (Graph 3). Influenza activity slightly decreased from the previous week with influenza B and A(H1N1)pdm09 co-circulating; and RSV activity decreased (Graph 1, 2). In La Paz, in EW 29, the number of SARI cases decreased (Graph 5) from previous weeks, with influenza B and A (Graphs 4, 5). / En la SE 32, a nivel nacional, los casos de IRAG siguieron en descenso respecto a semanas previas y fueron ligeramente mayores que en la temporada 2017 para el mismo período (Grafico 3). La actividad de influenza disminuyó respecto a lo observado la semana previa con co-circulación de influenza B y A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1) y la actividad del VRS disminuyó (Gráfico 2). En La Paz, en la SE 29, el recuento de casos de IRAG disminuyó (Gráfico 5) en relación a semanas previas, con co-circulación de influenza B y A (Gráficos 4,5).


Graph 1. Bolivia. Influenza virus distribution EW 32, 2014-18
Distribución de influenza SE 32, 2014-18



Graph 2. Bolivia: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18



Graph 3. Bolivia: Number of SARI cases out of total hospitalizations, EW 32, 2017-2018
Numero de casos IRAG de todas hospitalizaciones, SE 32, 2017-2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Colombia

- During EW 32, at national level, SARI case counts were lower as compared to the previous seasons for the same period and was below the seasonal threshold and the alert threshold (Graph 4). In EW 32, influenza activity decreased as compared to the previous weeks with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graphs 1, 3); while RSV percent positivity increased (Graph 2). During EW 32, pneumonia activity continued to decrease below the alert threshold and ARI activity decreased slightly at the alert threshold, in comparison to seasons in 2012-2017 (Graph 5, 6). / En la SE 32, a nivel nacional, el número de casos de IRAG fue menor en comparación a las temporadas previas para el mismo período, situándose por debajo del umbral estacional y de alerta (Grafico 4). Durante la SE 32, la actividad de influenza disminuyó en comparación a las semanas anteriores y con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1, 3); en tanto la positividad de VSR aumentó (Gráfico 2). Durante la SE 32, la actividad de neumonía continuó en descenso por debajo del umbral de alerta y la actividad de IRA disminuyó levemente situándose ligeramente en el umbral de alerta, en comparación con las temporadas 2012-2017 (Gráficos 5, 6).


Graph 1. Colombia. Influenza virus distribution EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza SE 32, 2014-18




Graph 2. Colombia: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18




Graph 3. Colombia: Percent positivity for influenza, EW 32, 2017-18 (in comparison to 2010-2016)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2017-18 (en comparación a 2010-2016)




Graph 4. Colombia: Number of SARI cases, EW 32, 2018 (in comparison to 2013-2017)
Número de casos de IRAG, SE 32, 2018 (en comparación a 2013-2017)



Graph 5. Colombia: Number of pneumonia-related hospitalizations, by EW 32, 2018 (in comparison with 2012-17)
Número de hospitalización asociado a neumonía, por SE 32, 2018 (en comparación con 2012-17)



Graph 6. Colombia: Number of ARI cases, EW 32 (from all consultations), (in comparison with 2012-17)
Número de los casos IRA, SE 32 (de todas consultas), (en comparación con 2012-17)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Ecuador


- During EW 30, at national level, the proportion of SARI cases among all hospitalizations increased from previous weeks and remained similar to the levels observed during the 2016 -2017 seasons for the same period (Graph 4). During EW 32, influenza activity was slightly higher as compared to the previous weeks, and influenza percent positivity and RSV percent positivity were similar to the levels reported during the prior season for the same period (Graph 1, 2). / Durante la SE 30, a nivel nacional, la proporción de casos de IRAG del total de hospitalizaciones aumentó en relación a semanas previas y se mantuvo similar a los niveles observados durante 2016-2017 para el mismo período (Gráfico 4). En la SE 32, la actividad de influenza fue ligeramente mayor en comparación con semanas previas, y el porcentaje de positividad para influenza y para VSR fueron similares a los niveles registrados en la temporada previa para el mismo período (Gráficos 1, 2).

Graph 1. Ecuador IRAG: Influenza virus distribution from SARI sentinel cases by EW 32, 2014-18




Graph 3. Ecuador: Percent positivity for all influenza cases, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)

Porcentaje de positividad de todos casos de influenza, SE 32, 2018 (en comparación a 2010-2017)




Graph 2. Ecuador IRAG: Influenza and RSV distribution from SARI sentinel cases, EW 32, 2014-18



Graph 4. Ecuador: Percent of SARI cases per total hospitalizations, as of EW 30, 2018 (compared to 2016-2017)

Porcentaje de casos de IRAG por total de hospitalizaciones hasta la SE 30, 2018 (en comparación a 2016-2017)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Peru

- During EW 30, at national level, SARI case counts among all hospitalizations decreased compared to previous weeks, but remained higher than the 2015-2017 seasons for the same period (Graph 4). In EW 30, influenza activity decreased below the alert threshold, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1,3). RSV positivity slightly increased, as compared to the previous weeks and was lower than levels observed in 2017 for the same period (Graph 2). During SE 30, at the national level, ARI case counts, under 5 years of age, were similar to the levels observed in 2016-2017 for the same period (Graph 5), however the pneumonia case counts in infants under 5 years of age were higher than the counts reported in 2016-2017 for the same period (Graph 6). During EW 31, 19 departments reported pneumonia cumulative cases among the under 5 years of age children higher than during the 2017 season for the same period: Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, and Ucayali. / En la SE 30, a nivel nacional, el número de casos de IRAG entre el total de hospitalizaciones descendió respecto a las semanas previas aunque se mantiene superior a lo observado en las temporadas 2015-2017 para el mismo período (Gráfico 4). Durante la SE 30, la actividad de influenza se ubicó bajo el nivel de alerta, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1,3). La positividad de VSR aumentó ligeramente, en comparación con las semanas anteriores y fue menor a los niveles observados en 2017 para el mismo período (Gráfico 2). Durante la SE 30, a nivel nacional, el recuento de casos de IRA en menores de 5 años fue similar a los niveles observados en 2016-2017 para el mismo período (Gráfico 5), sin embargo, el recuento de casos de neumonía en niños menores de 5 años, aunque en descenso, fue superior a los niveles reportados en 2016-2017 para el mismo período (Gráfico 6). Durante la SE 31, 19 departamentos reportaron recuento de casos de neumonía en niños menores de 5 años superior a los niveles reportados en 2017 para el mismo período: Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, y Ucayali.

Graph 1. Peru: Influenza virus distribution by EW 30, 2014-18




Graph 2. Peru: Influenza and RSV distribution, EW 30, 2014-18




Graph 3. Perú: Percent positivity for influenza, EW 30, 2018 (in comparison to 2010-2017)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 30, 2018 (en comparación a 2010-2017)




Graph 4. Peru: Number of SARI cases out of all hospitalizations, by EW 30, 2018 (in comparison with 2015-17)


Número de casos IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE 30, 2018 (en comparación con 2015-17)



Graph 5. Peru. ARI cases in children under 5 years, by EW 30, 2016-2018
Casos de IRA en niños menores de 5 años, por SE 30, 2016-2018.



Graph 6. Peru: Pneumonia cases in children under 5 years, by EW 30, 2016-2018
Casos de neumonía en niños menores de 5 años, por SE 30, 2016-2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Venezuela

- During EW 15, influenza activity remained at low levels with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1, 2). Up to EW 15, no RSV detections were reported. / En la SE 15 la actividad de influenza se mantuvo baja con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1, 2). A la SE 15, no se reportaron detecciones por VSR (Gráfico 2).

Graph 1. Venezuela: Influenza virus distribution by EW 15, 2015-18
Distribución de virus influenza por SE 15, 2015-18



Graph 2. Venezuela: Influenza and RSV distribution, EW 15, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 15, 2014-18




Argentina

- During EW 31, at national level, the number of SARI cases was lower than previous weeks and below the alert threshold (Graph 2, 6). ILI activity was low for the period (Graph 1). During EW 32, influenza activity slightly decreased as compared with the previous weeks with overall few samples tested, and influenza B predominating (Graphs 3, 5). RSV positivity slightly decreased and was similar to the levels reported during the previous season for the same period (Graph 4). / En la SE 31, a nivel nacional los casos de IRAG fueron menores a las semanas previas y estuvieron por debajo el umbral de alerta (Gráfico 2 y 6). La actividad de ETI fue baja para el período (Gráfico 1). Durante la SE 32, la actividad de influenza disminuyó ligeramente en comparación con semanas previas, con recuento bajo de muestras estudiadas, y predominio de influenza B (Gráficos 3, 5). El porcentaje de positividad para VSR disminuyó ligeramente y fue similar a lo registrado en la temporada previa para el mismo período (Gráficos 4).


Graph 1. Argentina. ILI cases. Endemic channel, EW 27, 2018 (compared to 2013-2017) / Casos de ETI. Corredor endémico, SE 27, 2018 (en comparación a 2013-2017)

Gráfico 1 - Argentina: Corredor endémico semanal de ETI 2018. Curva de casos y estimaciones hasta la SE27. Total país. Históricos 5 años: 2013 a 2017.




Graph 2. Argentina. SARI cases. Endemic channel, EW 27, 2018 (compared to 2013-2017) / Casos de IRAG. Corredor endémico, SE 27, 2018 (en comparación a 2013-2017)


Gráfico 2. Argentina: Corredor endémico semanal de IRAG. Curva de 2018 hasta SE27. Históricos 5 años: 2013 a 2017.



Graph 3. Argentina. Influenza virus distribution by EW 32, 2014-18 Distribución de virus influenza por SE 32, 2014-18




Graph 4. Argentina: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18 Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18




Graph 5. Argentina: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)

Línea basal para el porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2018 (en comparación a 2010-2017)



Graph 6. Argentina: Number of SARI cases out of all hospitalizations, by EW 31, 2018 (in comparison with 2012-17)

Número de casos IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE 31, 2018 (en comparación con 2012-17)




Brazil


- In Brazil, during EW 32, cumulative SARI hospitalizations and deaths increased and were lower than in 2016 but higher than the other seasons for the same period (Graphs 1,2). During EW 32, the SARI case counts out of all hospitalizations were lower than in previous weeks and the 2015-2017 seasons (Graph 10). Since the beginning of 2018, among the SARI cases with viral diagnostic results, most have been positive for non-influenza respiratory viruses. The cumulative number of SARI-influenza cases and SARI-influenza deaths were higher than the counts reported in 2017 and less than in 2016

(Graph 3, 4). During EW 32, a slight decrease in the detection of influenza positive cases was reported by the three NICs, with influenza A (H1N1)pdm09 and (H3N2) co-circulating, and some influenza B detections reported; RSV detections have been decreasing in the last month (Graph 5-9). During EW 33, 25 states reported higher cumulative influenza-associated SARI/ILI case counts than the historic average 2014-2017 (>1 standard deviation above): Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe and Tocantins. In EW 33, 21 states reported higher cumulative influenza-associated SARI/ILI deaths counts than the historic average 2014-2017 (>1 standard deviation above): Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe and Tocantins. / En Brasil, en la SE 32, las hospitalizaciones y los casos fallecidos por IRAG acumulados aumentaron y fueron menores que en 2016 pero superiores a las restantes temporadas para el mismo período (Gráficos 1, 2). Durante la SE 32, el recuento de casos de IRAG sobre el total de hospitalizaciones fue menor que las semanas previas y las temporadas 2015-2017 para el mismo período (Gráfico 10). Desde el inicio de 2018, de los casos de IRAG con resultado de diagnóstico viral, la mayoría ha sido positivo para virus respiratorios distintos de influenza. El número acumulado de casos de IRAG por influenza y de casos fallecidos asociados a influenza fueron superiores a los recuentos de 2017 y menores a los recuentos reportados en 2016 (Gráficos 3, 4). En la semana 32, se ha detectado una ligera disminución entre los casos positivos de influenza reportados por los tres NICs, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2), junto con algunas detecciones de B; las detecciones de VSR han disminuido en las últimas semanas (Gráficos 5-9). Durante la SE 33, 25 estados reportaron elevados recuentos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza en comparación al promedio historico 2014-2017 (>1 desviacion estandar arriba): Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins. En la SE 33, 21 estados reportaron elevados recuentos acumulados de fallecidos por IRAG/ETI asociados a influenza en comparación al promedio historico 2014-2017 (>1 desviacion estandar arriba): Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe y Tocantins


Graph 1. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related cases, by EW 32, 2018
Distribución de casos acumulados de IRAG, por SE 32, 2018




Graph 3. Brazil. Distribution of cumulative flu(+) SARI-related cases, by EW 32, 2018
Distribución de flu(+) casos acumulados de IRAG, por SE 32, 2018




Graph 2. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related deaths, by EW 32, 2018
Distribución de fallecidos acumulados de IRAG, por SE 32, 2018




Graph 4. Brazil. Distribution of cumulative flu(+) SARI-related deaths, by EW 32, 2018
Distribución de flu(+) fallecidos acumulados de IRAG, por SE 32, 2018




Graph 5. Brazil- All NICs. Influenza virus distribution by EW 32, 2017-2018
Distribución de virus influenza por SE 32, 2017-2018




Graph 7. Brazil - NIC IEC. Influenza virus distribution by EW 31, 2017-2018
Distribución de virus influenza por SE 31, 2017-2018




Graph 9. Brazil- NIC Adolfo Lutz. Influenza virus distribution by EW 32, 2017-2018
Distribución de virus influenza por SE 32, 2017-2018




Graph 6. Brazil – All NICs: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2018
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2018



Graph 8. Brazil- NIC FIOCRUZ. Influenza virus distribution by EW 32, 2017-2018
Distribución de virus influenza por SE 32, 2017-2018




Graph 10. Brazil: Number of SARI cases out of all hospitalizations, by EW 32, 2018 (in comparison with 2015-17)
Número de casos IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE 32, 2018 (en comparación con 2015-17)




Chile

- During EW 32, at national level, the SARI cases decreased as compared to the previous weeks and remained at the alert threshold levels observed during 2015-2017 for the same period (Graph 4); while ILI activity increased below the average epidemic curve, and was lower to levels observed in previous seasons for the same period (Graph 5). In EW 32, influenza activity increased and remained above the historic average, with influenza A(H3N2) predominating (Graphs 1,3). RSV percent positivity decreased and was similar to the levels reported in 2017 for the same period (Graph 2). / Durante la SE 32, a nivel nacional, los casos de IRAG disminuyeron en relación a las semanas previas y permanecieron en los niveles del umbral de alerta observados durante 2015-2017 para el mismo período (Gráfico 4), mientras que la actividad de ETI aumentó bajo la curva epidémica promedio, y fue menor a lo observado en las temporadas previas para este período (Gráfico 5). En la SE 32, la actividad de influenza aumentó y permaneció similar al promedio histórico, con predominio de influenza A(H3N2) (Gráficos 1, 3). El porcentaje de positividad de VSR disminuyó y fue similar a los niveles reportados en 2017 para el mismo período (Gráfico 2).

Graph 1. Chile: Influenza virus distribution by EW 32, 2014-18
Distribución de virus de influenza, por SE 32, 2014-18




Graph 2. Chile: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18




Graph 3. Chile: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)


Línea basal para el porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2018 (en comparación a 2010-2017)



Graph 4. Chile. Percent of SARI cases from all hospitalizations, EW 32, 2015-2018, Porcentaje de casos IRAG por las hospitalizaciones totales, SE 32, 2015-2018



Graph 5. Chile. Number of ILI cases, EW 32, 2018, in comparison 2015-17
Número de casos ETI, SE 32, 2018, en comparación 2015-17




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Paraguay

- During EW 32, at national level, the SARI cases decreased as compared to the previous weeks and were above the alert threshold as compared to the previous seasons (Graph 5); while the percent of SARI deaths out of total deaths increased (Graph 6). ILI activity increased above the seasonal levels (Graph 4). In EW 32, influenza activity slightly increased from previous weeks with influenza A(H3N2) and B co-circulating (Graphs 1, 3); while RSV positivity decreased in recent weeks (Graph 2). / En la SE 32, a nivel nacional los casos de IRAG disminuyeron, y se ubicaron sobre el umbral de alerta en comparación a las temporadas anteriores (Gráfico 5) mientras que el porcentaje de muertes por IRAG sobre el total de defunciones aumentó (Gráfico 6). La actividad de ETI permaneció sobre los niveles estacionales (Gráfico 4). Durante la SE 32, la actividad de influenza aumentó ligeramente en relación a las semanas anteriores, con co-circulación de influenza A(H3N2) y B (Gráficos 1, 2), y el porcentaje de positividad para VSR disminuyó en semanas recientes (Gráfico 2).


Graph 1. Paraguay: Influenza virus distribution EW 32, 2014-18
Distribución de virus de influenza, SE 32, 2014-18



Graph 2. Paraguay: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18




Graph 3. Paraguay SARI sentinel sites: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)



Graph 5. Paraguay: Percent of SARI cases per total hospitalizations, EW 32, 2018


Porcentaje de casos IRAG por total hospitalizaciones, SE 32, 2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Graph 4. Paraguay: Proportion of ILI consultations, EW 31, 2018 (as compared to 2012-2017)

Proporción de consultas por ETI en centros centinela, según semana epidemiológica. Paraguay. Año 2018, SE 31 (comparación con los años 2014-2017)



Graph 6. Paraguay: Percent of SARI deaths per total deaths, EW 32, 2018. Porcentaje de fallecidos por IRAG, SE 32, 2018




Uruguay

- In EW 32, increased influenza activity was reported (Graphs 3, 4); with increased RSV positivity (Graph 2). During EW 31, the percentage of SARI cases among all hospitalizations increased, and was higher than the levels observed in previous season for the same period (Graph 1). / Durante la SE 32, se reportó mayor actividad de influenza (Gráficos 3, 4); con positividad de VSR en aumento (Gráfico 2). Durante la SE 31, el porcentaje de casos de IRAG del total de hospitalizaciones aumentó, siendo superior a los niveles observados la temporada anterior para el mismo período (Gráfico 1).


Graph 1. Uruguay: % SARI cases among all hospitalizations, EW 31, 2018; porcentaje de casos IRAG por todas las hospitalizaciones, SE 31, 2018




Graph 3. Uruguay: Influenza virus distribution by EW 32, 2018
Distribución de virus de influenza, por SE 32, 2018



Graph 2. Uruguay: Influenza and RSV distribution, EW 32, 2014-18
Distribución de virus influenza y VSR, SE 32, 2014-18



Graph 4. Uruguay: Percent positivity for influenza, EW 32, 2018 (in comparison to 2010-2017)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 32, 2018 (en comparación a 2010-2017)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

In the temperate zones of the southern hemisphere, influenza activity remained elevated in South America and continued to decrease in Southern Africa. Influenza activity remained below seasonal threshold in Australia and New Zealand and at inter-seasonal levels in most of temperate zone of the northern hemisphere. Reports of influenza activity were reported as decreased in some countries of tropical America. Worldwide, seasonal influenza subtype A viruses accounted for the majority of detections. / En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza se mantuvo elevada en América del Sur y continuó disminuyendo en el sur de África. La actividad de influenza se mantuvo por debajo del umbral estacional en Australia y Nueva Zelanda y en niveles interestacionales en la mayoría de las zonas templadas del hemisferio norte. Los informes de actividad de influenza se informaron como disminuidos en algunos países de América tropical. En todo el mundo, los virus del subtipo A de influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.

National Influenza Centres (NICs) and other national influenza laboratories from 67 countries, areas or territories reported data to FluNet for the time period from 23 July to 5 August 2018. The WHO GISRS laboratories tested more than 42056 specimens during that time period. 916 were positive for influenza viruses, of which 799 (87.2%) were typed as influenza A and 117 (12.8%) as influenza B. Of the sub-typed influenza A viruses, 535 (79.6%) were influenza A(H1N1)pdm09 and 137 (20.4%) were influenza A(H3N2). Of the characterized B viruses, 39 (72.2%) belonged to the B-Yamagata lineage and 15 (27.8%) to the B-Victoria lineage. / Los Centros Nacionales de Influenza (NICs) y otros laboratorios nacionales de influenza de 67 países, áreas o territorios, reportaron datos a FluNet en el período del 23 de julio a 5 de Agosto de 2018. Los laboratorios de la OMS GISRS realizaron pruebas a más de 42056 muestras durante ese período. 916 tuvieron resultado positivo para virus influenza, de los cuales 799 (87,2%) fueron tipificados como influenza A y 117 (12,8%) como influenza B. De los virus influenza A subtipificados, 535 (72,2%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 137 (20,4%) fueron influenza A(H3N2). De los virus influenza B caracterizados, 39 (72,2%) fueron del linaje B-Yamagata y 15 (27,8%) fueron del linaje B-Victoria.

Percentage of respiratory specimens that tested positive for influenza By influenza transmission zone

Status as of 17 August 2018



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source:
 Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS),
 FluNet (www.who.int/flu-net)

World Health Organization
 © WHO 2018. All rights reserved.

ACRONYMS

ARI	Acute Respiratory Infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological Week
ILI	Influenza-like illness
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
ICU	Intensive Care Unit
RSV	Respiratory Syncytial Virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe/Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad Tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRAG	Infección Respiratoria Aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
VSR	Virus Sincitial Respiratorio