



VACUNA A TU NIÑO CONTRA EL SARAMPIÓN

LE PUEDES SALVAR LA VIDA

EL SARAMPIÓN PUEDE CAUSAR:

- NEUMONÍA
- DAÑO CEREBRAL PERMANENTE
- SORDERA
- PARTO PREMATURO
- BEBÉS CON BAJO PESO AL NACER
- MUERTE



ESTOS SON LOS SÍNTOMAS

- FIEBRE ALTA
- MOQUEO NASAL
- TOS
- OJOS ROJOS
- ERUPCIÓN O SARPULLIDO

SUELEN APARECER DE 7 A 14 DÍAS DESPUÉS DE INFECTARSE

SE TRANSMITE CUANDO UNA PERSONA INFECTADA RESPIRA, TOSE O ESTORNUDA.

LA PERSONA INFECTADA PUEDE CONTAGIAR DESDE 4 DÍAS ANTES HASTA 4 DÍAS DESPUÉS DE PRESENTAR ERUPCIONES.

¿CUÁNDO DEBEMOS VACUNAR A LOS NIÑOS?




1ERA DOSIS
[12-15 meses]



2DA DOSIS
[4-6 años]

LA ÚNICA MANERA DE PREVENIR EL SARAMPIÓN ES CON LA VACUNACIÓN.



LA VACUNA ES SEGURA Y EFECTIVA.

PROTÉGETE Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS. EVITA EL SARAMPIÓN #VACÚNATE

OPS



Organización Panamericana de la Salud



Organización Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

paho.org/sarampion