




2019

Weekly / Semanal **Influenza Report EW 4/ Reporte de Influenza SE 4**


Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios

February 5, 2019
5 de febrero de 2019

*Data as of February 1 2019/
Datos hasta 1 de febrero de 2019*

*Prepared by PHE/IHM/Influenza Team/
Realizado por PHE/IHM/Equipo de Influenza*

FluID



FluNet



Map Production /Producción del mapa: PAHO/WHO, OPS/OMS.

Data Source / Fuente de datos:
Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States
Reports to the informatics global platforms [FluNet](#) and /
Informe de los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de
Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas
globales de [FluNet](#) y [FluID](#)

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the informatics global platforms http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/ and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/ ; and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [FluID](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/phil/viz/ed_flu.asp

PAHO FluID: <http://ais.paho.org/phil/viz/flumart2015.as>

Influenza Regional Reports / Informes regionales de influenza:

In English: <http://www.paho.org/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARInet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARInet:

<http://www.sarinet.org>

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	<u>Weekly Summary / Resumen Semanal</u>	5
2	<u>Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VSR</u>	6
3	<u>Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados</u>	7
4	<u>Epidemiological and Virologic update by country / Actualización epidemiológica y virológica por país</u>	8
5	<u>Acronyms / Acrónimos</u>	31

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: Overall, influenza activity slightly decreased in [Canada](#) and increased in the [United States](#), with influenza A(H1N1)pdm09 predominating. In [México](#), high influenza-associated SARI activity was reported with predominance of influenza A(H1N1)pdm09.

Caribbean: Influenza virus activity increased and lower RSV activity was reported throughout most of the sub-region. In [Cuba](#) and [Suriname](#), SARI activity was low with increased influenza A(H1N1)pdm09 circulation. Bronchiolitis consultations remained above seasonal levels in most of the [French Territories](#).

Central America: Epidemiological indicators remained at moderate levels and influenza activity was low throughout the sub-region with influenza A(H1N1)pdm09 and B co-circulating. Overall, RSV activity decreased; while in [Costa Rica](#), RSV circulation continued elevated. In [Costa Rica](#), moderate pneumonia and SARI activity were reported associated with influenza and RSV.

Andean Region: Overall influenza activity decreased in the sub-region with influenza A(H3N2) predominance. In [Bolivia](#), [Peru](#) and [Ecuador](#), influenza A(H3N2) and B co-circulated with moderate SARI activity.

Brazil and Southern Cone: Influenza activity was low throughout the sub-region. [Brazil](#) and [Chile](#), influenza-associated SARI cases decreased associated with influenza B detections.

Global: In the temperate zone of the northern hemisphere influenza activity continued to increase slowly. In North America influenza activity remained elevated overall with influenza A(H1N1)pdm09 predominating, while both influenza A viruses circulated in Europe. In Western and East Asia, some countries reached medium levels of influenza intensity. In Southern Asia, influenza detections remained elevated overall mainly due to increased influenza A(H3N2) detections. In the temperate zones of the southern hemisphere, influenza activity returned to inter-seasonal levels with exception of some parts in Australia. Worldwide, seasonal influenza A viruses accounted for the majority of detections.

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: En general, la actividad de influenza disminuyó ligeramente en [Canadá](#) y aumentó en los [Estados Unidos](#), con predominio de A(H1N1)pdm09. En [México](#), se reportó elevada la actividad de IRAG asociada a influenza con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó menor actividad de VSR en la mayoría de la subregión. En [Cuba](#) y [Suriname](#) la actividad de IRAG fue baja con elevada circulación de influenza A(H1N1)pdm09. Las consultas por bronquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en la mayoría de los [Territorios Franceses](#).

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza permaneció baja en la sub-región con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B. La actividad de VSR disminuyó en general; en tanto en [Costa Rica](#), la circulación de VSR continuó elevada. En [Costa Rica](#), se reportó moderada actividad de neumonía e IRAG asociada a influenza y VSR.


Sub-región Andina: La actividad general de influenza disminuyó en la sub-región con predominio de influenza A(H3N2). En [Bolivia](#), [Peru](#) y [Ecuador](#), co-circularon influenza A(H3N2) y B con moderada actividad de IRAG.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región. En [Brasil](#) y [Chile](#), los casos de IRAG por influenza disminuyeron asociados a detecciones influenza B.

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando lentamente. En América del Norte, la actividad de influenza permaneció elevada en general, predominando influenza A(H1N1) pdm09, mientras que ambos virus influenza A circularon en Europa. En Asia occidental y oriental, algunos países alcanzaron niveles medios de intensidad de influenza. En el sur de Asia, las detecciones de influenza se mantuvieron elevadas en general debido principalmente al aumento de las detecciones de influenza A(H3N2). En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles interestacionales, con excepción de algunas partes en Australia. En todo el mundo, los virus influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones.


Influenza circulation by subregion, 2014-19

Circulación de virus influenza por subregión, 2014-19



Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by subregion, 2014-19


Circulación de virus sincicial respiratorio (VSR) por subregión, 2014-19




*To view more lab data, view [here](#). / Para ver mas datos lab, vea [aquí](#).

Genetic Characterization of Influenza Virus by Subregion, 2017-19

Caracterización Genética de los Virus Influenza por Subregión, 2017-19



These data are from the WHO –Collaborating Center at the U.S. CDC.
Estos datos son recolectados desde el CC de la OMS en el CDC de EE. UU.



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory virus, by country and EW, 2019¹

Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2019²

EW 4, 2019 / SE 4, 2019

	Max. N _mues tras	Max. F LUAH3	Max. F LUH1N 1	Max. I nfluen za A n..	Max. F LUAH3	Max. B Victori a	Max. B Yamag ata	Max. B linaje no deter..	Influen za (+) %	Max. A denovi rus	Max. P arainfl uenza	Max. VSR	% RSV/ VSR (+)	Max. B ocavir us	Max. C oronav irus	Max. Metap neum..	Max. R inoviru s	% All P ositive Samp..
North America/ ..	683	9	158	0	8	3	10	15	29.7%	0	1	0	0%	0	0	0	2	30.2%
Caribbean/ Caribe	10	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	1	10%	0	0	0	0	10.0%
Dominican Rep..	11	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Suriname	23	0	5	0	0	0	0	0	21.7%	0	0	0	0%	0	0	0	0	21.7%
Central America/ América Central	21	2	0	0	0	1	0	0	14.3%	0	3	2	10%	0	0	13	0	100.0%
Costa Rica	17	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
El Salvador*	5	1	0	0	0	0	0	0	40.0%	0	0	1	20%	0	0	1	0	80.0%
Guatemala	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Honduras	80	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	1	0	0%	0	0	1	0	2.5%
Nicaragua	63	7	0	0	0	0	0	0	11.1%	0	0	6	10%	0	0	0	0	20.6%
Andean/ Andina	115	5	3	3	0	0	0	1	10.4%	6	3	13	11%	3	3	2	3	39.1%
Bolivia	17	4	0	0	0	0	0	0	23.5%	0	0	5	29%	0	0	0	0	52.9%
Colombia	9	3	1	0	0	0	0	0	44.4%	2	1	1	11%	0	0	0	0	77.8%
Ecuador IRAG	36	0	0	0	0	0	1	0	13.9%	0	1	0	0%	0	0	0	0	16.7%
Ecuador - Inusita..	42	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Peru	313	1	2	3	0	0	2	1	2.9%	11	6	5	2%	0	0	1	0	10.2%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Brazil	49	1	3	0	0	0	0	1	10.2%	0	1	3	6%	0	0	0	0	18.4%
Chile	12	0	3	0	0	1	0	0	33.3%	0	1	0	0%	0	0	0	0	41.7%
Chile_IRAG	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Paraguay	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Paraguay IRAG	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Uruguay ETI	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Uruguay IRAG	1,516	33	175	6	8	5	13	18	20.4%	19	17	37	2%	3	3	18	5	25.1%
Grand Total																		

These are the raw numbers provided in the country's FluNet update (Not the smoothed averages)
Estos son los números crudos proporcionados en la actualización FluNet del país (no los promedios suavizados)

*Please note blank cells indicate N/A.

*Por favor notar que las células en blanco indican N/A.

* NIC laboratory data only / datos de laboratorio solo del NIC

EW 3, 2018 / SE 3, 2018

*Note: These countries reported in EW 3, 2019, but have provided data up to EW 3.

*Nota: Estos países reportaron en la SE 3, 2019, pero han enviado los datos hasta la SE 3.

	N samples/ muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A (H1N1)pdm09	Influenza A No subtipificado	Total Influenza B	Influenza (+) %	Adenovirus	RSV/VSR	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	Metapneumo..	Rhinovirus*	Parainfluenza*	% All Positive Samples (+)
North America/ .. USA	32,062	133	573	4,885	111	17.8%				0	0	0	0	0	17.8%
Caribbean/ Caribe	12	0	0	0	0	0.0%				0	0	0	0	0	0.0%
Dominican Rep..	9	0	4	0	0	44.4%	0	0	0%	0	0	0	0	0	44.4%
Suriname	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0.0%
Central America/ América Central	92	1	0	0	0	1.1%	2	2	2%	0	0	0	0	2	7.6%
Costa Rica	65	1	2	0	1	6.2%	1	3	5%	0	0	0	0	0	12.3%
El Salvador*															
Guatemala															
Honduras															
Nicaragua															
Panama															
Grand Total	32,241	135	579	4,885	112	17.7%	3	5	0%	0	0	0	0	2	17.7%

EW 1 - EW 4, 2019 / SE 1 - SE 4, 2019

	N samples/ muestras	Influenza (H3N2)*	Influenza A (H1N1) pdm09*	Influenza A non- subtyped*	Influenza B Victoria*	Influenza B Yamagata*	Influenza B lineage undetermi..	Influenza (+) %	Adenoviru..	Parainflue..	RSV/VSR*	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavir..	Metapneu..	Rhinovirus*	% All Positive Samples (+)
North America/ América del Norte	177,732	304	3,335	8,628	0	0	142	7.0%	184	483	4,664	2.6%	0	718	337	1,039	11.2%
Caribbean/ Caribe	9,621	46	2,614	0	37	113	64	30.8%	8	22	42	0.4%	0	8	24	10	32.0%
USA	109,814	545	2,597	14,834	9	20	451	16.8%	0	0	0	0%	0	0	0	0	16.8%
Bolivia	48	0	0	0	0	1	0	2.1%	0	0	3	6.3%	0	0	0	0	8.3%
Cuba	26	0	4	0	0	1	0	19.2%	0	1	4	15.4%	1	0	0	1	46.2%
Cuba IRAG	17	0	3	0	0	1	0	23.5%	0	0	3	17.6%	1	0	0	1	52.9%
Dominican Rep..	50	0	3	0	0	0	0	6.0%	0	0	4	8.0%	0	0	0	0	14.0%
Haiti	15	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
Jamaica	61	1	5	0	0	0	0	9.8%	0	0	1	1.6%	0	0	0	0	11.5%
Suriname	47	1	11	0	0	0	0	25.5%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	25.5%
Central America/ América Central	126	10	5	0	5	0	0	15.9%	0	15	8	6.3%	0	0	48	0	72.2%
Costa Rica	55	0	1	0	0	0	0	1.8%	0	0	5	9.1%	0	0	0	0	10.9%
El Salvador*	68	0	1	0	0	0	0	1.5%	1	0	5	7.4%	0	0	0	0	10.3%
Guatemala	44	4	0	1	0	0	0	20.5%	0	4	3	6.8%	0	0	2	0	40.9%
Honduras	13	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	1	7.7%	0	0	0	0	7.7%
Nicaragua	982	0	8	0	0	0	66	7.5%	0	10	6	0.6%	0	0	12	0	10.4%
Panama	127	3	0	0	0	1	0	3.1%	4	3	15	11.8%	2	1	12	44	66.9%
Andean/ Andina	255	50	0	1	0	0	0	20.0%	0	0	13	5.1%	0	0	0	0	25.1%
Bolivia	538	26	14	3	0	0	4	8.7%	25	14	64	11.9%	11	14	10	13	37.0%
Colombia	111	36	0	0	0	0	6	37.8%	0	1	12	10.8%	0	0	1	0	50.5%
Ecuador	335	84	2	0	0	0	6	27.5%	1	5	31	9.3%	0	0	1	0	38.8%
Ecuador IRAG	164	12	2	0	0	1	0	11.6%	0	3	1	0.6%	0	0	0	4	16.5%
Peru	8	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
Venezuela	472	2	0	5	0	1	1	1.9%	14	17	9	1.9%	0	0	5	0	11.4%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	153	0	0	0	0	0	1	0.7%	0	0	4	2.6%	0	0	0	0	3.3%
Brazil	1,338	6	3	0	0	17	4	2.7%	71	29	16	1.2%	0	0	16	0	12.6%
Chile	87	1	0	0	0	0	2	3.4%	0	3	0	0.0%	0	0	7	0	14.9%
Chile_IRAG	283	2	8	0	0	0	2	4.2%	7	2	15	5.3%	0	0	0	0	12.7%
Paraguay	209	1	7	0	2	0	0	4.8%	8	2	12	5.7%	0	0	0	0	15.3%
Paraguay IRAG	4	0	1	0	0	0	0	25.0%	0	0	1	25.0%	0	0	0	0	50.0%
Uruguay	1	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%
Uruguay ETI	14	0	1	0	0	0	0	7.1%	0	0	1	7.1%	0	0	0	0	14.3%
Uruguay IRAG																	
Grand Total	302,818	1,134	8,628	23,475	53	156	749	11.3%	323	614	4,943	1.6%	15	741	475	1,112	14.0%

Total Influenza B, EW 47, 2018- 4, 2019

	Total Influenza B	B Victoria	B Yamagata	B linaje no deter..	% B Victoria	% B Yamagata
North America/ América del Norte	1,806	96	182	1,528	35%	65%
Caribbean/ Caribe	31	14	6	11	70%	30%
Central America/ América Central	196	14	9	173	61%	39%
Andean/ Andina	57	0	6	51	0%	100%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	334	57	87	190	40%	60%
Grand Total	2,424	181	290	1,953	38%	62%

¹ The detection of respiratory viruses other than influenza depends on the diagnostic capacity of each country and monitoring system. The absence of report of other respiratory viruses does not indicate the absence of their circulation.


² La detección de otros virus respiratorios diferentes a influenza depende de la capacidad diagnóstica de cada país y del sistema de vigilancia establecido. El que no se reporten otros virus respiratorios, no significa, ni indica la ausencia de circulación viral.

North America / América del Norte

Canada / Canadá

- In EW 4, the percent of ILI visits at the national level increased and was below the 5-year average for the same period (Graph 2). During EW 3, influenza activity continued to increase: 2 regions reported widespread activity in Quebec and PEI; 19 regions reported localized activity in Alta, Ontario, Quebec, N.L., N.S., P.E.I and N.B; and most of the provinces and territories reported sporadic ILI activity (Graph 3). During EW 3, influenza detections decreased (Graph 1) and influenza A(H1N1)pdm09 predominated among the influenza detections. RSV positivity remained elevated in recent weeks, while parainfluenza, adenovirus and coronavirus predominated among the other respiratory viruses (Graph 4). In EW 4, the pediatric hospitalizations decreased above the average for 2010-2018 after a peak 4-6 weeks earlier than in recent seasons (Graph 5). A total of 747 pediatric hospitalizations were reported, with 99% of all cases associated with influenza A and mainly among the children under 9 years-of-age. From EW 35 to EW 4, 126 pediatric ICU admissions were reported, mainly among children under 5 years of age. The elderly was the most affected among influenza-associated adult hospitalizations. Ten pediatric deaths were registered during the 2018-19 season. / En la SE 4, el porcentaje de consultas por ETI a nivel nacional aumentó y se ubicó dentro del promedio de 5 años para el mismo período (Gráfico 2). Durante la SE 4, la actividad de influenza continuó en aumento: 2 regiones reportaron actividad diseminada en Quebec y PEI; 19 regiones reportaron actividad localizada de ETI en Quebec; y la mayoría de los territorios y provincias reportaron esporádica actividad de ETI (Gráfico 3). Durante la SE 3, las detecciones de influenza disminuyeron (Gráfico 1) y los virus influenza A(H1N1)pdm09 predominaron entre las detecciones de influenza. La positividad de VSR permaneció elevada en semanas recientes, en tanto parainfluenza, adenovirus y coronavirus predominaron entre los otros virus respiratorios (Gráfico 4). En la SE 4, las hospitalizaciones pediátricas disminuyeron sobre el promedio para 2010-2018 luego de un pico 4-6 semanas antes que en las previas temporadas (Gráfico 5). Se reportó un total de 747 hospitalizaciones pediátricas, con 99% de todos los casos asociados a influenza A y mayoritariamente en niños menores de 9 años de edad. Desde la SE 35 a la SE 4, se reportaron 126 admisiones a UCI pediátricas, principalmente entre niños menores de 5 años. Los adultos mayores fueron los más afectados entre las hospitalizaciones de adultos asociadas a influenza. Se registraron diez muertes pediátricas durante la temporada 2018-2019.


Graph 1. Canada: Influenza virus distribution by EW, 2015-19, EW 3. / Distribución de virus de influenza por SE, 2015-19. SE 3.



Graph 2. Canada: Percentage of ILI visits by sentinel sites, EW 4, 2019 (in comparison to 2012-2017 seasons)

Porcentaje de casos de ETI por sitio centinela, SE 4, 2019 (en comparación con temporadas 2012-2017)


Figure 4 – Percentage of visits for ILI reported by sentinels by report week, Canada, weeks 2018-35 to 2019-04
Number of Sentinels Reporting in Week 04: 53



Graph 3. Canada: Influenza activity by provincial and territorial influenza surveillance regions, 2017-2018, EW 4, 2019.


Actividad de influenza por regiones de vigilancia de influenza provinciales y territoriales, 2017-2018, SE 4 2019.

Figure 1 – Map of overall influenza/ILI activity by province and territory, Canada, week 2019-04




Graph 4. Canada: RSV distribution by EW, EW 4, 2019. / Distribución de VSR por SE, SE 4, 2019.

Figure 3: Positive Respiratory syncytial virus (RSV) Tests (%) in Canada by Region by Week of Report



Graph 5. Canada: Number of pediatric hospitalizations (≤ 16 years old) by EW, EW 35, 2018 to EW 4, 2019. /
Número de hospitalizaciones pediátricas (≤ 16 años) por SE, SE 35 2018 a SE 4 2019

Figure 7 – Number of pediatric (≤ 16 years of age) hospitalizations reported by the IMPACT network, by week, Canada, weeks 2018-35 to 2019-04




The shaded area represents the maximum and minimum number of cases reported by week from seasons 2010-11 to 2017-18

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


United States / Estados Unidos

- In EW 4, ILI activity at the national level increased above the seasonal threshold of 2.2% (Graph 4). New York city and 23 states (Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Vermont, and Virginia) experienced high ILI activity and 10 states experienced moderate activity, with low activity reported in the rest of the country during EW 4 (Graph 5). Influenza detections slightly decreased during EW 4, while RSV activity remained elevated in recent weeks. Influenza A(H1N1)pdm09 and both lineages of influenza B co-circulated in recent weeks (Graph 1,2). The proportion of pneumonia and influenza deaths among all deaths was above the epidemic threshold of 7.2% for EW 2 (Graph 3). Twenty-four pediatric deaths due to influenza A were reported during the 2018-2019 season. In EW 4, the overall laboratory-confirmed influenza hospitalization rate (15.3 per 100,000 population) was lower than the previous season for the same period (57.7 per 100,000 population), with the highest rates among children aged 0-4 (Graph 6). / En la SE 4, la actividad de ETI a nivel nacional aumentó sobre el umbral estacional de 2,2% (Gráfico 4). New York city y 23 estados (Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Vermont, y Virginia) presentaron actividad de ETI elevada y 10 estados presentaron actividad moderada de ETI, con baja actividad reportada en el resto del país durante la SE 4 (Gráfico 5). Las detecciones de influenza disminuyeron durante la SE 4, en tanto la actividad de VSR permaneció elevada en semanas recientes. Influenza A(H1N1)pdm09 y ambos linajes de B co-circularon en semanas recientes (Gráfico 1, 2). La proporción de fallecidos por neumonía e influenza del total de fallecidos se ubicó sobre el umbral epidémico de 7,2% para la SE 2 (Gráfico 3). Se reportaron veinticuatro muertes pediátricas debida a influenza A durante la temporada 2018-2019. En la SE 4, la tasa total de hospitalizaciones por influenza confirmada por laboratorio (15,3 por 100.000 habitantes) fue menor que en la temporada anterior para el mismo periodo (57,7 por 100.000 habitantes), con las tasas más altas en niños de 0-4 años (Gráfico 6).


Graph 1. US: Influenza virus distribution by EW 3, 2015-19
Distribución de virus de influenza por SE 3, 2015-19



Graph 2. US: Percent positivity for respiratory virus EW 3
Porcentaje de positividad para virus respiratorios, por SE 3,
2013/14- 2018/19




Graph 3. US: Pneumonia and influenza mortality. EW 2, 2019
Mortalidad por neumonía e influenza. SE 2, 2019




Graph 5. US: ILI activity level indicator determined by state, EW 4, 2018-2019.

Indicador de nivel de actividad de ETI por estado, SE 4, 2018-2019.




Graph 4. US: Percentage of visits for ILI, 2018-2019. EW 4
Porcentaje de visitas por ETI, 2018-2019. SE4.

Porcentaje de visitas por ETI, 2018-2019. SE4.



Graph 6. US: Laboratory-confirmed influenza hospitalizations rates (per 100000 population) by age group and W, EW 4, 2018-2019.


Tasas de hospitalizaciones (por 100000 habitantes) por
influenza confirmadas por laboratorio por grupo de edad y SE,
SE 4, 2018-2019




Mexico

- During EW 4, influenza activity continued elevated with influenza A(H1N1)pdm09 predominating. RSV activity decreased, with co-circulation of rhinovirus, parainfluenza and metapneumovirus in the last month (Graph 1, 2). Up to EW 3, influenza-associated SARI/ILI counts were slightly higher than the levels observed during most other seasons (Graph 3) and 368 influenza-associated SARI/ILI deaths were reported as compared from previous seasons for the same period (Graph 4, 8). In EW 3, 14 states reported higher influenza-associated SARI/ILI counts than the historic average ($\geq$ than 2 standard deviation above): Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Mexico, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala and Veracruz (Graph 5). In EW 3, 14 states reported higher influenza-associated SARI/ILI deaths counts than the historic average: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, and Veracruz (Graph 6). During EW 5, 3729 cumulative influenza-associated SARI/ILI cases were reported, with the highest counts in Ciudad de Mexico, Oaxaca, Estado de Mexico, Chihuahua, and Veracruz; and 368 influenza-associated SARI/ILI deaths predominating in Puebla, Baja California, Oaxaca, Estado de Mexico and Hidalgo (Graphs 7, 8). / Durante la SE 4, la actividad de influenza continuó elevada con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La actividad de VSR disminuyó, con co-circulación de rinovirus, parainfluenza y metapneumovirus en el último mes (Gráfico 1,2). Hasta la SE 3, los recuentos de IRAG/ETI asociados a influenza fueron ligeramente superiores a los niveles observados durante la mayoría de las restantes temporadas (Gráfico 3) y se reportaron 368 casos fallecidos de IRAG/ETI asociados a influenza en relación a las previas temporadas para el mismo período (Gráfico 4,8). En la SE 3, 14 estados reportaron mayores recuentos de IRAG/ETI asociados a influenza en comparación con el promedio histórico ($\geq$ a 2 desvíos estándar) : Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Mexico, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz (Gráfico 5). En la SE 3, 14 estados reportaron mayor recuento de fallecidos por IRAG/ETI asociados a influenza en comparación con el promedio histórico: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz (Gráfico 6). Durante la SE 5, fue reportado un total acumulado de 3729 casos de IRAG/ETI asociados a influenza con el mayor recuento en Ciudad de Mexico, Oaxaca, Estado de Mexico, Chihuahua y Veracruz; y 368 muertes por IRAG/ETI asociadas a influenza predominando en Puebla, Baja California, Oaxaca, Estado de Mexico y Hidalgo (Gráficos 7, 8).


Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution by EW 2015-19, EW 4.
Distribución de virus influenza por SE 2015-19, SE 4.




Graph 2. Mexico: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19



Graph 3. Mexico: Influenza-associated SARI/ILI cases EW 3, 2012/13-2018/19
Casos de IRAG/ETI asociados a influenza SE 3, 2012/13-2018/19



Graph 4. Mexico: Influenza-associated SARI/ILI deaths EW 3, 2012/13-2018/19
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza SE 3, 2012/13-2018/19




Graph 5. Mexico: Cumulative influenza-associated SARI/ILI cases greater than historic average, EW 40-4 (2013/14-2018/19)
Casos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza superior al promedio historico, SE 40-4 (2013/14- 2018/19)




Graph 6. Mexico: Cumulative influenza-associated SARI/ILI deaths greater than historic average, EW 40-4(2013/14-2018/19)
Fallecidos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza superior al promedio historico, SE 40- 4 (2013/14-2018/19)



Graph 7. Mexico: SARI/ILI-influenza cases EW 5, 2018/19
Casos de IRAG/ETI asociados a influenza SE 5, 2018/19



Graph 8. Mexico: SARI/ILI-influenza deaths EW 5, 2018/19
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza SE 5, 2018/19




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Aruba

- During EW 52, increased influenza detections were reported and influenza A(H1N1)pdm09 activity predominated (Graph 1) with increased SARI activity in recent weeks (Graph 3). The proportion of RSV positive samples was as higher as the proportion of influenza samples in EW 52 (Graph 2). / Durante la SE 52, se reportaron mayores detecciones de influenza y la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 predominó (Gráfico 1) con mayor actividad de IRAG en semanas recientes (Gráfico 3). La proporción de muestras positivas para VSR fue tan elevada como la proporción de muestras para influenza en la SE 48 (Gráfico 2).

Graph 1. Aruba. Influenza virus distribution EW, EW 52, 2015-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 52, 2015-18.



Graph 2. Aruba. Influenza and RSV distribution, EW 52, 2015-18.
Distribución de virus influenza y VSR, SE 52, 2015-18.




Graph 3. Aruba: Number of SARI cases with samples by EW, EW 48,
Numero de casos IRAG con muestra por SE, SE 48, 2018




Barbados

- From EW 33 to EW 46, no influenza detections were reported, and influenza B circulated in previous weeks (Graph 1, 2). During 2018, few RSV detections were reported (Graph 2). As of EW 49, the decreased SARI activity was below the levels observed in the 2015-2017 seasons for the same period (Graph 3). / Desde la SE 33 a la SE 46, no se reportaron detecciones de influenza e influenza B circuló en semanas previas (Gráfico 1, 2). Durante 2018, se reportaron escasas detecciones de VSR (Gráfico 2). Hasta la SE 48, la actividad disminuida de IRAG se ubicó por debajo de los niveles observados en las temporadas 2015-2017 para el mismo período (Gráfico 3).


Graph 1. Barbados. Influenza virus distribution EW, EW 46, 2014-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 46 2014-18.



Graph 2. Barbados. Influenza and RSV distribution, EW 46, 2014-18.
Distribución de virus influenza y VSR, SE 46, 2014-18.




Graph 3. Barbados: Number of SARI cases with samples by EW, EW 48, 2013-18
Numero de casos IRAG con muestra por SE, SE 48, 2013-18




Belize/ Belice

- During EW 3, decreased SARI activity was reported (Graph 1), as compared to the previous five seasons' average. In EW 3, the ARI incidence rate among <5 years of age children was lower than the previous seasons for the same period (Graph 2). In EW 4, decreased influenza samples were detected with influenza B and A(H1N1)pdm09 circulating during the previous weeks (Graph 3). / Durante la SE 3, se reportó un descenso en la actividad de IRAG (Gráfico 1), en comparación con el promedio de las cinco temporadas previas. En la SE 3, la incidencia de IRA entre los niños <5 años fue menor que en las temporadas previas para el mismo período (Gráfico 2). En la SE 4, se detectaron menores muestras de influenza con circulación de influenza B y A(H1N1)pdm09 en semanas previas (Gráfico 3).


Graph 1. Belize: SARI incidence rate per 100,000, EW 3, 2019
Tasa de incidencia de IRAG por 100.000, SE 3, 2019



Graph 2. Belize: ARI incidence rate per 100,000, <5 years old, EW 3, 2019
Tasa de incidencia de IRA por 100.000, <5 años de edad, SE 3, 2019




Graph 3. Belize. Influenza virus distribution EW, EW 4, 2016-19.
Distribución de virus influenza por SE, SE 4, 2016-19.




CARPHA

- During EW 52, increased influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 circulating (Graph 1). The proportion of influenza positive samples and the proportion of RSV positive samples increased from previous weeks (Graph 2/ Durante la SE 52, se reportaron mayores detecciones de influenza con circulación de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1). La proporción de muestras positivas para influenza y la proporción de muestras positivas para VSR aumentaron en relación con semanas previas (Gráfico 2).

Graph 1. CARPHA. Influenza virus distribution EW, EW 52, 2014-18.
Distribución de virus influenza por SE, SE 52, 2014-18.



Graph 2. CARPHA. Influenza and RSV distribution, EW 52, 2014-18.
Distribución de virus influenza y VSR, SE 52, 2014-18.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Cayman Island / Islas Caiman

- From EW 23 to EW 44, SARI activity remained at low levels, with no cases reported in EW 44 (Graph 1). / Desde la SE 23 a SE 44, la actividad de IRAG permaneció a niveles bajos, sin casos reportados en la SE 44 (Gráfico 1).


Graph 1. Cayman Island/ Islas Caiman: Percentage of SARI cases by EW, EW 44, 2018.
Porcentaje de casos de IRAG por SE, SE 44, 2018



Cuba

- During EW 3, increased influenza activity was reported with influenza A(H1N1)pdm09 and B co-circulating and overall few samples (Graph 1); while there was no RSV circulation during the 2018-19 season until EW 39 to EW 3, 2019 (Graph 2). The number of SARI cases decreased and were lower than in the 2018 season for the same period and were among the <5-years-old population, with influenza predominating (Graph 1,3). / Durante la SE 3, se reportó mayor actividad de influenza, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B y bajas muestras en general (Gráfico 1), en tanto no se reportó circulación de VSR durante la temporada 2018-19 hasta la SE 39 a SE 3 de 2019 (Gráfico 2). Los casos de IRAG disminuyeron y estuvieron por debajo de los niveles de la temporada 2018 para el mismo período y fueron entre la población de <5 años de edad con predominio de influenza (Gráfico 1, 3).


Graph 1. Cuba: Influenza virus distribution by EW, EW 3, 2015-19
Distribución de virus influenza por SE, SE 3, 2015-19




Graph 2. Cuba Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 3, 2015-19



Graph 3. Cuba: Percent positivity for influenza and RSV among SARI cases by EW, EW 3, 2015-19
Porcentaje de positividad por influenza y VSR entre todos casos, por SE, SE 3, 2015-19



Graph 4. Cuba: Number of SARI cases with samples by EW, EW 3, 2019
Numero de casos de IRAG con muestras, por SE, SE 3, 2019




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Dominican Republic / República Dominicana

- During EW 4, slightly decreased influenza detections were reported, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating in recent weeks (Graph 1); RSV detections increased from the prior week (Graph 2). Influenza positivity was below the alert threshold and the average epidemic curve (Graph 3). During EW 3, the number of SARI cases decreased from previous weeks (Graph 4), with a similar proportion of influenza and RSV positive samples. The SARI and influenza-associated SARI cases predominated among the <5 years old. / Durante la SE 4, se reportaron ligeramente menores detecciones de influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes (Gráfico 1); las detecciones de VSR aumentaron en relación a la semana previa (Gráfico 2). La positividad de influenza se ubicó bajo el umbral de alerta y el umbral epidémico (Gráfico 3). Durante la SE 3, el número de casos de IRAG disminuyó en relación a semanas previas (Gráfico 4), con una proporción similar de muestras positivas para influenza y VSR. Los casos de IRAG y los casos de IRAG asociados a influenza predominaron en los <5 años.

Graph 1. Dominican Republic: Influenza virus distribution EW, 2015-19. EW 4.




Graph 2. Dominican Republic Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19




Graph 3. Dominican Republic: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)



Graph 4. Dominican Republic: Number of SARI cases that were sampled, by EW, EW 3, 2019

Numero de casos de IRAG con muestra by EW, EW 3, 2019




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

French Guiana

- During EW 46, no influenza detections were reported, with influenza A(H3N2) circulating in recent weeks (Graph 1). Influenza positivity was below the seasonal threshold and the average epidemic curve. / Durante la SE 46, no se reportaron detecciones de influenza, con circulación de influenza A(H3N2) en semanas recientes (Gráfico 1). La actividad de influenza se ubicó bajo el umbral estacional y la curva epidémica.

Graph 1. French Guiana: Influenza virus distribution EW, 2014-18. EW 46.




French Territories / Territorios Franceses

- During EW 3, 2019, bronchiolitis consultations decreased after a peak in EW 43 and were slightly higher than the seasonal average in Guadeloupe (Graph 1), while ILI activity remained at low levels in EW 1 (Graph 2). As of EW 3 and 4, in Martinique, bronchiolitis and ILI activities were below seasonal levels for the 2018 season (Graph 3, 4), while in Saint-Barthélemy, bronchiolitis activity remained high (Graph 5). / Durante la SE 3 de 2019, las consultas por bronquiolitis disminuyeron luego de un pico en la SE 43 y fueron ligeramente mayores que el promedio estacional en Guadalupe (Gráfico 1), en tanto la actividad de ETI se mantuvo a niveles bajos en la SE 1 (Grafico 2). Hasta la SE 3 y 4, en Martinica las actividades de bronquiolitis y de ETI permanecieron bajo los niveles estacionales para la temporada 2018 (Gráfico 3, 4), mientras que en Saint-Barthélemy, la actividad de bronquiolitis permaneció elevada (Gráfico 5).

Graph 1. Guadeloupe: Number of bronchiolitis consultations, EW 3, 2016-2019
Numero de consultas de bronquiolitis, SE 3, 2016-2019


Nombre* hebdomadaire de patients ayant consulté un médecin généraliste de ville pour une bronchiolite et seuil saisonnier, Guadeloupe, juillet 2016 à janvier 2019 - Source : réseau de médecins sentinelles



*Le nombre de cas est une estimation pour l'ensemble de la population guadeloupéenne du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de bronchiolite. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.

Graph 3. Martinique: Number of bronchiolitis consultations, EW 3, 2016-2019
Numero de consultas de bronquiolitis, SE 3, 2016-2019


Nombre* hebdomadaire de patients ayant consulté un médecin généraliste de ville pour une bronchiolite et seuil saisonnier, Martinique, juillet 2016 à janvier 2019 - Source : réseau de médecins sentinelles



*Le nombre de cas est une estimation pour l'ensemble de la population martiniquaise du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de bronchiolite. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies par le réseau des médecins sentinelles.


Graph 2. Guadeloupe: Number of ambulatory consultations for ILI, EW 49, 2016-2018
Numero de consultas ambulatorias por ETI, SE 49, 2016-2018

Nombre estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste et seuil saisonnier, Guadeloupe, décembre 2016 à décembre 2018 - Source : réseau de médecins sentinelles




Graph 4. Martinique: Number of ambulatory consultations for ILI, EW 4, 2016-2019
Numero de consultas ambulatorias por ETI, SE 4, 2016-2019

Nombre estimé de consultations pour syndrome grippal chez un médecin généraliste et seuil saisonnier, Martinique, décembre 2016 à janvier 2019 - Source : réseau de médecins sentinelles



Graph 5. Saint-Barthélemy: Number of bronchiolitis consultations, EW 3, 2016-2019
Numero de consultas de bronquiolitis, SE 3, 2016-2019

Nombre* hebdomadaire de patients ayant consulté un médecin généraliste de ville pour une bronchiolite et seuil saisonnier, Saint-Barthélemy, juillet 2016 à janvier 2019 - Source : réseau de médecins sentinelles




*Le nombre de cas est le nombre de patients ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de bronchiolite. La totalité des médecins généralistes de l'île participant au réseau sentinelle, ce chiffre représente l'ensemble des consultations pour bronchiolite effectuées en médecine de ville à Saint-Barthélemy. Il ne s'agit pas d'une estimation.


Haiti

- During 2018, influenza activity began earlier than in the previous 2014-2017 seasons and peaked in EW 30. During EW 4, 2019, influenza cases decreased as compared to the previous weeks, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating (Graph 1). As of EW 4, the number of SARI hospitalizations increased from previous weeks; and was higher than the levels observed in 2018 for the same period (Graph 2), with most of the cases among the <5 years old infants. / Durante 2018, la actividad de influenza inició más tempranamente que en las temporadas previas de 2014-2017 y presentó un pico en la SE 30. Durante la SE 4 de 2019, los casos de influenza disminuyeron en comparación a las semanas previas, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1). Hasta la SE 4, el número de hospitalizaciones por IRAG aumentó respecto a semanas previas; siendo superior a los niveles observados en 2018 para el mismo período (Gráfico 2); con la mayoría de los casos reportaron entre los niños <5 años de edad.

Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW, 2014-19. EW 4.
Distribución de virus influenza por SE, 2014-19. SE 4.



Graph 2. Haiti: Number of SARI cases, EW 4, 2019. /
Número de casos de IRAG, SE 4, 2019.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Jamaica

- During EW 4, SARI activity slightly increased below the average epidemic curve, as compared to the 2016-2018 seasons (Graph 2). The number of ARI cases increased from previous weeks and compared to the 2014-2018 seasons for the same period (Graph 4) During EW 1 to EW 4, 2019, few influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) detections were reported with no influenza cases reported in the previous two months (Graph 1). Decreased number of RSV positive samples was detected after a peak in EW 49 (Graph 2). / Durante la SE 4, la actividad de IRAG aumentó ligeramente bajo la curva epidémica promedio, en comparación a las temporadas 2016-2018 (Gráfico 2). El número de casos de IRA aumentó, respecto a las temporadas 2014-2018 para el mismo período (Gráfico 4). Durante la SE 1 a SE 4, 2019, se reportaron escasas detecciones de influenza A(H1N1)pdm09, sin reporte de casos de influenza en los dos meses previos (Gráfico 1). Se detectó un menor número de muestras positivas a VSR luego de un pico en la SE 49 (Gráfico 2).

Graph 1. Jamaica: Influenza virus distribution by EW, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza por SE, SE 4, 2015-19




Graph 2. Jamaica: Influenza and RSV virus distribution by EW, EW 4,
2015-19




Graph 3. Jamaica: Percent positivity for influenza, EW 4 2019 (in
comparison to 2010-2018)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a
2010-2018)



Graph 4. Jamaica: Number of SARI hospitalizations among total
hospitalizations, EW 4, 2016-2019. /
Número de hospitalizaciones por IRAG entre total de hospitalizaciones,
SE 4, 2016-2019.



Graph 5. Jamaica: Number of ARI cases (compared to 2015-2018), EW 4 2019
Número de casos de IRA, (en comparación a 2015-2018), SE 4 2019




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Puerto Rico

- During EW 3, increased influenza cases were detected above the seasonal threshold, with predominance of influenza A(H1N1)pdm09 (Graph 1). During EW 3, no ILI activity was reported, and it remained below the average epidemic curve up to EW 21, 2018 (Graph 2). / Durante la SE 3, se han detectado mayores casos de influenza sobre el umbral estacional, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1). Durante la SE 3, no se reportó actividad de ETI, y la misma permaneció por debajo de la curva epidémica media hasta la SE 21 de 2018 (Gráfico 2).

Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive cases by EW 3, 2018-19
Casos positivos para influenza SE 3, 2018-19




Graph 2. Puerto Rico: ILI epidemic rates by EW 20, 2018 /
Tasas de ETI por SE, SE 20, 2018.




Saint Lucia

- During EW 4, the number of cases with respiratory symptoms among children under 5 years of age was below the seasonal threshold (Graph 1). During EW 49, SARI activity decreased and was lower than the levels from the 2016 season for the same period (Graph 2), with SARI admissions predominating among the 1 to 4 years of age population. No influenza activity was reported since EW 35 (Graph 3) / Durante la SE 4, el número de casos con síntomas respiratorios en niños menores de 5 años de edad se ubicó bajo el umbral estacional (Gráfico 1). Durante la SE 49, la actividad de IRAG disminuyó y fue menor que los niveles de la temporada 2016 para el mismo período (Gráfico 2), con predominio de las admisiones por IRAG entre el grupo de 1 y 4 años de edad. No se reportó actividad de influenza desde la SE 35 (Gráfico 3).


Graph 1. Saint Lucia: ILI cases distribution by EW among the < 5 years of age, EW 4, 2014-19
Distribución de ETI por SE entre los <5 años de edad, SE 4, 2014-19



Graph 2. Saint Lucia: Percent of SARI cases per total hospitalizations by year, 2016-2018, EW 49. /
Porcentaje de casos de IRAG por todos hospitalizaciones por año, 2016-2018, SE 49.



Graph 3. St. Lucia: Influenza virus distribution by EW, EW 45, 2014-18
Distribución de virus influenza por SE, EW 45, 2014-18




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Suriname

- In EW 4, a decrease in ILI cases was reported with low activity in the last month; while SARI-related hospitalizations decreased in EW 4, 2019 and were similar to the 2016-2018 seasons for the same period (Graph 4,5). During EW 4, 2019 increased influenza activity was reported, with influenza A(H1N1)pdm09 circulating (Graph 1); RSV activity decreased (Graph 2). / Desde la SE 34 se reportó un descenso de casos de ETI con baja actividad en el último mes; en tanto las hospitalizaciones relacionadas con IRAG disminuyeron en la SE 4 de 2019 y fueron similares a las temporadas 2016-2018 para el mismo período (Gráfico 4,5). Durante la SE 4 de 2019, se reportó aumentada actividad de. influenza, con circulación de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1); la actividad de VSR disminuyó (Gráfico 2).

Graph 1. Suriname: Influenza virus distribution by EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza por SE 4, 2015-19




Graph 2. Suriname: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. Suriname: Percent positivity for influenza, EW 4 2019 (in comparison to 2010-2018)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)



Graph 4. Suriname: Number of ILI cases, by age, by EW, 2019. EW 4
Número de casos ETI, en grupo de edad, por SE, 2019, SE 4



Graph 5. Suriname: % SARI hospitalizations per total hospitalizations, by EW, 2016-2019. EW 4.
Casos % de hospitalizaciones IRAG entre todas las hospitalizaciones, por SE, 2016-2019. SE 4.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Trinidad & Tobago

- During EW 52, decreased influenza detections were reported, with influenza A(H1N1)pdm09 predominating in previous weeks (Graph 1). Rhinovirus and parainfluenza virus circulated in recent weeks, and there were no RSV detections reported (Graph 2). As of EW 45, SARI activity decreased from the previous week (Graph 3). / Durante la SE 52, se reportaron menores detecciones de influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 en semanas previas (Gráfico 1). Rhinovirus y parainfluenza circularon en semanas recientes y no se reportaron detecciones de VSR (Gráfico 2). Hasta la SE 45, la actividad de IRAG disminuyó en relación a la semana previa (Gráfico 3).


Graph 1. Trinidad & Tobago: Influenza virus distribution by EW, EW 52, 2015-18



Graph 2. Trinidad & Tobago. Other respiratory virus distribution, EW 52, 2015-18



Graph 3. Trinidad & Tobago: Number of SARI cases by EW, EW 45, 2018




Costa Rica

- During EW 4, influenza activity slightly decreased from the previous weeks with influenza A(H3N2) predominating (Graph 1). Influenza activity during EW 4 was higher than during the 2018 season for the same period and RSV activity increased (Graph 1, 2). In EW 4, the proportion of SARI deaths and the proportion of cases with ICU admissions (18.5%) increased, while SARI hospitalizations (3%) were lower as compared to the previous weeks (Graph 3). / Durante la SE 4, la actividad de influenza disminuyó ligeramente en relación a las semanas previas con predominio de influenza A(H3N2) (Gráfico 1). La actividad de influenza durante la SE 4 fue mayor que durante la temporada 2018 para el mismo período y la actividad de VSR aumentó (Gráficos 1, 2). En la SE 4, la proporción de fallecidos por IRAG y la proporción de casos con admisión a UCI (18,5%) aumentó, en tanto y de hospitalizados por IRAG (3%) fueron menores en comparación a las semanas previas (Gráfico 3).


Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, Laboratory confirmed samples, by EW 4, 2015-19

Distribución de virus influenza, confirmados por laboratorio, hasta EW 4, 2015-19




Graph 2. Costa Rica: Influenza and RSV distribution, EW4, 2015-19

Distribución de virus influenza y VSR, EW 4, 2015-19




Graph 3. Costa Rica: Proportion of SARI cases, ICU admissions and SARI deaths in reporting sentinel sites by year. Costa Rica, EW 4, 2015-2019

Proportión de casos de IRAG, admisiones a UCI y fallecidos por IRAG en sitios centinela reportado por año. Costa Rica, SE 4, 2015-2019



Graph 3. Costa Rica: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)


Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)




El Salvador

- During EW 4, influenza activity decreased below the average epidemic curve with influenza A(H1N1)pdm09 and B co-circulating (Graphs 1, 3). Decreased RSV detections were reported as compared to the previous season (Graph 2). During EW 4, the count of SARI cases decreased and was similar to levels observed in the previous seasons (Graph 4, 5); and pneumonia counts decreased from the previous weeks and were lower than during the 2016 season and similar to the levels of the 2017-8 season (Graph 5). / Durante la SE 4, la actividad de influenza disminuyó bajo la curva epidémica promedio con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B (Gráficos 1, 3). Se reportaron menores detecciones de VSR en relación a la temporada anterior (Gráfico 2). Durante la SE 4, el recuento de casos IRAG disminuyó y fue menor a los niveles registrados en las temporadas previas (Gráfico 4); y los recuentos de neumonía disminuyeron en relación a las semanas previas y fueron menores que durante la temporada 2016 y similares a los niveles de la temporada 2017-8 (Gráfico 5).


Graph 1. El Salvador: Influenza virus distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza, SE 4, 2015-19




Graph 2. El Salvador: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. El Salvador: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)



Graph 4. El Salvador: SARI case counts out of total hospitalizations, by EW, 2019. EW 4 (in comparison with 2016-2018)
Número de casos por IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE,- 2019, EW 4 (en comparación a 2016-2018)



Graph 5. El Salvador: Number of pneumonia cases by EW, 2016- 2019. EW 4.
Recuento de casos de neumonía, por SE, 2016- 2019. SE 4.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Guatemala

- During EW 3, influenza detections slightly decreased with influenza A(H3N2) circulating in recent weeks (Graph 1). Influenza positivity was above the alert threshold, as compared to the 2010-2018 period (Graph 3); while the RSV activity slightly increased in the last weeks and was similar to the levels reported in the 2018 season (Graph 2). From EW 45 to EW 52, the percentage of SARI cases among all hospitalizations increased and was lower than during the 2017 season and associated to increased proportion of RSV detections compared to influenza detections (Graph 4, 5). The highest proportion of SARI cases was among <5 years old population. During EW 2, pneumonia and ARI activity increased and were slightly similar to the counts reported in the 2018 season (Graph 6, 7). / Durante la SE 4, las detecciones de influenza disminuyeron ligeramente con circulación de influenza A(H3N2) en semanas recientes (Gráfico 1). La positividad de influenza se ubicó sobre el umbral de alerta, en comparación al período 2010-2018 (Gráfico 3); en tanto la actividad de VSR disminuyó en las últimas semanas y fue superior a los niveles de la temporada 2018 (Gráfico 2). Desde la SE 45 hasta la SE 52, el porcentaje de casos de IRAG del total de hospitalizaciones aumentó y fue menor que en la temporada 2017 y asociada a mayor proporción de detecciones de VSR comparado con las detecciones de influenza (Gráfico 4, 5). La mayor proporción de casos de IRAG fue entre la población de <5 años de edad (Gráfico 4). Durante la SE 2, las actividades de neumonía e IRA aumentaron y fueron ligeramente similares a los recuentos reportados en la temporada 2018 (Gráficos 6, 7).


Graph 1. Guatemala. Influenza virus distribution EW 4, 2015-19
Distribución de influenza SE 4, 2015-19




Graph 2. Guatemala: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. Guatemala: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación con 2010-2018)




Graph 4. Guatemala: Number of SARI cases, EW 52, 2017-2018. /
Número de casos IRAG, SE 52, 2017-2018.




Graph 5. Guatemala: Percent positivity for influenza and RSV among SARI cases, EW 49, 2017-2018. /
Porcentaje de positividad de influenza y VSR entre los casos de IRAG, SE 49, 2017-2018.



Graph 6. Guatemala: Number of pneumonia cases, EW 2, 2019. /
Número de casos de neumonía, SE 2, 2019.



Graph 7. Guatemala: Number of ARI cases, EW 2, 2019. /
Número de casos de IRA, SE 2, 2019.




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Honduras


- During EW 4, at the sentinel sites, influenza activity slightly decreased below the seasonal threshold (Graph 3) with influenza B predominating (Graph 1); decreased RSV activity was reported in the last month (Graph 2). The influenza positive cases predominated in Cortes and Francisco Morazán departments and most cases were among children under 5 years of age. During EW 5, the counts of SARI cases decreased as compared to the previous weeks and remained lower than the levels of the 2012-2018 seasons (Graph 4). / Durante la SE 4, en los sitios centinela, la actividad de influenza disminuyó ligeramente bajo el umbral estacional (Gráfico 3) con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráfico 1); se reportó menor actividad de VSR en el último mes (Gráfico 2). Los casos positivos de influenza predominaron en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, y la mayoría de los casos fueron en niños menores de 5 años de edad.

Durante la SE 5, los recuentos de casos de IRAG disminuyeron en comparación a las semanas previas y permanecieron menores a los niveles de las temporadas 2012-2018 (Gráfico 4).


Graph 1. Honduras. Influenza virus distribution from sentinel surveillance, EW 4, 2015-19




Graph 3. Honduras : Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance, EW 4 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 4, 2019 (en comparación con 2010-2018)



Graph 2. Honduras: Influenza and RSV distribution form sentinel surveillance, EW 4, 2015-19




Graph 4. Honduras: Number of SARI cases out of total hospitalizations, EW 5, 2019. /
Número de casos IRAG de todas hospitalizaciones, SE 5, 2019.




Nicaragua

- During the 2018 season, high influenza activity was reported from EW 29, 2018 to EW 45, with a downward slope in EW 4, 2019. Influenza A(H1N1)pdm09 and later B activity remained elevated above the seasonal levels and the average epidemic curve (Graph 1, 3), and RSV activity slightly decreased in the last two months (Graph 2). Pneumonia case counts decreased in EW 4 of 2019 (Graph 4). The SARI case counts from sentinel surveillance slightly decreased in EW 4 and predominated among the <5 years of age group (Graph 5). / Durante la temporada 2018, se reportó actividad elevada de influenza desde la SE 29 de 2018 hasta la SE 45, con una pendiente decreciente en la SE 4, 2019. La actividad de influenza A(H1N1)pdm09 y posterior B permaneció elevada sobre los niveles estacionales y la curva epidémica promedio (Gráfico 1), y la actividad de VSR disminuyó ligeramente en los últimos dos meses (Gráfico 2). El recuento de casos de neumonía disminuyó en la SE 4 de 2019 (Gráfico 4). Los recuentos de IRAG disminuyeron ligeramente en la SE 4 y predominaron entre el grupo de < de 5 años (Gráfico 5).


Graph 1. Nicaragua. Influenza virus distribution EW 4, 2014-19



Graph 2. Nicaragua: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2014-19




Graph 3. Nicaragua : Percent positivity for influenza,from sentinel surveillance, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 4, 2019 (en comparación con 2010-2018)



Graph 4. Nicaragua : Number of pneumonia cases, EW 4, 2019 /
Número de casos de neumonía, SE 4, 2019




Graph 5. Nicaragua : Number of SARI cases from sentinel surveillance, EW 4, 2019 /
Número de casos de IRAG de vigilancia centinela, EW 4, 2019




Panama

- During the 2018 season, at the national level, influenza activity remained at low levels. In EW 3, 2019, decreased influenza percent of positivity was reported with influenza A(H3N2) predominance (Graph 1). RSV detections slightly decreased as compared to previous weeks (Graph 2). / Durante la temporada 2018, a nivel nacional, la actividad de influenza permaneció a niveles bajos. En la SE 3 de 2019, se han reportado menor porcentaje de positividad de influenza con predominio de influenza A(H3N2) (Gráfico 1). Las detecciones de VSR disminuyeron ligeramente respecto a las semanas previas (Gráfico 2).


Graph 1. Panama. Influenza virus distribution EW 3, 2014-2019
Distribución de influenza EW 3, 2014-2019



Graph 2. Panama: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2014-2019
Distribución de virus influenza y VSR, EW 3, 2014-2019



Graph 3. Panama : Percent positivity for influenza,from sentinel surveillance, EW 3, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 3, 2019 (en comparación con 2010-2018)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Bolivia

- During EW 3 and in recent weeks, at the national level, the percentage of SARI cases remained low and was slightly higher than the levels observed in the 2018 season for the same period (Graph 3); with RSV percent positivity among SARI cases similar to the influenza positivity (Graph 4). Influenza activity slightly decreased from the previous week in Santa Cruz and was below the seasonal threshold, with influenza A(H3N2) circulating (Graph 1). In 2018, RSV activity peaked during EW 29 with a downward slope and low activity since EW 33 (Graph 2). In EW 4 2019, RSV activity increased steadily since EW 46, 2018. In La Paz and Santa Cruz, in EW 52, the number of SARI cases decreased below the seasonal levels from previous weeks, with influenza B and A co-circulating (Graph 3). / Durante la SE 3 y en semanas recientes, a nivel nacional, el porcentaje de IRAG permaneció bajo y fue ligeramente mayor que los niveles observados en la temporada 2018 para el mismo período (Grafico 3); con un porcentaje de positividad de VSR entre los casos de IRAG similar a la positividad de influenza (Gráfico 4). La actividad de influenza disminuyó ligeramente respecto a la semana previa en Santa Cruz y se ubicó bajo el umbral estacional, con circulación de influenza A(H3N2) (Gráfico 1). En 2018, la actividad del VSR llegó a su pico en la SE 29 con una pendiente descendiente y baja actividad desde la SE 33 (Gráfico 2). En la SE 4 de 2019, la actividad de VSR aumento en forma sostenida desde la SE 46. En La Paz y en Santa Cruz, en la SE 3, el recuento de casos de IRAG disminuyó por debajo del nivel estacional en relación a semanas previas, con co-circulación de influenza B y A (Gráfico 3)


Graph 1. Bolivia. Influenza virus distribution EW 4, 2015-19




Graph 2. Bolivia: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19




Graph 3. Bolivia: Percentage of SARI cases out of total hospitalizations, EW 1, 2018 – EW 3 2019
Porcentaje de casos IRAG de todas hospitalizaciones, SE 1, 2018 – SE 3, 2019



Graph 4. Bolivia: Percent positivity for influenza and RSV among SARI cases, EW 51, 2017-2018. /
Porcentaje de positividad de influenza y VSR entre los casos de IRAG, SE 51, 2017-2018.



Graph 5. Bolivia: Percent positivity for influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Colombia

- During EW 3, at national level, SARI case counts were low as compared to the previous seasons for the same period (Graph 4). In EW 4, influenza activity slightly increased as compared to the previous weeks with influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 co-circulating (Graphs 1, 3); while RSV percent positivity slightly decreased (Graph 2). During EW 1, pneumonia activity was below the seasonal levels for the period and ARI activity increased above the alert threshold in EW 2 (Graph 5, 6). / En la SE 3, a nivel nacional, el número de casos de IRAG fue bajo en comparación a las temporadas previas para el mismo período (Gráfico 4). Durante la SE 4, la actividad de influenza aumentó ligeramente en comparación a las semanas anteriores con circulación de influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1, 3); en tanto la positividad de VSR disminuyó ligeramente (Gráfico 2). Durante la SE 1, la actividad de neumonía se ubicó bajo los niveles estacionales para el período y la actividad de IRA aumentó sobre el umbral de alerta (Gráficos 5, 6).


Graph 1. Colombia. Influenza virus distribution EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza SE 4 2015-19




Graph 2. Colombia: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. Colombia: Percent positivity for influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)




Graph 4. Colombia: Number of SARI cases, EW 2,2019 (in comparison to 2014-2018)
Número de casos de IRAG, SE 2,2019 (en comparación a 2014-2018)



Graph 5. Colombia: Number of pneumonia-related hospitalizations, by EW 1,2019 (in comparison with 2014-17)
Número de hospitalización asociado a neumonía, por SE 1,2019 (en comparación con 2014-17)



Graph 6. Colombia: Number of ARI cases, EW 2 2019 (from all consultations), (in comparison with 2014-17)
Número de los casos IRA, SE 2 2019 (de todas consultas), (en comparación con 2014-17)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Ecuador

- During EW 4, at national level, the proportion of SARI cases, the ICU admissions and deaths proportions among all hospitalizations decreased from previous weeks and remained slightly higher than the levels observed during the 2016 -


2018 seasons for the same period (Graph 4). During EW 4, influenza activity decreased above the seasonal threshold, as compared to the previous weeks with influenza A(H3N2) predominating (Graph 2). Influenza percent positivity was higher than the levels reported during the prior season for the same period, with increased RSV activity in recent weeks (Graph 1, 2). / Durante la SE 4, a nivel nacional, la proporción de casos de IRAG, admisiones a UCI y fallecidos sobre el total de hospitalizaciones disminuyeron en relación con semanas previas y se mantuvieron ligeramente superior a los niveles observados durante 2016-2017 para el mismo período (Gráfico 4). En la SE 4, la actividad de influenza disminuyó sobre el umbral estacional, en comparación con las semanas previas sobre el umbral estacional, con predominio de influenza A(H3N2) (Gráfico 2). El porcentaje de positividad de influenza fue superior a los niveles registrados en la temporada previa para el mismo período, con mayor actividad de VSR en semanas recientes (Gráficos 1, 2).

Graph 1. Ecuador: Influenza virus distribution from SARI sentinel cases by EW 4, 2015-19




Graph 3. Ecuador: Percent positivity for influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)

Porcentaje de positividad de influenza, EW 4, 2018-19 (in comparison to 2010-2018)




Graph 2. Ecuador: Influenza and RSV distribution from SARI sentinel cases, EW 4, 2015-19

Distribución de virus influenza y VSR de casos de IRAG centinela, SE 4, 2015-19



Graph 4. Ecuador: Proportion of SARI cases, ICU admissions and deaths by EW, as of EW 4, 2019 (compared to 2012-2017)

Proporción de casos de IRAG, admisiones a UCI y muertes por SE, hasta la SE 4, 2019 (en comparación a 2012-2017)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Peru


- During EW 4, at national level, SARI case counts among all hospitalizations increased from previous weeks and remained lower than the 2015-2018 seasons for the same period (Graph 4). In EW 4, influenza activity slightly increased below the alert threshold, with influenza A(H3N2) circulating and overall few detections (Graph 1,3). Few RSV detections were reported in EW 4, 2019 and the activity was lower than levels observed in 2018 for the same period (Graph 2). During SE 4, at the national level, ARI case counts among the under 5 years of age population slightly decreased and were similar to the levels observed in 2016-2018 for the same period (Graph 5). Likewise, the pneumonia case counts in infants under 5 years of age slightly decreased and was higher than the counts reported in 2016-2018 for the same period (Graph 6)*. / En la SE 4, a nivel nacional, el número de casos de IRAG entre el total de hospitalizaciones aumentó respecto a los niveles de semanas previas y se mantuvo menor a lo observado en las temporadas 2015-2018 para el mismo período (Gráfico 4). Durante la SE 4, la actividad de influenza aumentó ligeramente bajo el umbral de alerta, con circulación de influenza A(H3N2) y escasas muestras en general (Gráficos 1,3). Se reportaron escasas detecciones de VSR en la SE 4 de 2019, y la actividad fue menor a los niveles observados en 2018 para el mismo período (Gráfico 2). Durante la SE 4, a nivel nacional, el recuento de casos de IRA en la población de menores de 5 años disminuyó ligeramente y fue similar a los niveles observados en 2016-2018 para el mismo período (Gráfico 5). Así mismo, el recuento de casos de neumonía en niños menores de 5 años disminuyó ligeramente y fue superior a los recuentos reportados en 2016-2018 para el mismo período (Gráfico 6)*.

*Online report/ informe de línea


Graph 1. Peru: Influenza virus distribution by EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza por SE 4, 2015-19



Graph 2. Peru: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19



Graph 3. Perú: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)



Graph 4. Peru: Number of SARI cases with samples, by EW 4, 2019
Número de casos IRAG con muestra, por SE 4, 2019




Graph 5. Peru. ARI cases in children under 5 years, by EW 4, 2019
Casos de IRA en niños menores de 5 años, por SE 4, 2019.



Graph 6. Peru: Pneumonia cases in children under 5 years, by EW 4, 2019
Casos de neumonía en niños menores de 5 años, por SE 4, 2019



Graph 7. Peru: ILI cases, by EW, EW 4, 2019 (in comparison to 2015-2018)
Casos de ETI por SE, SE 4, 2019 (en comparación a 2015-2018)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Venezuela

- During EW 4, influenza activity decreased with influenza A(H3N2) predominating in previous weeks (Graph 1, 2). From EW 42 to EW 52, RSV activity peaked and was higher than the levels reported in 2015-2017 for the same period, with no detections during 2019 (Graph 2). / En la SE 4, la actividad de influenza disminuyó con predominio de influenza A(H3N2) (Gráficos 1, 2). Desde la SE 42 hasta la SE 52, la actividad de VSR llegó a su pico y fue superior a los niveles reportados en 2015-2017 para el mismo periodo, sin detecciones durante 2019 (Gráfico 2).

Graph 1. Venezuela: Influenza virus distribution by EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza por SE 4, 2015-19



Graph 2. Venezuela: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Argentina

- During EW 52, at national level, the counts of SARI and pneumonia cases decreased and were lower than the 2012-2017 seasons for the same period (Graph 2, 6). During EW 52, ILI activity was also low for the period (Graph 1). During EW 3, influenza activity decreased as compared with the previous weeks with overall few samples tested (Graphs 3, 5). RSV positivity decreased and was similar to the levels reported during the previous season for the same period (Graph 4). During 2018, 81 influenza-associated deaths were reported, lower than the levels observed during the 2017 season for the same period (114 influenza-associated deaths), mostly among the 60 years of age population and older and with risk factors (70%). / Durante la SE 52, a nivel nacional los recuentos de IRAG y neumonía disminuyeron y fueron menores que durante las temporadas 2012-2017 para el mismo período (Gráficos 2, 6). Durante la SE 52, la actividad de ETI fue baja para el período (Gráfico 1). Durante la SE 3, la actividad de influenza disminuyó en comparación con semanas previas, con recuento bajo de muestras estudiadas (Gráficos 3, 5). El porcentaje de positividad para VSR disminuyó y fue similar a lo registrado en la temporada previa para el mismo período (Gráficos 4). Durante 2018, se reportaron 81 fallecidos asociados a influenza, menor a los niveles observados durante la temporada 2017 para el mismo período (114 muertes asociadas a influenza), en su mayoría entre la población de 60 años de edad y más, y con factores de riesgo (70%).


Graph 1. Argentina. Number of ILI cases from national surveillance by EW, EW 1-52, 2018 (compared to 2012-2017) / Número de casos de ETI de vigilancia nacional, SE 1- 52, 2018 (en comparación a 2012-2017)




Graph 2. Argentina. Number of SARI cases from national surveillance by EW, EW 1-52, 2018 (compared to 2012-2017) / Número de casos de IRAG de vigilancia nacional, SE 1- 52, 2018 (en comparación a 2012-2017)




Graph 3. Argentina. Influenza virus distribution by EW 3, 2014-19 / Distribución de virus influenza por SE 3, 2014-19




Graph 4. Argentina: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2014-19 / Distribución de virus influenza y VSR, SE 3, 2014-19



Graph 5. Argentina: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 3, 2019 (in comparison to 2010-2018) / Línea basal para el porcentaje de positividad de influenza, SE 3, 2019 (en comparación a 2010-2018)




Graph 6. Argentina. Number of pneumonia cases from national surveillance by EW, EW 1-52, 2018 (compared to 2012-2017) / Número de casos de neumonía de vigilancia nacional, SE 1- 52, 2018 (en comparación a 2012-2017)




- In Brazil, during EW 52, cumulative SARI hospitalizations and deaths increased and were lower than in 2016 but higher than the other seasons for the same period (Graphs 1,2). During EW 52, the SARI case counts out of all hospitalizations were lower than in previous weeks and the 2015-2017 seasons (Graph 10). The cumulative number of influenza-associated SARI cases and SARI deaths were higher than the counts reported in 2017 and less than in 2016 (Graph 3, 4). During EW 3, a slight decrease in the detection of influenza positive cases was reported by the three NICs with influenza B predominating; while RSV detections increased in recent weeks (Graph 5-9). During EW 52, 8 states reported higher cumulative influenza-associated SARI/ILI case counts than the historic average 2014-2017 (≥ 2 standard deviation above): Bahia, Ceara, Maranhao, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe, and Tocantins (Graph 11). In EW 52, 8 states reported higher cumulative influenza-associated SARI/ILI deaths counts than the historic average 2014-2017 (>1 standard deviation above): Bahia, Ceará, Maranhao, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe and Tocantins (Graph 12). / En Brasil, en la SE 52, las hospitalizaciones y los casos fallecidos por IRAG acumulados aumentaron y fueron menores que en 2016 pero superiores a las restantes temporadas para el mismo período (Gráficos 1, 2). Durante la SE 52, el recuento de casos de IRAG sobre el total de hospitalizaciones fue menor que las semanas previas y las temporadas 2015-2017 para el mismo período (Gráfico 10). El número acumulado de casos de IRAG por influenza y de casos fallecidos asociados a influenza fueron superiores a los recuentos de 2017 y menores a los recuentos reportados en 2016 (Gráficos 3, 4). En la semana 3, se ha detectado un ligero descenso de los casos positivos de influenza reportados por los tres NICs, con predominio de influenza B; en tanto las detecciones de VSR aumentaron en las últimas semanas (Gráficos 5-9). Durante la SE 52, 8 estados reportaron elevados recuentos acumulados de IRAG/ETI asociados a influenza en comparación al promedio histórico 2014-2017 (≥ 2 desviación estándar arriba): Bahia, Ceara, Maranhao, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe, y Tocantins (Gráfico 11). En la SE 52, 8 estados reportaron elevados recuentos acumulados de fallecidos por IRAG/ETI asociados a influenza en comparación al promedio histórico 2014-2017 (>1 desviación estándar arriba): Bahia, Ceará, Maranhao, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Sergipe y Tocantins (Gráfico 12).

Graph 1. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related cases, by EW 52, 2014-2018




Graph 2. Brazil. Distribution of cumulative SARI-related deaths, by EW 49, 2014-2018




Graph 3. Brazil. Distribution of cumulative influenza-associated SARI-related cases, by EW 52, 2014-2018

Distribución de casos acumulados de IRAG asociados a influenza, SE 52, 2014-2018




Graph 4. Brazil. Distribution of cumulative influenza-positive SARI-related deaths, by EW 52, 2014-2018


Distribución de fallecidos acumulados de IRAG positivos para influenza, SE 52, 2014-2018




Graph 5. Brazil- All NICs. Influenza virus distribution by EW 3, 2015-2019
Distribución de virus influenza por SE 3, 2015-2019




Graph 6. Brazil – All NICs: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-2019
Distribución de virus influenza y VSR, SE 3, 2015-2019




Graph 7. Brazil - NIC IEC. Influenza virus distribution by EW 3, 2015-2019
Distribución de virus influenza por SE 3, 2015-2019




Graph 8. Brazil- NIC FIOCRUZ. Influenza virus distribution by EW 51, 2014-2018
Distribución de virus influenza por SE 51, 2014-2018




Graph 9. Brazil- NIC Adolfo Lutz. Influenza virus distribution by EW 52, 2015-2018
Distribución de virus influenza por SE 52, 2015-2018




Graph 10. Brazil: Number of SARI cases out of all hospitalizations, by EW 52, 2018 (in comparison with 2015-17)
Número de casos IRAG de todas las hospitalizaciones, por SE 52, 2018 (en comparación con 2015-17)



Graph 11. Brazil: Cumulative counts of influenza-associated SARI cases greater than historic average, EW 52 (2014-2018)
Recuentos acumulados de casos de IRAG asociados a influenza mayor al promedio histórico, SE 52 (2014-2018)




Graph 12. Brazil: Cumulative count of influenza-associated SARI deaths greater than historic average, EW 52 (2014-2018)
Recuentos acumulados de fallecidos por IRAG asociados a influenza mayor al promedio histórico, SE 52 (2014-2018)




Chile

- During EW 4, at national level, the SARI cases slightly decreased from the previous weeks below the seasonal levels observed during 2015-2018 for the same period (Graph 4); while ILI activity also decreased (Graph 5). In EW 4, 2019, influenza activity remained below the historic average, with influenza B predominating (Graphs 1,3). RSV percent positivity remained at low levels and similar to the levels reported in 2017-18 for the same period (Graph 2). / Durante la SE 4, a nivel nacional, los casos de IRAG disminuyeron ligeramente respecto a las semanas previas bajo los niveles estacionales observados durante 2015-2018 para el mismo período (Gráfico 4), mientras que la actividad de ETI disminuyó también (Gráfico 5). En la SE 4 de 2019, la actividad de influenza permaneció bajo el promedio histórico, con predominio de influenza B (Gráficos 1, 3). El porcentaje de positividad de VSR permaneció a niveles bajos y similar a los niveles reportados en 2017-18 para el mismo período (Gráfico 2).


Graph 1. Chile: Influenza virus distribution by EW 4, 2015-19
Distribución de virus de influenza, por SE 4, 2015-19




Graph 2. Chile: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. Chile: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 4, 2019
(in comparison to 2010-2018)
Línea basal para el porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)



Graph 4. Chile. Number of SARI cases from all hospitalizations, EW 4, 2018-19,
Número de casos IRAG por las hospitalizaciones totales, SE 4, 2018-2019



Graph 5. Chile. Number of ILI cases, EW 4, 2019, in comparison 2018
Número de casos ETI, SE 4, 2019, en comparación 2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

Paraguay


- During EW 4, at national level, the SARI case counts increased above the seasonal threshold (Graph 5), with a predominance among the under 5 and above 60 years of age population. In EW 4, the number of SARI deaths out of total deaths increased from the prior week (Graph 6) mainly among the 60 years of age and older. ILI activity remained at seasonal levels after peaking later than in the previous 2016-2017 seasons. In EW 4, 2019, influenza activity remained

low as compared to previous weeks with few influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 detections (Graphs 1, 3); RSV positivity decreased (Graph 2). / Durante la SE 4, a nivel nacional, el recuento de casos de IRAG disminuyeron por debajo del umbral estacional (Gráfico 5), con predominio entre la población menor de 5 años y mayor de 60 años. En la SE 4, el número de muertes por IRAG del total de muertes aumentó en relación a la semana previa, (Gráfico 6) principalmente entre los mayores de 60 años. La actividad de ETI permaneció bajo los niveles estacionales luego de un pico más tardío que en temporadas anteriores de 2016-2017. En la SE 4 de 2019, la actividad de influenza permaneció baja en comparación con las semanas previas con contadas detecciones de influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1, 3); la positividad de VSR disminuyó ligeramente (Gráfico 2).


Graph 1. Paraguay: Influenza virus distribution EW 4, 2015-19



Graph 2. Paraguay: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19




Graph 3. Paraguay SARI sentinel sites: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)




Graph 4. Paraguay: Number of SARI cases with samples, EW 4, 2019 (as compared to 2015-2018)/

Numero de casos con muestra, SE 4, 2019 (en comparación a 2015-2018)




Graph 5. Paraguay: Number of SARI cases per total hospitalizations, EW 4 2019 (as compared to 2016-2018)

Número de casos IRAG por total hospitalizaciones, SE 4, 2019 (en comparación con 2016-2018)



Graph 6. Paraguay: Number of SARI deaths per total deaths, EW 4, 2018-19.

Número de fallecidos por IRAG, SE 4, 2018-19




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).


Uruguay

- In EW 4, decreased influenza activity was reported with few samples overall (Graphs 3, 4); with increased RSV positivity (Graph 2). During the first four weeks of 2019, the proportion of SARI cases among all hospitalizations, the proportion of SARI case requiring ICU admission and the proportion of SARI-associated cases remained at low levels (Graph 1, 5). / Durante la SE 4, se reportó menor actividad de influenza con escasas detecciones en general (Gráficos 3, 4); con positividad de VSR aumentada (Gráfico 2). Durante las primeras cuatro semanas de 2019, la proporción de casos de IRAG del total de hospitalizaciones, la proporción de casos de IRAG con admisión a UCI y la proporción de fallecidos por IRAG permanecieron a niveles bajos en relación a las semanas anteriores (Gráfico 1).


Graph 1. Uruguay: % SARI cases requiring ICU admission, EW 4, 2019;
Porcentaje de casos de IRAG admitidos a UCI, SE 4, 2019




Graph 2. Uruguay: Influenza and RSV distribution, EW 4, 2015-19
Distribución de virus influenza y VSR, SE 4, 2015-19




Graph 3. Uruguay: Influenza virus distribution by EW 4, 2015-19
Distribución de virus de influenza, por SE 4, 2015-19



Graph 4. Uruguay: Percent positivity for influenza, EW 4, 2019 (in comparison to 2010-2018)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 4, 2019 (en comparación a 2010-2018)



Graph 5. Uruguay: Percent of SARI cases per total hospitalizations, EW 52, 2017-2018
Porcentaje de casos IRAG por total hospitalizaciones, SE 52, 2017-2018




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver mas datos epi, vea [aquí](#).

In the temperate zone of the northern hemisphere influenza activity continued to increase slowly. In North America influenza activity remained elevated overall with influenza A(H1N1)pdm09 predominating, while both influenza A viruses circulated in Europe. In Western and East Asia, some countries reached medium levels of influenza intensity. In Southern Asia, influenza detections remained elevated overall mainly due to increased influenza A(H3N2) detections. In the temperate zones of the southern hemisphere, influenza activity returned to inter-seasonal levels with exception of some parts in Australia. Worldwide, seasonal influenza A viruses accounted for the majority of detections. / En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando lentamente. En América del Norte, la actividad de influenza permaneció elevada en general, predominando influenza A(H1N1) pdm09, mientras que ambos virus influenza A circularon en Europa. En Asia occidental y oriental, algunos países alcanzaron niveles medios de intensidad de influenza. En el sur de Asia, las detecciones de influenza se mantuvieron elevadas en general debido principalmente al aumento de las detecciones de influenza A(H3N2). En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles interestacionales, con excepción de algunas partes en Australia. En todo el mundo, los virus influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones

National Influenza Centres (NICs) and other national influenza laboratories from 104 countries, areas or territories reported data to FluNet for the time period from 24 December 2018 to 6 January 2019. The WHO GISRS laboratories tested more than 191778 specimens during that time period. 39161 were positive for influenza viruses, of which 38493 (98.3%) were typed as influenza A and 668 (1.7%) as influenza B. Of the sub-typed influenza A viruses, 13313 (79.4%) were influenza A(H1N1)pdm09 and 3446 (20.6%) were influenza A(H3N2). Of the characterized B viruses, 45 (38.1%) belonged to the B-Yamagata lineage and 73 (61.9%) to the B-Victoria lineage. / Los Centros Nacionales de Influenza (NICs) y otros laboratorios nacionales de influenza de 104 países, áreas o territorios, reportaron datos a FluNet en el período del 24 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019. Los laboratorios de la OMS GISRS realizaron pruebas a más de 191778 muestras durante ese período. 39161 tuvieron resultado positivo para virus influenza, de los cuales 38493 (98,3%) fueron tipificados como influenza A y 668 (1,7%) como influenza B. De los virus influenza A subtipificados, 13313 (79,4%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 3446 (20,6%) fueron influenza A(H3N2). De los virus influenza B caracterizados, 45 (38,1%) fueron del linaje B-Yamagata y 73 (61,9%) fueron del linaje B-Victoria.

Percentage of respiratory specimens that tested positive for influenza By influenza transmission zone

Status as of 18 January 2019



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source:
Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS),
FluNet (www.who.int/flu-net)

World Health Organization
© WHO 2019. All rights reserved.

This report summarizes³ the epidemiological and virological features of the laboratory-confirmed human cases of infection with influenza viruses of animal origin from 14 December 2018 to 21 January 2019⁴.

- **New infections:** One human infection with an avian influenza A(H9N2) virus was reported.
- **Risk assessment:** The overall public health risk from currently known influenza viruses at the human-animal interface has not changed, and the likelihood of sustained human-to-human transmission of these viruses remains low. Further human infections with viruses of animal origin are expected.
- **Risk management:** Selection of new candidate vaccine viruses (CVVs) for zoonotic influenza for influenza pandemic preparedness purposes was done during a recent WHO consultation.
- **IHR compliance:** All human infections caused by a new influenza subtype are required to be reported under the International Health Regulations (IHR 2005). Information from these notifications is critical to inform risk assessments for influenza at the human-animal interface. /

Este reporte resume⁵ las características epidemiológicas y virológicas de los casos confirmados en laboratorio de infección por virus influenza de origen animal del 14 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019⁶.

- **Nuevas infecciones:** Una infección por virus influenza aviar A(H9N2) fue reportada.
- **Evaluación de riesgo:** El riesgo general para la salud pública de los virus influenza conocidos en la interfaz entre humanos y animales no ha cambiado, y la probabilidad de transmisión sostenida de estos virus sigue siendo baja. Se esperan más infecciones humanas con virus de origen animal.
- **Gestión de riesgos:** durante una reciente consulta de la OMS, se realizó la selección de nuevos virus de vacuna candidata (CVV) para la influenza zoonótica con fines de preparación para una pandemia de influenza.
- **Cumplimiento del RSI:** Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza deben informarse según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005). La información de estas notificaciones es fundamental para informar las evaluaciones de riesgo para la influenza en la interfaz humano-animal.

Avian influenza viruses / Virus influenza aviar

Avian influenza A(H5) viruses / Virus influenza aviar A(H5)

Since 13 December 2018, no new laboratory-confirmed human cases of influenza A(H5) virus infections were reported to WHO. Various influenza A(H5) subtypes continue to be detected in birds in Africa, Europe and Asia. Overall, the risk assessment has not changed. / Desde el 13 de diciembre de 2018, no se informó a la OMS de nuevos casos confirmados por laboratorio de infecciones por el virus influenza A(H5). Se siguen detectando varios subtipos de influenza A(H5) en aves de África, Europa y Asia. En general, la evaluación de riesgos no ha cambiado.

Avian influenza A(H7N9) viruses / Virus influenza aviar A(H7N9)

Since 13 December 2018, no new laboratory-confirmed human cases of influenza A(H7N9) virus infections were reported to WHO. There have been no publicly available reports from animal health authorities in China of influenza A(H7N9) virus detections in animals in recent months. Overall, the risk assessment has not changed. /

Desde el 13 de diciembre de 2018, no se notificaron a la OMS casos nuevos confirmados por laboratorio de infecciones por el virus influenza A(H7N9). En los últimos meses, las autoridades de sanidad animal de China no han publicado informes públicos sobre la detección del virus influenza A(H7N9) en animales. En general, la evaluación de riesgos no ha cambiado.

³ For epidemiological and virological features of human infections with animal influenza viruses not reported in this assessment, see the yearly report on human cases of influenza at the human-animal interface published in the Weekly Epidemiological Record. www.who.int/wer/en/

⁴ WHO (2018) Influenza at the human-animal interface Summary and assessment. Available at: http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAIRiskAssessment/en/

⁵ Para conocer las características epidemiológicas y virológicas de las infecciones humanas con virus de influenza animal no reportadas en esta evaluación, consulte el informe anual sobre casos humanos de influenza en la interfaz humano-animal publicado en el Reporte Epidemiológico Semanal. Disponible en: www.who.int/wer/en/

⁶ OMS (2018) Influenza en la interfaz humano-animal Resumen y evaluación. Disponible en: http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAIRiskAssessment/en/

Avian influenza A(H9N2) viruses / Virus influenza aviar A(H9N2)

Since 13 December 2018, one new laboratory-confirmed human case of influenza A(H9N2) virus infection was reported to WHO. On 3 January 2019, China reported the detection of avian influenza A(H9N2) virus in a 32-year-old woman from Guangdong, with an onset of illness on 19 December 2018. The illness was reportedly mild, but she was hospitalized on 25 December 2018. The woman did not report exposure to live poultry. During epidemiological investigations, no further cases among family members were reported. Avian influenza A(H9N2) viruses are enzootic in poultry in China. /

Desde el 13 de diciembre de 2018, se informó a la OMS un nuevo caso confirmado por laboratorio de infección por el virus influenza A(H9N2) en humanos. El 3 de enero de 2019, China informó sobre la detección del virus influenza aviar A(H9N2) en una mujer de 32 años de Guangdong, con inicio de síntomas el 19 de diciembre de 2018. La enfermedad fue leve, pero fue hospitalizada el 25 de diciembre de 2018. La mujer no reportó exposición a aves de corral vivas. Durante las investigaciones epidemiológicas, no se reportaron más casos entre familiares. Los virus influenza aviar A(H9N2) son enzoóticos en aves de corral en China.

ACRONYMS

ARI	Acute Respiratory Infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological Week
ILI	Influenza-like illness
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
ICU	Intensive Care Unit
RSV	Respiratory Syncytial Virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe/Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad Tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRAG	Infección Respiratoria Aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
VSR	Virus Sincitial Respiratorio