

VACUNA A TU NIÑO CONTRA EL SARAMPIÓN

LE PUEDES SALVAR LA VIDA

EL SARAMPIÓN PUEDE CAUSAR:

- NEUMONÍA
- DAÑO CEREBRAL PERMANENTE
- SORDERA
- PARTO PREMATURO
- BEBÉS CON BAJO PESO AL NACER
- MUERTE



SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN





- FIEBRE ALTA
- MOQUEO NASAL
- TOS
- OJOS ROJOS
- ERUPCIÓN


Suelen aparecer de 7 a 14 días después de infectarse

EL SARAMPIÓN ES MUY CONTAGIOSO

SE TRANSMITE CUANDO UNA PERSONA INFECTADA RESPIRA, TOSE O ESTORNUDA.




EL VIRUS QUEDA EN EL AMBIENTE Y EN LAS SUPERFICIES POR 2 HORAS.




LA PERSONA INFECTADA PUEDE CONTAGIAR DESDE 4 DÍAS ANTES HASTA 4 DÍAS DESPUÉS DE PRESENTAR EL SARPULLIDO.

UNA PERSONA CON SARAMPIÓN PUEDE INFECTAR A 9 DE CADA 10 PERSONAS A SU ALREDEDOR SI NO ESTÁN VACUNADAS.



¿CUÁNDO DEBEMOS VACUNAR A LOS NIÑOS?



1ERA DOSIS
[12-15 meses]

2DA DOSIS
[18 meses*]

En brotes o campañas de actualización puede aplicarse la vacuna a personas de otros grupos de edad

LA ÚNICA MANERA DE PREVENIR EL SARAMPIÓN ES CON LA VACUNACIÓN. LA VACUNA ES SEGURA Y EFECTIVA.

*0 4-6 años según el esquema nacional

VACÚNATE ANTES DE VIAJAR



HAY SARAMPIÓN EN MUCHOS LUGARES DEL MUNDO

Los viajeros, niños y adultos, que no saben si están vacunados, deben recibir una dosis al menos 2 semanas antes de viajar.

SI TIENES SARAMPIÓN

- Quédate en la casa o en la habitación del hotel si estás de viaje
- Consulta a un profesional de la salud
- Evita concurrir a lugares públicos

PROTÉGETE Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS.

EVITA EL SARAMPIÓN,

#VACÚNATE

