

2020

Weekly / Semanal Influenza Report EW 3/ Reporte de Influenza SE 3

Regional Update: Influenza & Other Respiratory Viruses /
Actualización Regional: Influenza y Otros virus respiratorios



**January 28, 2020
28 de enero de 2020**

*Data as of January 24, 2020/
Datos hasta el 24 de enero de 2020*

*Prepared by PHE/IHM/Influenza Team/
Realizado por PHE/IHM/Equipo de Influenza*

WEEKLY REPORT DATA SOURCES

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/flunet/en/ and http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/fluid/en/; and reports/weekly bulletins that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: [FluNet](#) y [Fluid](#); y de los informes/boletines semanales que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con OPS/OMS.

PAHO INFLUENZA LINKS

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO FluNet: http://ais.paho.org/php/viz/ed_flu.asp

PAHO Fluid: <http://ais.paho.org/php/viz/flumart2015.asp>

Influenza regional reports / Informes regionales de influenza

In English: <https://www.paho.org/hq/influenzareport>

En español: www.paho.org/reportesinfluenza

Severe acute respiratory infections network - SARinet
Red de las infecciones respiratorias agudas graves - SARinet:

<http://www.sarinet.org>

[Go to Index/](#)
[Ir al Índice](#)

REPORT INDEX

ÍNDICE DE LA ACTUALIZACIÓN

Section	Content	Page
1	<u>Weekly Summary / Resumen Semanal</u>	4
2	<u>Overall Influenza and RSV circulation / Circulación general de los virus influenza y VRS</u>	6
3	<u>Weekly and Cumulative numbers / Números semanales y acumulados</u>	8
4	<u>Epidemiological and Virologic updates by country / Actualización epidemiológica y virológica por país</u>	9
5	<u>Acronyms / Acrónimos</u>	34

WEEKLY SUMMARY (ENGLISH)

North America: During epidemiological week (EW) 3, influenza activity continued elevated in the sub-region. In [Canada](#), influenza A viruses remain the predominant circulating type with co-circulation of influenza B, A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) viruses. In the [United States](#) influenza activity slightly increased with influenza B/Victoria and influenza A(H1N1)pdm09 viruses predominating this season. In [Mexico](#), influenza A(H1N1)pdm09 virus predominated with influenza A(H3N2), influenza B/Victoria, and B/Yamagata co-circulating.

Caribbean: Overall, influenza activity is low in the sub-region. In [Suriname](#), influenza activity increased but remained at a low level of transmissibility. In [St. Lucia](#), influenza-like illness (ILI) activity increased among those aged ≥ 5 years and was at the alert threshold; SARI activity continues at low levels.

Central America: Influenza activity was low in the sub-region and SARI cases among all hospitalizations were at low levels.

Andean: Overall, influenza and other respiratory viruses activity remained low in the sub-region. In [Colombia](#), influenza activity continues to decrease with influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and influenza B viruses co-circulating. In [Peru](#), influenza activity increased with influenza B/Victoria predominance and influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) viruses co-circulating.

Brazil and Southern Cone: Influenza activity continued at very low levels in the subregion.

RESUMEN SEMANAL (ESPAÑOL)

América del Norte: en la semana epidemiológica (SE) 3, la actividad de influenza continuó elevada en la subregión. En [Canadá](#), los virus de influenza A siguen siendo el tipo circulante predominante con la circulación concurrente de los virus influenza B, A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). En los [Estados Unidos](#), la actividad de influenza aumentó ligeramente con los virus influenza B/Victoria e influenza A(H1N1)pdm09 que predominan en esta temporada. En [México](#), el virus influenza A(H1N1)pdm09 predominó con la circulación concurrente de influenza A(H3N2), influenza B/Victoria y B/Yamagata.

Caribe: en general, la actividad de influenza es baja en la subregión. En [Surinam](#), la actividad de influenza aumentó, pero permaneció a un bajo nivel de transmisibilidad. En [Santa Lucía](#), la actividad de la enfermedad tipo influenza (ETI) aumentó entre las personas ≥ 5 años y se ubicó en el umbral de alerta, la actividad de la IRAG continua en niveles bajos.

América Central: la actividad de influenza presentó una tendencia decreciente en la subregión y los casos de IRAG entre todas las hospitalizaciones estuvieron en niveles bajos.


Andina: en general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En [Colombia](#), la actividad de la influenza continúa disminuyendo con los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e influenza B que circulan conjuntamente. En [Perú](#), la actividad de influenza aumentó con el predominio de los virus influenza B/Victoria y la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2).

Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza continuó en niveles muy bajos en la subregión.

Influenza circulation by subregion, 2014-20




Respiratory syncytial virus (RSV) circulation by subregion, 2014-20



*To view more lab data, view [here](#). / Para ver más datos de laboratorio, vea [aquí](#).

Genetic Characterization of Influenza Virus by Subregion, 2017-19

Caracterización Genética de los Virus Influenza por Subregión, 2017-19



Weekly and cumulative numbers of influenza and other respiratory viruses, by country and EW, 2020¹ Números semanales y acumulados de influenza y otros virus respiratorios, por país y SE, 2020²

EW 3, 2020 / SE 3, 2020																					
		N samples/muestras	A(H3N2)	A(H1N1)pdm09	Influenza A Non-Subtyped	Influenza A Non-subtipificado	B Victoria	B Victoria Δ162/163	B Yamagata	B linaje no determinado	Influenza (+) %	Adenovirus	Parainfluenza	VSR	% RSV/VSR (+)	Bocavirus	Coronavirus	Metapneumovir.	Rinovirus *	% All Positive Samples (+)	
North America/ América del Norte	Canada	13,323	116	395	1,558					1,360	25.8%								25.8%		
	Mexico	614	43	172	0	16	18	0	2	18	43.8%	0	0	5	1%	0	1	0	1	45.0%	
	USA	1,262	18	306	40		308		2	82	59.9%									59.9%	
Caribbean/ Caribe	Dominican Rep.	4									0.0%									0.0%	
	French Guiana	1		1							100.0%									100.0%	
	Haiti	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%	
	Jamaica	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100.0%	0	0	0	0%					100.0%	
	Suriname	6	0	1	0	0	0	0	0	0	16.7%	0	0	0	0%	0	0	0	0	16.7%	
Central America/ América Central	Costa Rica	7	0	2	0	0	0	0	0	0	28.6%	0	0	0	0%	0	0	0	0	28.6%	
	El Salvador	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	1	0	1	5%	0	0	0	0	9.5%	
	Honduras	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	1	1	50%					50.0%	
	Nicaragua	52	1	1						1	5.8%	1	2	1	2%					13.5%	
	Panama	13					2				15.4%					1	2	3		61.5%	
Andean/ Andina	Bolivia	10	0	1	0	0	0	0	0	0	6.7%	0	0	0	0%	0	0	0	0	13.3%	
	Colombia	55	0	3	2					3	14.5%	2	2	10	18%	1	2			45.5%	
	Ecuador	10	1	2							30.0%									30.0%	
	Peru	100	2	3	0	0	7	0	1	0	13.0%	0	2	5	5%	0	0	0	0	20.0%	
	Venezuela	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Brazil	163									8.5%									14.5%	
	Chile	323	1	4	1					1	2	2.8%	13	10							11.1%
	Chile_IRAG	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	2	0	0	0%	0	0	0	0	13.3%	
	Paraguay	35	0	0	0	0	0	0	0	2	5.7%	0	0	1	3%	0	0	0	0	8.6%	
	Uruguay	2	0	1	0	0	0	0	0	0	50.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	50.0%	
Grand Total		16,045	182	893	1,558	16	335	0	6	1,476	28.2%	19	16	24	0%	0	3	8	4	28.7%	

These are the raw numbers provided in the country's FluNet update (Not the smoothed averages)
Estos son los números crudos proporcionados en la actualización FluNet del país (no los promedios suavizados)

*Please note blank cells indicate N/A.

*Por favor notar que las celdas en blanco indican N/A.

EW 2, 2020 / SE 2, 2020																	
*Note: These countries reported in EW 3, 2020, but have provided data up to EW 2. *Nota: Estos países reportaron en la SE 3 de 2020, pero han enviado los datos hasta la SE 2.																	
	N samples/muestras	Influenza A(H3N2)	Influenza A(H1N1)pdm09	Influenza A Non-subtyped	Influenza A No subtipificado	Influenza A not yet subtyped/no subtipificado	Total Influenza B	Influenza (+) %	Adenovirus	RSV/VSR	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	Metapneumovir.	Rhinovirus*	Parainfluenza*	% All Positive Samples (%)
Central America/ Ameri., Guatemala	2						0	0.0%				0	0	0	0	0	0.0%
Grand Total	2						0	0.0%				0	0	0	0	0	0.0%

EW 52, 2019 - EW 3, 2020 / SE 52, 2019 - SE 3, 2020																				
	N samples/muestras	Influenza (H3N2)*	Influenza A/H1N1pdm09*	Influenza A Non-subtyped*	Influenza A Non-subtipificado*	Influenza D Victoria*	Victoria Δ162/163	Influenza D Yamagata*	Influenza B lineage undetermined.	Influenza (+) %	Adenovirus*	Parainfluenza*	RSV/VSR*	% RSV/VSR (+)	Bocavirus*	Coronavirus*	Metapneumovir.	Rhinovirus*	Parainfluenza*	% All Positive Samples (%)
North America/ América del Norte	Canada	54,290	703	1,493	6,035	0	0	5,734	25.0%	71	91	902	1.7%	0	98	112	240	20.0%		
	Mexico	2,715	245	637	0	93	0	14	33	39.1%	4	2	44	1.6%	0	3	1	8	41.4%	
	USA	7,584	160	2,124	108	1,971		25	514	64.9%	0	0	0	0%	0	0	0	0	64.9%	
Caribbean/ Caribe	Belize	3	0	0	0	0		0	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0.0%	
	Dominican Republic	51	0	7	0	1		2	0	19.6%	0	0	0	0%	0	0	0	0	19.6%	
	French Guiana	12	0	3	0	0		0	0	25.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	25.0%	
	Haiti	67	2	0	0	0	0	0	0	4.5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	4.5%	
	Jamaica	61	1	6	0	0		0	1	13.1%	0	0	0	0%	0	0	0	0	13.1%	
Central America/ América Central	Suriname	40	0	5	0	0	0	0	1	15.0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	15.0%	
	Costa Rica	48	0	4	0	0	0	0	0	8.3%	6	0	2	4.2%	0	1	0	2	31.3%	
	El Salvador	48	0	1	0	0	0	0	0	2.1%	2	0	1	2.1%	0	0	0	0	8.3%	
	Guatemala	14	0	0	0	0		0	0	0.0%	1	0	3	21.4%	0	0	0	0	28.6%	
	Honduras	44	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	2	4.5%	0	0	0	0	4.5%	
Andean/ Andina	Nicaragua	199	1	2	0	0		0	2	2.5%	2	2	1	0.5%	0	0	0	0	5.0%	
	Panama	81	0	1	0	5	0	0	0	7.4%	3	2	13	16.0%	0	1	9	22	69.1%	
	Bolivia	252	0	2	0	3		0	0	10.3%	0	0	4	1.6%	0	0	0	0	23.0%	
	Colombia	442	3	31	2	0		6	13	12.4%	11	20	54	12.2%	0	3	13	8	56.1%	
	Ecuador	197	5	33	0	0		0	4	21.3%	1	2	5	25%	0	0	0	0	25.4%	
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	Peru	275	4	6	0	13	0	2	0	9.1%	0	2	18	6.5%	0	0	0	0	16.4%	
	Brazil	374	0	2	0	0		0	1	29.9%	0	0	0	0%	0	0	2	0	39.3%	
	Chile	1,482	2	7	3	0		1	18	2.1%	58	40	5	0.3%	0	0	37	0	11.1%	
	Chile_IRAG	70	0	1	0	0		0	0	1.4%	2	0	0	0%	0	0	1	0	5.7%	
	Paraguay	232	0	1	0	0		0	0	6.9%	1	0	4	17%	0	0	1	0	9.5%	
Grand Total	Paraguay IRAG	0	0	0	0	0		0	0	0.0%	1	0	0	0%	0	0	1	0	25.0%	
	Uruguay	3	0	1	0	0		0	0	33.3%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	33.3%	

	Total Influenza B	B Victoria	Victoria Δ162/163	B Yamagata	B linaje no determinado	% B Victoria	% B Vic Δ162/163	% B Yamagata
North America/ América del Norte	8,384	2,064	0	39	6,281	98%	0%	2%
Caribbean/ Caribe	5	1	0	2	3	33%	0%	67%
Central America/ América Central	7	5	0	0	2	100%	0%	0%
Andean/ Andina	46	16	0	8	23	67%	0%	33%
Brazil & Southern Cone/ Brasil y Cono Sur	119	0	0	1	34	0%	0%	100%
Grand Total	8,561	2,086	0	50	6,342	98%	0%	2%

¹The detection of respiratory viruses other than influenza depends on the diagnostic capacity of each country and monitoring system. The absence of report of other respiratory viruses does not indicate the absence of their circulation.

²La detección de otros virus respiratorios diferentes a influenza depende de la capacidad diagnóstica de cada país y del sistema de vigilancia establecido. El que no se reporten otros virus respiratorios, no significa, ni indica la ausencia de circulación viral.

EPIDEMIOLOGIC AND VIROLOGIC UPDATE OF INFLUENZA & OTHER RESPIRATORY VIRUSES BY COUNTRY


ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y VIROLÓGICA DE INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS POR PAÍS

North America / América del Norte


Canada / Canadá

- During EW 3, 2020, at the national level, influenza activity remains elevated. Influenza detections decreased in comparison to the previous week with co-circulation of influenza A and influenza B viruses and influenza A(H1N1)pdm09 predominance among the subtyped influenza A viruses (Graph 1). This week, 38% of the regions reported a localized level of activity and 58% reported sporadic activity (Graph 2). The percentage of visits to healthcare professionals due to ILI (2.1%) was at the average for this time of year (2.1%) (Graph 3). In EW 3, 81 pediatric laboratory-confirmed influenza-associated hospitalizations were reported and were above the average for this period over the previous five seasons. To date this season, most pediatric laboratory-confirmed influenza-associated hospitalizations were associated with influenza B (52%) and 49% with influenza A viruses (Graph 4). To date this season, 352 hospitalizations, 15 ICU admissions, and six deaths were reported among adults (≥ 16 years) with laboratory-confirmed influenza. Most hospitalizations have been due to influenza A (88%); among those subtyped (93), 91% were influenza A(H1N1). / En la SE 3 de 2020, a nivel nacional, la actividad de la influenza permanece elevada. Las detecciones de influenza disminuyeron en comparación con la semana anterior con la circulación concurrente de los virus influenza A e influenza B y el predominio de influenza A(H1N1)pdm09 entre los virus de influenza A, a los cuales se les determinó el subtipo (Gráfico 1). En esta semana, de las regiones informantes, el 38% informó un nivel de actividad localizado y el 58% de actividad esporádica (Gráfico 2). En la SE 3, el porcentaje de visitas a profesionales de la salud debido a ETI (2,1%) estuvo en el promedio para esta época del año (2,1%) (Gráfico 3). En la SE 3, se notificaron 81 hospitalizaciones pediátricas asociadas a la influenza confirmadas por laboratorio y estuvo por encima del promedio para este período durante las cinco temporadas anteriores. Hasta la fecha, esta temporada, la mayoría de las hospitalizaciones pediátricas asociadas con influenza confirmadas por laboratorio se asociaron con influenza B (52%) y 49% con el virus de influenza A (Gráfico 4). A la fecha de esta temporada, se informaron 352 hospitalizaciones, 15 ingresos a la UCI y seis muertes entre adultos (≥ 16 años) con influenza confirmada por laboratorio. La mayoría de las hospitalizaciones se han debido a la influenza A (88%); entre las muestras a las que se les determinó el subtipo, 93 (91%) fueron influenza A(H1N1).


Graph 1. Canada: Influenza virus distribution, EW 3, 2015 –20
Distribución de virus de influenza, SE 3, 2015 –20




Graph 3. Canada: Percentage of ILI visits by sentinel sites, EW 35, 2019 to EW 3, 2020
Porcentaje de casos de ETI por sitio centinela, SE 35 de 2019 a SE 3 de 2020



Graph 2. Canada: Influenza activity by provincial and territorial influenza surveillance regions, EW 3, 2020
Actividad de influenza por regiones de vigilancia de influenza provinciales y territoriales, SE 3 de 2020



Graph 4. Canada: Number of pediatric hospitalizations (≤ 16 years old), EW 35, 2019 to EW 3, 2020
Número de hospitalizaciones pediátricas (≤ 16 años), SE 35 de 2019 a SE 3 de 2020




United States / Estados Unidos

- During EW 3, 2020, influenza detections decreased in comparison to previous weeks with influenza B/Victoria and influenza A(H1N1)pdm09 equally identified in recent weeks, and co-circulation of influenza A(H3N2) viruses (Graph 1). After decreasing in previous weeks (EWs 1 and 2), influenza activity increased in EW 3 (Graph 2). Thirty-seven jurisdictions reported high ILI activity: New York City, Puerto Rico, and 35 states (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming). Moderate activity was experienced in the District of Columbia and six states (Florida, Iowa, Minnesota, Missouri, South Dakota, and Vermont). The rest of the states experienced low or minimal activity (Graph 3). Influenza-like illness increased in comparison to previous weeks and was above the national baseline (2.4%) at a level of 5.0% of patients visits (Graph 4). The highest rate of laboratory-confirmed influenza hospitalizations was among adults aged ≥ 65 years (58.1 per 100,000 pop) followed by children aged 0-4 years (40.6 per 100,000 pop) (Graph 5). The overall cumulative hospitalization rate was 24.1 per 100,000 population. In EW 3, 6.7% of reported deaths were due to pneumonia and influenza; this is below the epidemic threshold of 7.1% for EW 2 (Graph 6). / En la SE 3 de 2020, las detecciones de influenza disminuyeron en comparación con las semanas anteriores con influenza B/Victoria e influenza A(H1N1)pdm09 igualmente identificadas en las últimas semanas, y la circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2) (Gráfico 1). Después de disminuir en las semanas anteriores (SE 1 y 2), la actividad de influenza aumentó en la SE 3 (Gráfico 2). En la SE 3, treinta y siete jurisdicciones informaron una alta actividad de ETI: la ciudad de Nueva York, Puerto Rico y 35 estados (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawái, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, y Wyoming). Se experimentó una actividad moderada en el Distrito de Columbia y seis estados (Florida, Iowa, Minnesota, Missouri, Dakota del Sur y Vermont). El resto de los estados experimentaron una actividad baja o mínima (Gráfico 3). La enfermedad similar a la influenza aumentó en comparación con las semanas anteriores y estuvo por encima de la línea de base nacional (2,4%) a un nivel del 5,0% de las visitas de los pacientes (Gráfico 4). La tasa más alta de hospitalizaciones por influenza confirmadas por laboratorio fue entre adultos de ≥ 65 años (58,1 por 100.000 habitantes) seguidos de niños de 0 a 4 años (40,6 por 100.000 habitantes) (Gráfico 5). La tasa global de hospitalización acumulada fue de 24,1 por 100.000 habitantes. En la SE 3, el 6,7% de las muertes reportadas se debieron a neumonía e influenza; este porcentaje está por debajo del umbral epidémico del 7,1% para la SE 2 (Gráfico 6).

Graph 1. US: Influenza virus distribution, EW 3, 2020
2019-2020 season

Distribución de virus de influenza, SE 3 de 2020

Temporada 2019-2020




Graph 2. US: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
2019-2020 season

Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020

Temporada 2019-2020

Influenza Positive Tests Reported to CDC by U.S. Clinical Laboratories,
National Summary, 2019-2020 Season




Graph 3. US: ILI activity level indicator determined by state,

EW 3, 2020


Indicador de nivel de actividad de ETI por estado,

SE 3 de 2020




Graph 5. US: Laboratory-confirmed influenza hospitalizations rates (per 100,000 population) by age group, EW 3, 2020

Tasas de hospitalizaciones (por 100.000 habitantes) por influenza confirmada por el laboratorio, por grupo de edad, SE 3 de 2020



Graph 4. US: Percentage of visits for ILI, EW 3, 2009-20


Porcentaje de visitas por ETI, SE 3, 2009-20



Graph 6. US: Pneumonia and influenza mortality, EW 3, 2015-20

Mortalidad por neumonía e influenza, SE 3, 2015-20

Pneumonia and Influenza Mortality from the National Center for Health Statistics Mortality Surveillance System Data through the week ending January 11, 2020, as of January 23, 2020




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Mexico

- During EW 3, 2020, influenza detections decreased in comparison to the previous week with influenza A(H1N1)pdm09 predominance and influenza A(H3N2), influenza B/Victoria and B/Yamagata viruses co-circulating (Graph 1). Influenza percent positivity increased this week and was slightly above the average epidemic curve for this period (Graph 2). RSV detections decreased in comparison to the previous week with few RSV detections reported and rhinovirus and coronavirus co-circulating (Graph 2). As of EW 3, 1744 influenza-associated SARI/ILI cumulative cases were reported with 69 SARI/ILI influenza-related cumulative deaths. The jurisdictions with the highest number of influenza-confirmed cases during 2019-20 season were: Mexico City, Mexico State, Yucatan, Hidalgo and Nuevo Leon while the jurisdictions with the highest SARI/ILI influenza-related cumulative deaths were Mexico City, Hidalgo, Mexico State, Veracruz and Baja California (Graphs 4 and 5). / En la SE 3 de 2020, las detecciones de influenza disminuyeron en comparación con la semana previa con el predominio de influenza A(H1N1)pdm09 y la circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2), influenza B/Victoria y B/Yamagata (Gráfico 1). El porcentaje de positividad de influenza aumentó esta semana y estuvo ligeramente por encima de la curva epidémica promedio para este período (Gráfico 2). Las detecciones de VRS disminuyeron en comparación con la semana anterior con pocas detecciones de VRS reportadas y la circulación concurrente de rinovirus y coronavirus (Gráfico 2). A partir de la SE 3, se notificaron 1.744 casos acumulados de IRAG / ETI asociados a influenza con 69 muertes por IRAG / ETI acumuladas, asociadas con la influenza. Las jurisdicciones con el mayor número de casos confirmados de influenza durante la temporada 2019-20 fueron: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Nuevo León, mientras que las jurisdicciones con el mayor número de muertes por IRAG / ETI, acumuladas, relacionadas con influenza, ocurrieron en Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Baja California (Gráficos 4 y 5).


Graph 1. Mexico: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 3, 2015-20



Graph 3. Mexico: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2010-19)




Graph 5. Mexico: SARI/ILI-influenza deaths, EW 3, 2020
Casos fallecidos por IRAG/ETI asociados a Influenza, SE 3 de 2020




Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 16/01/2020.

Graph 2. Mexico: Influenza and RSV distribution
EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20



Graph 4. Mexico: SARI/ILI-influenza positive, EW 3, 2020
Casos de IRAG/ETI positivos a influenza, SE 3 de 2020



Fuente: SINAVE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 16/01/2020.


Caribbean / Caribe

Dominican Republic / República Dominicana


- During EW 3, no influenza or RSV detections were reported with influenza B/Yamagata and B/Victoria circulating in previous weeks (Graphs 1, 2, and 3). SARI case counts slightly increased in comparison to the previous week and remained at interseasonal levels (Graph 4). / En la SE 3, no se notificaron detecciones de influenza o de VRS, con la circulación en semanas anteriores de los virus influenza B/Yamagata y B/Victoria (Gráficos 1, 2 y 3). Los recuentos de casos de IRAG aumentaron ligeramente en comparación con la semana anterior y se mantuvieron en los niveles entre temporadas (Gráfico 4).

Graph 1. Dominican Republic: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20


Distribución del virus influenza, SE 3, 2015-20

**Graph 2.** Dominican Republic Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20


Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20

**Graph 3.** Dominican Republic: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020 (compared to 2010-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020 (comparado con 2010-19)

**Graph 4.** Dominican Republic: SARI case counts, EW 2, 2020 (compared to 2018-19)

Recuento de casos de IRAG, SE 2 de 2020 (comparado con 2018-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

- Guadeloupe:** During EW 2, the number of ILI consultations increased as compared to the previous weeks and was below the seasonal levels for the same period (Graph 1), **Martinique:** Since EW 51, ILI consultations trended upward among children less than 2 years of age and remained below the seasonal threshold (Graph 2), **Saint-Martin:** The number of ILI consultations among children less than 2 years has fluctuated in recent weeks, in EW 2 it increased in comparison to the previous week (Graph 3), **Saint-Barthelemy:** The number of consultations due to ILI increased since EW 49 and was at a moderate level as compared to 2018-2019 seasons (Graph 4), **French Guiana:** During EW 3, few influenza detections (one sample) were reported. Influenza percent positivity increased in comparison to previous weeks and was lower in comparison to previous years (Graph 5) / **Guadalupe:** Durante la SE 2, el número de consultas por ETI aumentó en comparación con las semanas anteriores y estuvo por debajo de los niveles estacionales durante el mismo período (Gráfico 1), **Martinica:** Desde la SE 51, las consultas por ETI tuvieron una tendencia al alza entre los niños menores de 2 años de edad y se mantuvo por debajo del umbral estacional (Gráfico 2), **San Martín:** El número de consultas por ETI entre niños menores de 2 años ha fluctuado en las últimas semanas, en la SE 2 aumentó en comparación con la semana anterior (Gráfico 3), **San Bartolomeo:** El número de consultas debido a una ETI aumentó desde la SE 49 y estuvo en un nivel moderado en comparación con las temporadas 2018-2019 (Gráfico 4), **Guyana Francesa:** en la SE 3, se informaron pocas detecciones de influenza (una muestra). El porcentaje de positividad de la influenza aumentó en comparación con las semanas anteriores y fue más bajo en comparación con años anteriores (Gráfico 5)

Graph 1. Guadeloupe: Number of ILI consultations , in children less than 2 years, EW 2, 2017-20

Número de consultas por bronquiolitis, en niños menores de 2 años, SE 2, 2017-20


Nombre hebdomadaire de personnes ayant consulté un médecin généraliste de ville pour un syndrome grippal et seuil saisonnier, Guadeloupe, septembre 2017 à janvier 2020 - Source : réseau de médecins sentinelles



Graph 3. Saint-Martin: Number of ILI consultations , in children less than 2 years, EW 2, 2017-20

Número de consultas por ETI, en niños menores de 2 años, SE 2, 2017-20


Nombre de consultations en médecine de ville pour syndrome grippal, Saint-Martin, septembre 2017 à janvier 2020 - Source : réseau des médecins sentinelles



Graph 4. Saint-Barthelemy: Number of ILI consultations, in children less than 2 years, EW 2, 2017-20


Número de consultas por ETI, en niños menores de 2 años, SE 2, 2017-20

Nombre de consultations en médecine de ville pour syndrome grippal, Saint-Barthélemy, septembre 2017 à janvier 2020 - Source : réseau des médecins sentinelles



Graph 5. French Guiana: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20


Distribución del virus influenza, SE 3, 2015-20




Grenada

- After a peak in EW 50*, 2019, the number of ARI cases in children aged less than 5 years, trended downward and was below the ten years average curve (Graph 1). Among those ≥ 5 years, the number of ARI cases continues to decrease and remained above the average epidemic curve (Graph 2). / Después de un pico en la SE 50 de 2019, el número de casos de IRA en niños menores de 5 años mostró una tendencia descendente y estuvo por debajo de la curva promedio de diez años (Gráfico 1). Entre los ≥ 5 años, el número de casos de IRA continúa disminuyendo y se mantuvo por encima de la curva epidémica promedio (Gráfico 2).

Graph 1. Grenada: Number of ARI cases among children < 5 years,
EW 2, 2020 (compared to 2018-19)
Número de casos de IRA en niños < 5 años SE 2 de 2020
(comparado con 2018-19)



Graph 2. Grenada: Number of ARI cases among persons ≥ 5 years, EW 2, 2020 (compared to 2018-19)
Número de casos de IRA en niños < 5 años SE 2 de 2020
(comparado con 2018-19)




* Source: Ministry of Health of Grenada

**To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Haiti


- In recent weeks, decreased detections of influenza viruses have been observed, influenza A(H3N2) and influenza B/Victoria lineage co-circulated. Influenza percent positivity trended downward since EW 42 and decreased to a low level of activity in EW 2. No influenza or RSV detections were reported this week (Graphs 1 and 2). Since EW 39, the number of SARI hospitalizations has trended upward and was at the average epidemic curve in EW 3 (Graph 3). / En las últimas semanas se han observado menores detecciones de los virus influenza, los virus influenza A(H3N2) e influenza B linaje Victoria circularon conjuntamente. El porcentaje de positividad de influenza mostró una tendencia descendente desde la SE 42 y disminuyó a un nivel bajo de actividad en la SE 2. No se reportaron detecciones de influenza ni de VRS esta semana (Gráficos 1 y 2). A partir de la SE 39, el número de hospitalizaciones por IRAG ha tenido una tendencia al aumento y se ubicó a nivel de la curva epidémica promedio en la SE 3 (Gráfico 3).

Graph 1. Haiti: Influenza virus distribution EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza SE 3, 2015-20




Graph 2. Haiti: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2015-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2015-19)



Graph 3. Haiti: Number of SARI cases, EW 3, 2020 (compared to 2017-19)
 Número de casos de IRAG, SE 3 de 2020 (comparado con 2017-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Jamaica


- Influenza activity decreased to low levels of intensity. After peaking in EW 47, influenza activity has fluctuated with influenza A(H3N2) virus predominance up to EW 52. In recent weeks influenza A(H1N1)pdm09 virus predominated. During EW 3, few influenza detections (one sample) and no RSV detections were reported (Graphs 1, 2, and 3). The number of SARI hospitalizations/100 hospitalizations decreased as compared to previous weeks and was at interseasonal levels (Graph 4). The number of pneumonia and ARI cases remained below the average epidemic curve (Graph 5 and 6). / La actividad de influenza disminuyó a niveles bajos de intensidad. Después de un pico en la SE 47, la actividad de influenza ha fluctuado con el predominio del virus influenza A(H3N2) hasta la SE 52. El virus influenza A(H1N1)pdm09 predominó en semanas recientes. Durante la SE 3, se informaron pocas detecciones de influenza (una muestra) y ninguna detección del VRS (Gráficos 1, 2 y 3). El porcentaje de hospitalizaciones por IRAG/100 hospitalizaciones disminuyó en comparación con las semanas previas y se ubicó en niveles inter-estación (Gráfico 4). El número de casos de neumonía y el número de casos de IRA permanecieron por debajo del umbral estacional (Gráficos 5 y 6).

Graph 1. Jamaica: Influenza virus distribution,
 EW 3, 2015-20




Graph 3. Jamaica: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
 (compared to 2010-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
 (comparado con 2010-19)




Graph 2. Jamaica: Influenza and RSV virus distribution,
 EW 3, 2015-20



Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20



Graph 4. Jamaica: SARI hospitalizations/100 hospitalizations,
 EW 3, 2020 (compared to 2011-19)

Hospitalizaciones de IRAG/100 hospitalizaciones, SE 3 de 2020
 (comparado con 2011-19)






*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#)

Puerto Rico

- During EW 1, 2020, ILI activity continued elevated in Puerto Rico. Since EW 50, a downward trend of the number of influenza-positive cases has been observed and was below the average epidemic curve with co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses (Graph 1). The Caguas health region had the highest influenza incidence rate this week (Graph 2). The age group with the highest number of influenza laboratory-confirmed cases was 5-9 years of age (Graph 3). / Durante la SE 1 de 2020, la actividad de la ETI continuó elevada en Puerto Rico. Desde la SE 50 se ha observado una tendencia a la baja del número de casos positivos para influenza y se ubicó por debajo de la curva epidémica promedio con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) (Gráfico 1). Caguas fue la región de salud con la tasa de incidencia por influenza más alta esta semana (Gráfico 2) El grupo de edad con el mayor número de casos de influenza confirmados por laboratorio fue de 5-9 años (Gráfico 3).


Graph 1. Puerto Rico: Influenza-positive cases EW 1, 2019-20



Graph 2. Puerto Rico: Influenza incidence rates by municipality, EW 1, 2020



Graph 3. Puerto Rico: Number of cases positive for influenza by age group, EW 1, 2020




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Saint Lucia

- In recent months influenza A(H3N2) viruses have circulated; there were no detections reported during EW 3 (Graph 1). Among those aged < 5 years, the number of ILI cases increased and was at the seasonal threshold (Graph 2). ILI activity increased as well among those aged ≥ 5 years as compared to the previous week and was slightly above the alert threshold (Graph 3). The number of SARI cases remained the same in comparison to the previous week and was above the average epidemic curve for this period (Graph 4). The age groups most affected are the 1-4 years old with 50% of all SARI admissions and the ≥ 65 years old which account for 33%. During EW 1 to EW 3 2020, 2.3% of the admissions were SARI cases. / En los últimos meses han circulado los virus influenza A(H3N2); no se informaron detecciones durante la SE 3 (Gráfico 1). Entre los menores de 5 años, el número de casos de ETI aumentó y estuvo en el umbral estacional (Gráfico 2). La actividad por ETI también aumentó entre las personas de ≥ 5 años en comparación con la semana anterior y estuvo ligeramente por encima del umbral de alerta (Gráfico 3). El número de casos de IRAG permaneció similar a la semana anterior y se ubicó por encima de la curva epidémica promedio. Los grupos de edad más afectados son los 1-4 años con el 50% de todas las admisiones por IRAG y los ≥ 65 años que representan el 33%. De la SE 1 a la SE 3 de 2020, el 2,3% de los ingresos fueron casos de IRAG.


Graph 1. Saint Lucia: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 3, 2015-20




Graph 3. Saint Lucia: ILI case distribution among the ≥ 5 years of age, EW 3, 2016-20
Número de casos de ETI en los ≥ 5 años, SE 3, 2016-20



Graph 2. Saint Lucia: ILI case distribution by EW among the < 5 years of age, EW 3, 2016-20
Distribución de ETI por SE entre los <5 años, SE 3, 2016-20



Graph 4. Saint Lucia: Number of SARI cases, EW 3, 2020 (compared to 2015-19)
Número de casos de IRAG, SE 3 de 2020 (comparado con 2015-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Suriname

- During EW 3, 2020, few detections of influenza A(H1N1)pdm09 virus were reported (one sample). No RSV detections were reported. Influenza percent positivity increased in comparison to previous weeks (Graphs 1, 2, and 3). The number of ILI cases increased and was above the seasonal threshold at a low level of activity (Graph 4). The number of SARI hospitalizations per 100 hospitalizations slightly decreased in comparison to the previous week and continued at a low level of activity (Graph 5). / En la SE 3 de 2020, se notificaron pocas detecciones del virus influenza A(H1N1)pdm09 (una muestra). No se reportaron detecciones VRV esta semana. El porcentaje de positividad de influenza aumentó en comparación con las semanas previas (Gráficos 1, 2 y 3). El número de casos de ETI aumentó y estuvo por encima del umbral estacional en un nivel bajo de actividad (Gráfico 4). El número de hospitalizaciones por IRAG por cada 100 hospitalizaciones disminuyó ligeramente en comparación con la semana anterior y continuó en un nivel bajo de actividad (Gráfico 5).


Graph 1. Suriname: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 3, 2015-20




Graph 3. Suriname: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2015-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2015-19)




Graph 5. Suriname: SARI cases / 100 hospitalizations, EW 3, 2020 (compared to 2014-19)
Casos de IRAG por cada 100 hospitalizaciones, SE 3 de 2020 (comparado con 2014-19)



Graph 2. Suriname: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015 -20








Graph 4. Suriname: Number of ILI cases, EW 3, 2016-20
Número de casos de ETI, SE 3, 2016-20



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Central America / América Central**Costa Rica**

- During EW 3, 2020, influenza percent positivity appears to increase in comparison to previous weeks due to the small number of samples analyzed. Few detections of influenza were reported with influenza A(H1N1)pdm09 circulating (Graphs 1 and 3). RSV activity decreased with no detections this week (Graph 2). The number of SARI cases continued to decrease and was at interseasonal levels (Graph 4). ILI activity continued at a low level of activity in comparison to the previous week (Graph 5). / En la SE 3 de 2020, el porcentaje de positividad de influenza pareció aumentar debido al número pequeño de muestras analizadas, se reportaron pocas detecciones con la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1 y 3). La actividad del VRS disminuyó sin detecciones esta semana (Gráfico 2). El número de casos de IRAG continuó disminuyendo y se ubicó en niveles interestacionales (Gráfico 4). La actividad de la ETI continuó en niveles bajos de actividad en comparación con la semana previa (Gráfico 5).


Graph 1. Costa Rica: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20**Graph 3.** Costa Rica: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2011-19)**Graph 2.** Costa Rica: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20**Graph 4.** Costa Rica: Number of SARI cases, EW 3, 2020
(compared to 2013-19)**Graph 5.** Costa Rica: Number of ILI cases, EW 3, 2020
Número de casos de ETI, SE 3 de 2020

*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


El Salvador

- During EW 3, 2020, no influenza detections were reported with influenza A viruses circulating in previous weeks; few RSV detections were reported with adenovirus co-circulating (Graphs 1, 2, 3, and 4). / En la SE 3 de 2020, no se reportaron detecciones de influenza con la circulación de los virus influenza A en semanas previas; se reportaron pocas detecciones de VRS con la circulación concurrente de adenovirus (Gráficos 1, 2, 3 y 4).


Graph 1. El Salvador: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 3, 2015-20




Graph 3. El Salvador: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020 (comparación 2010-19)



Graph 2. El Salvador: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20



Graph 4. El Salvador: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 3, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios, SE 3, 2015-20




*To view more epi data, [view here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Guatemala

- Overall, influenza activity has decreased, with no influenza detections reported in previous weeks; influenza A(H1N1)pdm09 viruses predominated in recent weeks. No RSV detections were reported (Graphs 1, 2, and 3). In EW 52, the number of SARI cases among all hospitalizations, and the number of pneumonia, and ARI cases decreased in comparison to the previous week and were below the seasonal threshold (Graphs 4, 5 and 6). / En general, la actividad de influenza ha disminuido, sin detecciones de influenza reportadas en semanas previas; predominó el virus influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes. No se informaron detecciones de VRS (Gráficos 1, 2 y 3). En la SE 52, el número de casos de IRAG entre todas las hospitalizaciones, el número de casos de neumonía e IRA disminuyeron en comparación con la semana anterior y estuvieron por debajo del umbral estacional (Gráficos 4, 5 y 6).


Graph 1. Guatemala: Influenza virus distribution, EW 2, 2015-20
Distribución de influenza, SE 2, 2015-20



Graph 2. Guatemala: Influenza and RSV distribution, EW 2, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 2, 2015-20




Graph 3. Guatemala: Percentage positivity for influenza,
EW 2, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 2 de 2020
(comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Honduras


- Since EW 51, 2019 no influenza detections have been reported. Influenza B, influenza A(H3N2), and influenza A(H1N1)pdm09 co-circulated in December. No RSV detections have been reported during the last four weeks (Graphs 1, 2 and 3). / Desde la SE 51 de 2019, no se han reportado detecciones influenza. En diciembre circularon concurrentemente los virus influenza B, A(H3N2) y A(H1N1)pdm09. No se han reportado detecciones de VRS en las últimas cuatro semanas (Gráficos 1, 2 y 3).



Graph 2. Honduras: Influenza and RSV distribution from sentinel surveillance, EW 3, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20





Graph 3. Honduras: Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance, EW 3, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 3 de 2020 (comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Nicaragua

- During EW 1- EW 3, 2020 influenza activity slightly increased and was at a low level of intensity with influenza B, A(H1N1)pdm09 and A(H3N2) viruses co-circulating. Few RSV detections (one sample) were reported this week (Graphs 1, 2 and 3) with parainfluenza and adenovirus co-circulating. / De la SE 1 a la SE 3, la actividad de influenza 2020 aumentó ligeramente y se ubicó a un nivel bajo de intensidad, con la circulación concurrente de los virus influenza B, A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). Pocas detecciones de VRS (una muestra) se informaron esta semana (Gráficos 1, 2 y 3) con la circulación concurrente de parainfluenza y adenovirus.



Graph 3. Nicaragua : Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance; EW 3, 2020 (compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza de la vigilancia centinela;
SE 3 de 2020 (comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Panama

- Influenza activity appears to have increased due to the small number of samples analyzed, with influenza B/Victoria viruses circulating this week (Graph 1 and 3). RSV percentage of positivity slightly decreased as compared to the previous week and was within levels observed in previous seasons; no detections were reported this week, (Graph 2) with rhinovirus, metapneumovirus and coronavirus co-circulating (Graph 4). / La actividad de la influenza parece aumentar debido al pequeño número de muestras analizadas, con los virus de influenza B / Victoria circulando esta semana (Gráficos 1 y 3). El porcentaje de positividad del VSR disminuyó levemente en comparación con la semana anterior y estuvo dentro de los niveles observados en temporadas anteriores, sin detecciones reportadas esta semana (Gráfico 2) con la circulación concurrente de rinovirus, metapneumovirus y coronavirus (Gráfico 4).

Graph 1. Panama: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución virus de influenza, SE 3, 2015-20




Graph 3. Panama: Percent positivity for influenza, from sentinel surveillance, EW 3, 2020 (compared to 2010-19)
 Porcentaje de positividad de influenza, de la vigilancia centinela, SE 3 de 2020 (comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea aquí.

Graph 2. Panama: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, EW 3, 2015-20






Graph 4. Panama: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 3, 2015-20



Bolivia

- During EW 3, 2020, influenza percent positivity decreased with few influenza detections reported and influenza B/Victoria viruses circulating. Few RSV detections were reported (Graphs 1, 2, and 3). SARI cases slightly decreased this week in comparison to the previous one and were at the average epidemic curve (Graph 4) / Durante la SE 3 de 2020, el porcentaje de positividad de influenza disminuyó con pocas detecciones de VRS (Gráficos 1, 2 y 3). Los casos de IRAG disminuyeron ligeramente esta semana en comparación con la anterior y se ubicaron en la curva epidémica promedio (Gráfico 4)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Colombia


- After a second peak in EW 49, 2019, influenza activity decreased, with influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and influenza B viruses co-circulating during EW 3, 2020 (Graphs 1 and 3). Increased RSV detections were reported (Graph 2) with parainfluenza, metapneumovirus and adenovirus co-circulating. In EW 3, influenza transmissibility, represented by the composite of ARI cases and influenza positivity, remained at low levels of intensity, above the average curve (Graph 3). Throughout the 2019-2020 season, SARI case counts, pneumonia-related hospitalizations, and the number of ARI cases continued lower than the average seasonal levels (Graphs 4, 5 and 6). / Después de un segundo pico en la SE 49 de 2019, la actividad de la influenza disminuyó, con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e influenza B durante la SE 3 de 2020 (Gráficos 1 y 3). Se informaron mayores detecciones de VRS (Gráfico 2) con la circulación conjunta de parainfluenza, metapneumovirus y adenovirus. En la SE 3, la transmisibilidad de la influenza representada por la combinación de los casos de IRA y el porcentaje de positividad de la influenza se mantuvo en niveles

bajos de intensidad por encima de la curva promedio (Gráfico 3). A lo largo de la temporada 2019-2020, el recuento de casos de IRAG, las hospitalizaciones relacionadas con la neumonía y el número de casos de IRA continuaron por debajo de los niveles estacionales promedio (Gráficos 4, 5 y 6).

Graph 1. Colombia: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza, SE 3, 2015-20




Graph 2. Colombia: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20




Graph 3. Colombia: Composite ARI cases x Percent positivity for influenza, EW 3, 2020 (compared to 2012-19)
Producto de casos de IRA x Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020 (comparado con 2012-19)




Graph 4. Colombia: Number of SARI cases, EW 3, 2020 (compared to 2013-19)
Número de casos de IRAG, SE 3 de 2020 (comparado con 2013-19)



Graph 5. Colombia: Number of pneumonia-related hospitalizations, EW 3, 2020 (compared to 2012-19)
Número de hospitalizaciones asociadas a neumonía, SE 3 de 2020 (comparado con 2012-19)



Graph 6. Colombia: Number of ARI cases (from all consultations) EW 3, 2020 (compared to 2012-19)
Número de casos de IRA, (de todas consultas) SE 3 de 2020 (comparado con 2012-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Ecuador

- During EW 2, 2020, influenza detections decreased in comparison to the previous week, with influenza A(H1N1)pdm09 predominance and influenza A(H3N2) co-circulating. The influenza percent positivity decreased for EW 2 (Graphs 1 and 3). No RSV detections were reported this week (Graphs 1 y, 2). / En la SE 2 de 2020, las detecciones de influenza disminuyeron en comparación con la semana previa, con la predominancia del virus influenza A(H1N1)pdm09 y la circulación concurrente de influenza A(H3N2). El porcentaje de positividad disminuyó para la SE 2 (Gráfico 3). No se reportaron detecciones de VRS esta semana (Gráficos 1 y, 2).

Graph 1. Ecuador: Influenza virus distribution from SARI sentinel cases, EW 2, 2015-20
Distribución de virus influenza de casos de IRAG centinela SE 2, 2015-20




Graph 2. Ecuador: Influenza and RSV distribution from SARI sentinel cases, EW 2, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS de casos de IRAG centinela, SE 2, 2015-20





Graph 3. Ecuador: Percent positivity for influenza, EW 2, 2020
(in comparison to 2011-19)

Porcentaje de positividad de influenza, SE 2 de 2020
(comparado con 2011-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

- During EW 3, 2020, influenza detections increased in comparison to the previous week with influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), and B/Victoria viruses circulating (Graph 1). Influenza percent positivity remained at similar levels to the previous week and continued below the average epidemic curve (Graphs 1 and 3). Increased detections of RSV were reported (Graph 2). / En la SE 3, las detecciones de influenza aumentaron en comparación con la semana anterior con la circulación de los virus influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B/Victoria (Gráfico 1). El porcentaje de positividad de influenza permaneció en niveles similares de la semana previa y continuó por debajo de la curva epidémica promedio (Gráficos 1 y 3). Se informaron detecciones de VRS aumentadas (Gráfico 2).




Graph 3. Peru: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2010-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Venezuela


- From EW 49, 2019 to EW 3, 2020, low influenza activity was reported. Since EW 44 no influenza detections have been reported, with influenza A(H3N2) and influenza B/Victoria co-circulating in previous weeks (Graph 1). No RSV detections have been reported since EW 36, 2019 (Graph 2). In EW 38, the percent positivity for influenza increased at a moderate level of intensity, decreasing in the following weeks to interseasonal levels (Graph 3). / Desde la SE 49 de 2019 hasta la SE 3 de 2020, se ha reportado actividad baja de influenza. Desde la SE 44 no se han reportado detecciones de influenza, con la circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2) e influenza B/Victoria en las semanas previas (Gráfico 1). No se han reportado detecciones de VRS desde la SE 36 de 2019 (Gráfico 2). En la SE 38, el porcentaje de positividad aumentó a un nivel moderado de intensidad para disminuir en las semanas siguientes a niveles interestacionales (Gráfico 3).



Graph 2. Venezuela: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20



Graph 3. Venezuela: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, EW 3 de 2020
(comparado con 2010-19)





*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aqui](#)


South America / América del Sur – South Cone and Brazil / Cono sur y Brasil

Brazil

- During EW 3, few influenza detections were reported, with influenza A(H1N1)pdm09 and B co-circulating in recent weeks; influenza percent positivity decreased in comparison to the previous week and was at very low levels of activity (Graphs 1 and 3). No RSV detections were reported in EW 3 (Graph 2). / En la SE 3, se informaron pocas detecciones de influenza, con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B en semanas previas; el porcentaje de positividad de influenza disminuyó en comparación con la semana anterior y estuvo en un nivel muy bajo de actividad (Gráficos 1 y 3). No se informaron detecciones de VRS en la SE 3 (Gráfico 2).



Graph 3. Brazil: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2011-18)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2011-18)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Chile

- During EW 3, 2020, influenza activity continued at a very low level with influenza B and A(H1N1)pdm09 viruses co-circulating (Graphs 1 and 3). RSV activity was low with few detections reported this week (Graph 2), and adenovirus, parainfluenza, and metapneumovirus co-circulating. During EW 3, ILI visits and SARI cases continued to decrease and were below the average curve (Graphs 4 and 5). / En la SE 3 de 2020, la actividad de influenza continuó en niveles muy bajos con la circulación concurrente de los virus influenza B y A(H1N1)pdm09 (Gráficos 1 y 3). La actividad del VRS estuvo baja con pocas detecciones reportadas esta semana (Gráfico 2) y la circulación concurrente de los virus adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus. Durante la SE 3, las visitas por ETI y los casos de IRAG continuaron disminuyendo y estuvieron por debajo de la curva promedio (Gráficos 4 y 5).


Graph 1. Chile: Influenza virus distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de virus de influenza, SE 3, 2015-20



Graph 2. Chile: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20




Graph 3. Chile: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza,
SE 3 de 2020 (comparado con 2010-19)




Graph 4. Chile: Number of ILI visits in hospital ER,
EW 3, 2020 (compared to 2015-19)

Número de consultas por ETI en urgencias hospitalarias,
SE 3 de 2020 (comparado con 2015-19)



Graph 5. Chile: Number of SARI cases, EW 3, 2020
(compared to 2015-19)
Número de casos de IRAG, SE 3 de 2020
(comparado con 2015-19)




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).


Paraguay

- During EW 3, 2020, the number of influenza detections slightly decreased in comparison to the previous week with influenza B virus circulating; influenza percent positivity decreased and was at the seasonal threshold (Graphs 1 and 3). Few RSV detections (one sample) were reported this week (Graphs 2 and 4). / En la SE 3 de 2020, el número de detecciones de influenza disminuyó ligeramente en comparación con la semana anterior con la circulación del virus influenza B; el porcentaje de positividad de la influenza disminuyó y estuvo en el umbral estacional (Gráficos 1 y 3). Se reportaron pocas detecciones (una muestra) de VRS esta semana (Gráficos 2 y 4).


Graph 1. Paraguay: Influenza virus distribution EW 3, 2015-20
Distribución de virus de influenza, SE 3, 2015-20




Graph 2. Paraguay: Influenza and RSV distribution, EW 3, 2015-20
Distribución de los virus influenza y VRS, SE 3, 2015-20



Graph 3. Paraguay: Baseline for the percent positivity for influenza, EW 3, 2020 (in comparison to 2011-19)
Línea basal para el porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020 (comparado con 2011-19)





Graph 4. Paraguay: RSV and other respiratory viruses distribution, EW 3, 2015-20
Distribución del VRS y otros virus respiratorios SE 3, 2015-20




*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

Uruguay

- During EW 3, 2020, few influenza detections were reported with influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B/Victoria viruses detected in recent weeks (Graphs 1 and 3). In EW 3, no RSV detections were reported (Graph 2). As of EW 48, the number of SARI cases decreased in comparison to previous weeks and was at interseasonal levels. / Durante la SE 3 de 2020, se reportaron escasas detecciones de influenza con la detección del virus influenza A(H1N1)pdm09 y B/Victoria en semanas previas (Gráficos 1 y 3). En la SE 3 no se reportaron detecciones de VRS (Gráfico 2). Hasta la SE 48 de 2019, el número de casos de IRAG disminuyó en comparación con las semanas previas y se ubicó en niveles interestacionales.



Graph 3. Uruguay: Percent positivity for influenza, EW 3, 2020
(compared to 2010-19)
Porcentaje de positividad de influenza, SE 3 de 2020
(comparado con 2010-19)



*To view more epi data, view [here](#). / Para ver más datos epi, vea [aquí](#).

ACRONYMS

ARI	Acute Respiratory Infection
CARPHA	Caribbean Public Health Agency
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
EW	Epidemiological Week
ILI	Influenza-like illness
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
ORV	Other respiratory viruses
SARI	Severe acute respiratory infection
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
ICU	Intensive Care Unit
RSV	Respiratory Syncytial Virus

ACRÓNIMOS

CARPHA	Agencia de Salud Pública del Caribe
CENETROP	Centro de Enfermedades Tropicales (Santa Cruz, Bolivia)
ETI	Enfermedad Tipo influenza
INLASA	Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (La Paz, Bolivia)
INS	Instituto Nacional de Salud
IRA	Infección Respiratoria Aguda
IRAG	Infección Respiratoria Aguda grave
OVR	Otros virus respiratorios
SE	Semana epidemiológica
SEDES	Servicio Departamental de Salud (Bolivia)
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
VRS	Virus Respiratorio Sincitial