

ESQUISTOSOMIASIS



+ Meta de impacto

Interrupción de la transmisión

+ Meta de eliminación

Cero casos nuevos autóctonos por cinco años consecutivos

+ Meta programática

≥75% de cobertura de administración masiva de medicamentos (AMM) con praziquantel en las poblaciones elegibles

Acciones para lograr la eliminación

Mejores inversiones

① Implementar la administración masiva de medicamentos:

- Garantizar al menos un 75% de cobertura de AMM en los grupos poblacionales en riesgo

② Implementar medidas de agua, saneamiento e higiene (WASH):

- Ampliar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene para prevenir la reinfección

③ Ir a la raíz del problema:

- Ampliar el control eficaz de los caracoles mediante el uso de molusquicidas y el manejo ambiental, con el fin de eliminar la infección en los caracoles hospedadores intermediarios, conforme a la legislación local y determinado mediante pruebas moleculares

④ Escalamiento integrado:

- Articular las intervenciones contra la esquistosomiasis con programas de WASH, enfermedades tropicales desatendidas y la atención primaria de salud

⑤ Continuar la vigilancia posterior a la AMM:

- Continuar la vigilancia activa para monitorear la eliminación en zonas anteriormente endémicas

Más información

- Organización Mundial de la Salud. Assessing schistosomiasis and soil-transmitted helminthiases control programmes: Monitoring and evaluation framework. Ginebra: OMS; 2024.
Disponible en: <https://www.who.int/publications/item/9789240099364>.



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas