

TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL DEL VIH, LA SÍFILIS, LA HEPATITIS B Y LA ENFERMEDAD DE CHAGAS (ETMI-PLUS)



+ Meta de impacto

Eliminación como problema de salud pública

+ Metas de eliminación

≤2% de prevalencia de la transmisión materno infantil del VIH
≤0,5 de incidencia de sífilis congénita por 1000 nacidos vivos
≤0,1% de prevalencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en la población infantil de 4 a 6 años
≥90% de recién nacidos con infección por *T. cruzi* curados

+ Metas programáticas

≥95% de los recién nacidos de madres positivas para *T. cruzi* con diagnóstico y tratamiento etiológico oportuno

≥95% de cobertura de pruebas de detección del VIH y la sífilis, y ≥90% de cobertura de pruebas de detección de la hepatitis B y la enfermedad de Chagas en embarazadas
≥95% de las embarazadas tratadas oportunamente para la infección por el VIH y la sífilis
≥95% de cobertura de la vacunación oportuna contra la hepatitis B al nacer, en las primeras 24 horas de vida y con un esquema completo de 3 dosis

Medidas para lograr la eliminación

1 Tamizar y realizar pruebas:

- Pruebas para la infección por el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas durante la atención prenatal rutinaria en los países endémicos
- Uso de pruebas de detección de múltiples enfermedades en el punto de atención (por ejemplo, la prueba dual para la infección por el VIH y la sífilis)

3 Atención posnatal:

- Monitorear las madres y los recién nacidos para confirmar el diagnóstico, garantizar la adhesión al tratamiento y lograr la curación de la sífilis y la enfermedad de Chagas
- Garantizar el tratamiento y la atención a largo plazo para las madres seropositivas para el VIH y el virus de hepatitis B (VHB)

Mejores inversiones

2 Empoderar mediante consejería:

- Educar a las madres y sus parejas para reducir el riesgo de transmisión y garantizar el tratamiento oportuno

4 Diagnosticar y tratar oportunamente:

- Infección por el HIV:** Administrar tratamiento antirretroviral a las embarazadas seropositivas para el VIH y profilaxis posterior a la exposición a los recién nacidos
- Sífilis:** Tratar con penicilina a las embarazadas con sífilis para prevenir la sífilis congénita
- Hepatitis B:** Vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos en las primeras 24 horas de vida y garantizar la aplicación de un esquema completo de 3 dosis
- Enfermedad de Chagas:** Realizar pruebas, confirmar el diagnóstico y tratar a las madres y los recién nacidos lo antes posible

Más información

- Organización Panamericana de la Salud. Orientaciones mundiales sobre los criterios y procesos para la validación de la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis y el virus de la hepatitis B. Washington D.C.: OPS; 2022. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56219>.
- Organización Mundial de la Salud. Elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B. Ginebra: OMS; 2024 [consultado el 10 de abril del 2025]. Disponible en: <https://who.int/initiatives/triple-elimination-initiative-of-mother-to-child-transmission-of-hiv-syphilis-and-hepatitis-b>.
- Organización Panamericana de la Salud. ETMI Plus Marco para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas. Washington, D.C.: OPS; 2017. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34306/OPSCHA17009-spa.pdf>.



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

