

# FILARIASIS LINFÁTICA



## + Meta de impacto

Eliminación como problema de salud pública

## + Meta de eliminación

<1% de prevalencia de microfilaremia o <1% de prevalencia de antigenemia en personas ≥20 años

## + Metas programáticas

≥65% de cobertura de administración masiva de medicamentos (AMM) utilizando medicación doble (dietilcarbamazina y albendazol [DA]) o triple (ivermectina, dietilcarbamazina y albendazol [IDA]) en toda la población en cada zona endémica

100% de cobertura geográfica de los servicios de manejo de la morbilidad y prevención de la discapacidad en todas las zonas donde se sabe que hay pacientes

## Acciones para lograr la eliminación

### 1 Detener la transmisión mediante:

- Implementar la AMM anualmente en el 100% de todas las unidades endémicas para lograr una cobertura efectiva de los medicamentos (≥65%) en toda la población: ≥5 rondas si se usa DA o 2 rondas si se usa IDA
- Evaluar el impacto mediante análisis de sangre en lugares centinela y de control seleccionados, seguidos de encuestas de evaluación de la transmisión o de impacto del uso de IDA

### 2 Control de vectores:

- Combinar la fumigación con insecticidas residuales y el uso de mosquiteros para suprimir de manera eficaz la población de vectores

## Mejores inversiones

### 3 Reducir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida:

- Evaluar la carga de enfermedad para estimar el número de pacientes con linfedema e hidrocele por unidad endémica
- Alcanzar una cobertura geográfica del 100% para garantizar la disponibilidad de servicios de manejo de la morbilidad y prevención de la discapacidad y proporcionar el paquete esencial de atención en todos los distritos donde se sabe que hay pacientes

### 4 Vigilancia posterior a la AMM:

- Continuar la vigilancia activa para dar seguimiento a la eliminación en zonas antes endémicas

## Más información

• Organización Mundial de la Salud. Monitoring and epidemiological assessment of mass drug administration in the global programme to eliminate lymphatic filariasis: A manual for national elimination programmes. Ginebra: OMS; 2011. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/44580>.

• Organización Mundial de la Salud. Guideline: Alternative mass drug administration regimens to eliminate lymphatic filariasis. Ginebra: OMS; 2017. Disponible en: <https://who.int/publications/i/item/9789241550161>.



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

**OPS**

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud  
Región de las Américas