

ONCOCERCOSIS



+ Meta de impacto

Eliminación de la transmisión

+ Metas de eliminación

- <0.1% de prevalencia de moscas infecciosas
- <0.1% de seroprevalencia de la oncocercosis en menores de 10 años

+ Metas programáticas

≥85% de cobertura de administración masiva de medicamentos (AMM) con ivermectina en los grupos poblaciones que cumplen con los criterios establecidos

Acciones para lograr la eliminación

1 Detener la transmisión:

- Aplicar la AMM con ivermectina a la población que vive en zonas de transmisión (preferiblemente dos veces al año en las zonas de alta transmisión) al menos durante 12-15 años

2 Control de vectores:

- Reducir la población de moscas negras (cuando sea factible) mediante la gestión ambiental

Mejores inversiones

3 Vigilancia:

- Realizar un seguimiento entomológico (infección por mosca negra) y serológico (pruebas basadas en la comunidad)

4 Participación comunitaria:

- Asegurarse de que la comunidad esté a cargo de la distribución y el cumplimiento para lograr una alta cobertura de la AMM

5 Vigilancia posterior a la AMM:

- Continuar con la vigilancia activa para dar seguimiento a la eliminación en las zonas donde la enfermedad era endémica

· Organización Panamericana de la Salud. Oncocercosis (ceguera de los ríos). Washington, D.C.: OPS; 2025 [consultado el 18 de abril del 2025].

Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/oncocercosis-ceguera-rios>.

· Organización Mundial de la Salud. Guidelines for stopping mass drug administration and verifying elimination of human onchocerciasis: criteria and procedures. Ginebra: OMS; 2016.

Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/204180/9789241510011_eng.pdf.

Más información



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

OPS

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas