

SARAMPIÓN Y RUBÉOLA



+ Meta de impacto

Mantenimiento de la **eliminación** de la transmisión

+ Metas programáticas

Acciones para mantener la eliminación

1 Vacunar para proteger:

- Mantener una cobertura $\geq 95\%$ de SRP1 y SRP2 mediante la inmunización de rutina
- Realizar campañas de seguimiento del sarampión y la rubéola si los susceptibles superan el 80% de la cohorte de nacimiento más reciente
- Llevar a cabo actividades de inmunización complementarias en zonas de baja cobertura, brotes o grupos de alto riesgo (por ejemplo, trabajadores del sector turístico)

2 Preparación y respuesta frente a los brotes:

- Respuesta rápida con investigación de los casos, rastreo de contactos, vacunación de los grupos de riesgo, aislamiento de los casos con control de la infección y vacunación selectiva (en anillo o masiva)

Más información

- Organización Panamericana de la Salud. Marco regional para el seguimiento y la reverificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2022. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56039>.
- Organización Panamericana de la Salud. Orientaciones para la búsqueda activa de casos de parálisis flácida aguda, sarampión y rubéola. Versión revisada. Washington, D.C.: OPS; 2025. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/65623>.
- Organización Mundial de la Salud. Measles and rubella strategic framework: 2021–2030. Ginebra: OMS; 2020. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/339801>.



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas