



Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2025–35

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of September 5 2025/
Datos hasta el 5 de Septiembre de 2025



Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Subregional NAM
Data sources	CAN
Method.Note ENG	MEX
Method.Note ESP	USA
Summary/Resumen ENG	USA 2
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP	BLZ
Summary/Resumen ESP 2	CUB
Regional INF	DOM
Regional INF 4 EW/SE	HTI
Regional RSV	JAM
Regional SC-2	LCA
Regional ORV	SUR
Regional SARI-IRAG	BRB
% Positivity/%Positividad	CYM
Regional ILI- ETI	GUY
Subregional NAM	GUY 2
Subregional CAR.	VCT
Subregional CAM.	Subregional CAM.
Subregional AND.	SLV
Subregional BSC.	GTM
	GTM 2
	HND
	HND 2
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>



Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-prevention-and-control/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).



Regional Situation: Influenza activity in the Americas remains low. SARS-CoV-2 activity has shown an increase in recent epidemiological weeks (EW). At the regional level, RSV circulation shows a downward trend. In North America, influenza activity remains at interseasonal levels. In the Caribbean, circulation is decreasing, with a positivity rate of 8.5%. Subtype A(H1N1)pdm09 continues to be the predominant strain. RSV activity remains low and stable in North America, while in the Caribbean it is decreasing, reaching a positivity rate of 4.9% in the latest EW. SARS-CoV-2 activity is increasing in North America and the Caribbean, where positivity rates reached 6.6% and 19.8%, respectively. In Central America, influenza activity continues to decline, with a positivity rate of 6.5%. SARS-CoV-2 activity remains stable this week, with a positivity rate of 5.7%, while RSV decreased this EW to a positivity rate of 14.9%. In the Andean subregion, influenza A activity continues its downward trend, with a positivity rate of 5.4%. RSV activity decreased to a positivity rate of 8.8%, while SARS-CoV-2 circulation increased slightly compared to the previous week, reaching a positivity rate of 6.4%. In Brazil and the Southern Cone, influenza activity continues to decline, with a positivity rate of 2.8%. RSV circulation decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 11.7%, while SARS-CoV-2 activity remains at low levels but shows an upward trend. Circulation of other respiratory viruses (ORVs) is elevated and shows an upward trend in most subregions. The Brazil and Southern Cone subregion stands out with detections of Rhinovirus, Parainfluenza, and Metapneumovirus.

North America: Influenza activity remains low in the subregion, with a positivity rate of 0.5%, and continues at interseasonal levels in Mexico, Canada, and the United States. Most positive SARI cases have been associated with influenza and SARS-CoV-2. RSV activity remains low and stable across all countries in the subregion. SARS-CoV-2 activity is increasing in the subregion, with a positivity rate of 6.6%. In the United States, it reaches 11%, in Canada 6.5%, and in Mexico 9.6%. All countries in the subregion maintain an upward trend.

Caribbean: Influenza activity, primarily driven by A(H1N1)pdm09, decreased in the latest EW, with a subregional positivity rate of 8.5%. In Haiti, Belize, and Saint Lucia, influenza activity remains at epidemic levels but shows a downward trend. In contrast, in Cuba, Jamaica, Suriname, and the Dominican Republic, it remains at interseasonal levels. In Barbados and the Cayman Islands, influenza activity remains low. In Guyana, activity increased compared to the previous EW, with a positivity rate of 9.6%. RSV circulation in the subregion decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 4.9%. In Cuba, the Dominican Republic, the Cayman Islands, and Saint Vincent and the Grenadines, circulation decreased compared to the previous EW. In Guyana, circulation increased compared to the previous EW. SARS-CoV-2 activity increased this EW compared to the previous one, with a subregional positivity rate of 19.8%. In Belize, Haiti, the Dominican Republic, Jamaica, Guyana, and Saint Vincent and the Grenadines, activity decreased. In Cuba, Saint Lucia, Barbados, and the Cayman Islands, positivity increased.

Central America: Influenza activity is decreasing in the subregion, characterized by the concurrent circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B/Victoria, which account for the majority of reported ILI cases. The current positivity rate is 6.5%. RSV circulation remains elevated, with a downward trend, reflected in the detection of SARI cases, and a positivity rate of 14.9%. SARS-CoV-2 activity remained stable this week, reaching a positivity rate of 5.7%.

By Country:

- **El Salvador:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity has decreased to interseasonal levels, with a positivity rate of 3.1%. SARS-CoV-2 activity has slightly decreased compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 15.6%. RSV activity increased this EW, remaining at high levels and reaching a positivity rate of 37.1%.
- **Guatemala:** Influenza activity, primarily driven by A(H1N1)pdm09, continues its downward trend, with a positivity rate of 4.5%. RSV circulation remains low, with a decreasing trend and a positivity rate of 3.6%. SARS-CoV-2 activity remained stable this EW, with a positivity rate of 5%. SARI cases are mainly attributed to RSV.
- **Honduras:** Influenza activity, primarily driven by A(H1N1)pdm09, decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 1.8%. RSV circulation decreased this week, presenting a positivity rate of 22%. Lastly, SARS-CoV-2 increased to a positivity rate of 8.9%. Most SARI cases are associated with RSV and SARS-CoV-2. For ILI cases, influenza represents a significant proportion.
- **Panama:** Influenza activity increased during the latest EW, presenting a positivity rate of 10.3%, mainly associated with influenza B/Victoria. Most SARI cases are associated with influenza. SARS-CoV-2 decreased compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 3.5%. RSV remained stable compared to the previous EW, with a positivity rate of 12%. Most ILI cases are associated with SARS-CoV-2.

Continues on the next page





Andean Subregion: Influenza activity decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 5.4%, primarily associated with the circulation of A(H1N1)pdm09. RSV circulation is declining, presenting a positivity rate of 8.9%. SARS-CoV-2 activity is increasing, reaching a positivity rate of 6.4%. SARI cases associated with influenza show a downward trend, and the most frequently identified virus is RSV. For ILI cases, there is an increase in the proportion associated with RSV and a decrease in those linked to influenza.

By Country:

- **Bolivia:** Influenza B activity remains at interseasonal levels, while RSV circulation is decreasing, yet continues to account for a significant proportion of SARI cases.
- **Colombia:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity decreased in the latest EW, with a current positivity rate of 4.2%, remaining at interseasonal levels. SARS-CoV-2-associated cases increased over the past week, reaching a positivity rate of 7.8%, while RSV activity remains high, with a downward trend and a positivity rate of 9.9%. RSV is present in most SARI cases, while influenza predominates among ILI cases.
- **Ecuador:** Influenza activity remains at epidemic levels but has decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 6.1%. RSV circulation remains low, with a positivity rate of 1.2%. SARS-CoV-2 activity continues to rise, reaching a positivity rate of 14%. SARI cases are primarily attributed to influenza.
- **Peru:** Influenza circulation has increased in recent EWs, presenting a positivity rate of 7.6% and remaining at interseasonal levels. RSV circulation decreased in the latest EW to 8.1%, and SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. The majority of SARI cases are associated with RSV.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity in the subregion, primarily driven by influenza A, continues its downward trend, with a positivity rate of 2.8%. RSV circulation remains high but decreased in the last week, with a positivity rate of 11.7%. SARS-CoV-2 activity remains at low levels; however, it is beginning to show an upward trend, with a positivity rate of 3.7%. Detection of SARI cases has shown a consistent downward trend in recent weeks, mainly associated with RSV.

By Country:

- **Argentina:** Influenza circulation has decreased to interseasonal levels. RSV activity increased in the latest EW, with a positivity rate of 29.9%, while SARS-CoV-2 activity remains low but shows a slight upward trend.
- **Brazil:** Influenza, with concurrent circulation of influenza A(H3N2) and influenza B, continues to decline, with a positivity rate of 1.8%, remaining below the epidemic threshold. RSV circulation remains low, while SARS-CoV-2 increased to a positivity rate of 5.9%. SARI cases remain below moderate levels, with most cases associated with RSV, followed by SARS-CoV-2.
- **Chile:** Influenza activity has remained stable in recent weeks, with a positivity rate of 5.8%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable, while RSV circulation remains high but is decreasing compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 22.3%. The majority of ILI and SARI cases are associated with RSV.
- **Paraguay:** Influenza activity continues to decline, with most cases attributed to influenza B and a positivity rate of 2.6%. ILI cases remain below the epidemic threshold. RSV activity decreased in the latest EW, reaching a positivity rate of 17.7%, reflected in SARI case detection. SARS-CoV-2 circulation remains low but shows an upward trend.
- **Uruguay:** Circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B/Victoria remains below the seasonal threshold this EW, with a positivity rate of 6.9%. SARI cases have decreased to epidemic levels, mainly associated with RSV. RSV circulation decreased to a positivity rate of 33.5%, and SARS-CoV-2 activity remains low and stable.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](#).



Situación Regional: La actividad de influenza en las Américas se mantiene baja. La actividad de SARS-CoV-2 muestra un incremento en las últimas semanas epidemiológicas (SE). Para VSR la circulación a nivel regional muestra una tendencia descendente. En América del Norte, la actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales. En el Caribe, la circulación disminuye presentando una positividad de 8.5%. El subtipo A(H1N1)pdm09 continúa siendo el predominante. La actividad del VSR se mantiene baja y estable en América del Norte, mientras que en el Caribe disminuye alcanzando una positividad del 4.9% en la última SE. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta en América del Norte y el Caribe, donde la positividad alcanzó un 6.6% y un 19.8% respectivamente. En Centroamérica, la actividad de influenza mantiene una tendencia al descenso, con una positividad del 6.5%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene esta semana con una positividad del 5.7%, mientras que VSR disminuye esta SE a una positividad del 14.9%. En la subregión andina, la actividad de influenza A continúa su tendencia a la disminución con una positividad del 5.4%. La actividad del VSR disminuye a una positividad del 8.8%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 aumenta levemente en comparación a la última semana, con una positividad del 6.4%. En Brasil y el Cono Sur, la actividad de influenza continúa disminuyendo, con una positividad del 2.8%. La circulación del VSR disminuye con respecto a la SE anterior, con una positividad del 11.7%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos, pero con una tendencia al aumento. La circulación de otros virus respiratorios (OVR) presenta niveles elevados y con una tendencia ascendente en la mayoría de las subregiones. Destaca la subregión de Brasil y el cono sur con detección de Rinovirus, Parainfluenza y Metapneumovirus.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene baja en la subregión, con una positividad de 0.5%, y se mantiene en niveles interestacionales en México, Canadá y Estados Unidos. La mayoría de los casos SARI positivos se han asociado con influenza y SARS-CoV-2. La actividad del VSR sigue siendo baja y estable en todos los países de la subregión. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta en la subregión con una positividad del 6.6%. En Estados Unidos alcanza un 11%, Canadá un 6.5% y México un 9.6%. Todos los países de la subregión mantienen una tendencia al ascenso.

Caribe: La actividad de influenza, impulsada principalmente por A(H1N1)pdm09, disminuye en la última SE, con una tasa de positividad subregional de 8.5%. En Haití, Belice, Santa Lucía la actividad de influenza continúa en niveles epidémicos, pero con tendencia a la disminución. En contraste, en Cuba, Jamaica, Surinam y República Dominicana se mantiene en niveles interestacionales. En Barbados y Las Islas Caimán la actividad de influenza se mantiene baja. En Guyana, la actividad aumenta respecto de la SE anterior con una positividad del 9.6%. La circulación del VSR en la subregión disminuye con respecto a la SE anterior, con una positividad del 4.9%. En Cuba, República Dominicana, Islas Caimán, San Vincent y las granadinas la circulación disminuye en comparación a la SE anterior. En Guyana la circulación aumenta la circulación en comparación a la SE anterior. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta esta SE con respecto a la anterior, presentando positividad subregional de 19.8%. En Belice, Haití, República Dominicana, Jamaica, Guyana y San Vincent y las granadinas la actividad disminuyó. En Cuba, Santa Lucía, Barbados e Islas Caimán, la positividad aumentó.

Centroamérica: La actividad de influenza disminuye su circulación en la subregión, caracterizada por la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria, que representa la mayoría de los casos notificados de ILI. La positividad actual es del 6.5%. La circulación del VSR se mantiene elevada, y con tendencia a la disminución, con una positividad del 14.9%, y que se ve reflejado en la detección de casos SARI. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo esta semana, alcanzando una positividad de 5.7%.

Por país:

- **El Salvador:** La actividad de influenza A(H1N1)pmd09 disminuye a niveles interestacionales, con una positividad de 3.1%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye levemente respecto de la SE anterior alcanzando una positividad del 15.6%. La actividad del VSR aumentó esta SE, manteniéndose en niveles altos y alcanzando una positividad de 37.1%.
- **Guatemala:** La actividad de influenza, impulsada principalmente por A(H1N1)pdm09, mantiene su tendencia a la disminución, con una positividad de 4.5%. La circulación de VSR se mantiene en niveles bajos, con una tendencia a la disminución y una positividad de 3.6%. SARS-CoV-2 se mantiene esta SE con una positividad del 5%. Los casos de SARI son atribuidos principalmente a VSR.
- **Honduras:** La actividad de influenza, impulsada principalmente por A(H1N1)pdm09, disminuyó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 1.8%. La circulación del VSR disminuyó esta semana presentando una positividad del 22%, por último, SARS-CoV-2 aumentó a una positividad de 8.9%. La mayoría de los casos SARI se asocian a VSR y SARS-CoV-2. Para los casos ILI, influenza representa una importante proporción de los casos.





- **Panamá:** La actividad de influenza aumenta durante la última SE, presentando una positividad de 10.3% y principalmente asociada a influenza B/Victoria. La mayoría de los casos SARI están asociados a influenza. SARS-CoV-2 disminuyó respecto a la SE anterior, alcanzando tasas de positividad de 3.5%. VSR se mantiene con respecto de la SE previa con una positividad del 12%. Los casos de ILI están asociados a SARS-CoV-2 en su mayoría.

Subregión Andina: La actividad de influenza disminuye respecto de la SE previa, con una positividad de 5.4%, asociada principalmente con la circulación de A(H1N1)pdm09. La circulación de VSR disminuye, presentando una positividad de 8.9%. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta alcanzando una positividad del 6.4%. Los casos de SARI asociados con influenza muestran una tendencia descendente y el virus más frecuentemente identificado es VSR. Para los casos ILI se observa un aumento en la proporción de casos asociados a VSR y un descenso de los casos de influenza.

Por país:

- **Bolivia:** La actividad de influenza B se mantiene en niveles interestacionales, mientras que VSR disminuye, manteniendo una proporción importante de los casos SARI.
- **Colombia:** La actividad de influenza A(H1N1)pdm09, disminuye en la última SE, con una positividad actual del 4.2%, situándose en niveles interestacionales. Los casos asociados a SARS-CoV-2 aumentan en la última semana, alcanzando una positividad del 7.8%, mientras que la actividad del VSR se mantiene alta, con tendencia al descenso y una positividad del 9.9%. VSR se presenta en la mayoría de los casos SARI e influenza en la mayoría de los casos ILI.
- **Ecuador:** La actividad de influenza se mantiene en niveles epidémicos, pero disminuye con respecto a SE anterior, presentando una positividad de 6.1%. La circulación del VSR se mantiene en niveles bajos y con una positividad de 1.2%. La actividad de SARS-CoV-2 continúa su ascenso, con una positividad del 14%. Los casos de SARI se atribuyen principalmente a influenza.
- **Perú:** La circulación de influenza aumenta en las últimas SE, presentando una positividad del 7.6% y situándose en niveles interestacionales. La circulación de VSR disminuye en la última SE a 8.1% y SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. La mayor proporción de casos de SARI se encuentran asociados a VSR.

Brasil y el Cono Sur: La actividad de influenza en la subregión, impulsada principalmente por influenza A, mantiene su tendencia al descenso, con una positividad de 2.8%. La circulación del VSR se mantiene alta y disminuye en la última semana, indicando una positividad del 11.7%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, sin embargo, comienza a mostrar una tendencia al ascenso con una positividad del 3.7%. La detección de casos SARI ha mostrado una tendencia descendente constante en las últimas semanas, asociada principalmente a VSR.

Por país:

- **Argentina:** La circulación de influenza disminuye a niveles interestacionales. La actividad del VSR aumenta la última SE con una positividad de 29.9%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, pero con una leve tendencia al ascenso.
- **Brasil:** Influenza, con circulación concurrente de influenza A(H3N2) e influenza B, continúa disminuyendo, con una positividad de 1.8%, situándose por debajo del umbral epidémico. La circulación de VSR se mantiene en niveles bajos, mientras que SARS-CoV-2 aumenta a una positividad del 5.9%. Los casos SARI se mantienen por debajo de niveles moderados, con la mayoría de los casos asociados a VSR, seguido de SARS-CoV-2.
- **Chile:** La actividad de influenza se mantiene en las últimas semanas, con una positividad del 5.8%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, mientras que la circulación de VSR mantiene niveles altos y disminuyendo respecto de la SE anterior, alcanzando una positividad de 22.3%. La mayor proporción de casos de ILI e SARI corresponden a VSR.
- **Paraguay:** La actividad de influenza continúa disminuyendo, con la mayoría de los casos atribuidos a influenza B y una positividad de 2.6%. Los casos ILI se mantienen por debajo del umbral epidémico. La actividad del VSR disminuye la última SE, alcanzando una positividad de 17.7% y reflejándose en la detección de casos SARI. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja, pero con tendencia al ascenso.
- **Uruguay:** La circulación de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria se mantiene bajo el umbral estacional esta SE, alcanzando un 6.9% de positividad. Los casos SARI disminuyen a niveles epidémicos, asociados principalmente con VSR. La circulación del VSR disminuyó a una positividad de 33.5%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.

Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).









Influenza Aviar: el resumen sobre recomendaciones se encuentran di:

[Navigation menu/Menú de navegación](#)

ón, manejo de los casos
[OPS/OMS](#) | [Organización](#)




Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América









Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur









SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE

Pathog... ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) infl... ● Samples (+) ... ● Samples (+) ... ● %(+) INF ...






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Influenza, COVID-19 and RSV Hospitalization Rates (cases per 100 000 population)/Tasas de hospitalización para Influenza, VRS y COVID-19 (casos por 100.000 habitantes)





Open data set available at: [Rates of Laboratory-Confirmed RSV, COVID-19, and Flu Hospitalizations from the RESP-NET Surveillance Systems | Data | Centers for Disease Control and Prevention](#)




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV



ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE



SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo





No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



ARI cases by EW/casos IRA por SE








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo


cases/casos

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo


cases/casos

PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE





SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases per EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

