

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2025–36

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of September 12 2025/
Datos hasta el 12 de Septiembre de 2025

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Subregional NAM
Data sources	CAN
Method.Note ENG	MEX
Method.Note ESP	USA
Summary/Resumen ENG	USA 2
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP	BLZ
Summary/Resumen ESP 2	CUB
Regional INF	DOM
Regional INF 4 EW/SE	HTI
Regional RSV	JAM
Regional SC-2	LCA
Regional ORV	SUR
Regional SARI-IRAG	BRB
% Positivity/%Positividad	CYM
Regional ILI- ETI	GUY
Subregional NAM	GUY 2
Subregional CAR.	VCT
Subregional CAM.	Subregional CAM.
Subregional AND.	SLV
Subregional BSC.	GTM
	GTM 2
	HND
	HND 2
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).



Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-surveillance-and-response/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation: Influenza activity in the Americas remains low. SARS-CoV-2 shows an increase in recent epidemiological weeks (EW). RSV circulation at the regional level shows a downward trend. In North America, influenza activity remains at interseasonal levels. In the Caribbean, circulation is decreasing, with a positivity rate of 8%. Subtype A(H1N1)pdm09 continues to be the predominant strain. RSV activity remains low and stable in North America, while in the Caribbean it maintains a positivity rate of 4.9%. SARS-CoV-2 activity is increasing in North America and the Caribbean, where positivity reached 14.4%, respectively. In Central America, influenza activity continues to decline, with a positivity rate of 5.6%. SARS-CoV-2 activity remains steady this week, with a positivity rate of 5.1%, while RSV maintains a positivity rate of 15.5% in the current EW. In the Andean subregion, influenza A activity remains stable compared to the previous EW, with a positivity rate of 5.4%. RSV activity increases to a positivity rate of 10.1%, while SARS-CoV-2 circulation shows a slight decrease compared to the previous week, with a positivity rate of 5.9%. In Brazil and the Southern Cone, influenza activity continues to decline, with a positivity rate of 2.7%. RSV circulation decreases compared to the previous EW, with a positivity rate of 10.9%, while SARS-CoV-2 activity remains at low levels but shows an upward trend. Circulation of other respiratory viruses (ORVs) remains elevated and shows an increasing trend at the regional level. The Brazil and Southern Cone subregion stands out for the detection of Rhinovirus, Parainfluenza, and Metapneumovirus.

North America: Influenza activity remains low in the subregion, with a positivity rate of 0.5%, and continues at interseasonal levels in Mexico, Canada, and the United States. Most positive SARI cases have been associated with influenza and SARS-CoV-2. RSV activity remains low and stable across all countries in the subregion. SARS-CoV-2 activity is increasing in the subregion, with a positivity rate of 7.2%. In the United States, it reaches 11%, in Canada 6.5%, both showing an upward trend, while Mexico reports a positivity rate of 9.1% with a stable trend.

Caribbean: Influenza activity, primarily driven by A(H1N1)pdm09, decreased in the latest EW, with a subregional positivity rate of 8%. In Haiti, Belize, and Saint Lucia, influenza activity remains at epidemic levels. In contrast, Jamaica, Suriname, and the Dominican Republic continue to report interseasonal levels. In Barbados, Guyana, the Cayman Islands, and Saint Vincent and the Grenadines, influenza activity remains low. In Cuba, activity increased compared to the previous EW, with a positivity rate of 7.8%. RSV circulation in the subregion increased compared to the previous EW, with a positivity rate of 5%. In Cuba, Barbados, and the Cayman Islands, circulation decreased compared to the previous EW. In Belize and Haiti, circulation remains low. Guyana and Saint Vincent and the Grenadines continue to report low and stable levels. In the Dominican Republic and Saint Lucia, circulation increased compared to the previous EW. SARS-CoV-2 activity decreased this EW compared to the previous one, with a subregional positivity rate of 14.4%. In Belize, the Dominican Republic, Jamaica, and Saint Vincent and the Grenadines, activity declined. Barbados continues to report high levels of circulation, though with a downward trend and a positivity rate of 28.2%. Guyana maintains low and stable levels. In Haiti, Saint Lucia, and the Cayman Islands, positivity increased. Cuba stands out with a positivity rate of 26% and an upward trend.

Central America: Influenza activity is decreasing in the subregion, characterized by the concurrent circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B/Victoria, which account for the majority of reported ILI cases. The current positivity rate is 5.6%. RSV circulation remains elevated, with a stable trend and a positivity rate of 15.5%, reflected in the detection of SARI cases. SARS-CoV-2 activity remained steady this week, reaching a positivity rate of 5.1%.

By Country:

- **El Salvador:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity has decreased to interseasonal levels, with a positivity rate of 3.9%. SARS-CoV-2 activity declined compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 8.7%. RSV activity decreased this EW but remains at high levels, with a positivity rate of 32.3%.
- **Guatemala:** Influenza activity, primarily driven by A(H1N1)pdm09, continues its downward trend, with a positivity rate of 4.5%. RSV circulation is increasing, reaching a positivity rate of 7.9%. SARS-CoV-2 activity remained stable this EW, with a positivity rate of 5.4%. SARI cases are mainly attributed to RSV.
- **Honduras:** Influenza activity, driven by influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B, decreased compared to the previous EW, with a positivity rate of 1.5%. RSV circulation remained high and stable, with a positivity rate of 23.2%. SARS-CoV-2 activity decreased to a positivity rate of 7.1%. Most SARI cases are associated with RSV and SARS-CoV-2. Influenza accounts for a significant proportion of ILI cases.



- **Panama:** Influenza activity decreased during the latest EW, with a positivity rate of 8.5%, mainly associated with influenza B/Victoria. Most SARI cases are linked to influenza. SARS-CoV-2 activity increased compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 4.1%. RSV circulation remained stable compared to the previous EW, with a positivity rate of 11.8%. Most ILI cases are associated with SARS-CoV-2.

Andean Subregion: Influenza activity remains stable compared to the previous EW, with a positivity rate of 5.4%, mainly associated with the circulation of A(H1N1)pdm09. RSV circulation is increasing, with a positivity rate of 10.1%. SARS-CoV-2 activity is decreasing, reaching a positivity rate of 5.9%. SARI cases associated with influenza show a downward trend, with RSV being the most frequently identified virus. Among ILI cases, a decrease in those associated with RSV is observed.

By Country:

- **Bolivia:** Influenza B activity remains at interseasonal levels, while RSV circulation is decreasing, continuing to account for a significant proportion of SARI cases associated with this virus.
- **Colombia:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity increased in the latest EW, with a current positivity rate of 5.1%, remaining at interseasonal levels. SARS-CoV-2-associated cases decreased over the past week, reaching a positivity rate of 7.1%, while RSV activity remains high, with an upward trend and a positivity rate of 12.1%. RSV is present in most SARI cases, and influenza is predominant among ILI cases.
- **Ecuador:** Influenza activity remains at interseasonal levels and is decreasing compared to the previous EW, with a positivity rate of 3.8%. RSV circulation remains low, with a positivity rate of 1.6%. SARS-CoV-2 activity has slowed its upward trend, reaching a positivity rate of 13.4%. SARI cases are mainly attributed to influenza.
- **Peru:** Influenza circulation decreased in the latest EW, with a positivity rate of 5.9%, remaining at interseasonal levels. RSV circulation decreased to 8.1% in the latest EW, and SARS-CoV-2 activity remains low and stable. The majority of SARI cases are associated with RSV.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity in the subregion, associated with influenza A, continues its downward trend, with a positivity rate of 2.7%. RSV circulation remains high but decreased in the last epidemiological week, with a positivity rate of 11%. SARS-CoV-2 activity remains at low levels; however, it is beginning to show an upward trend, with a positivity rate of 4.5%. The detection of SARI cases has shown a consistent downward trend in recent weeks, mainly associated with RSV.

By Country:

- **Argentina:** Influenza circulation has decreased to interseasonal levels. RSV activity declined in the latest EW, with a positivity rate of 27.9%. SARS-CoV-2 activity remains low, but shows a slight upward trend, with a positivity rate of 6.7%.
- **Brazil:** Influenza, with concurrent circulation of influenza A(H3N2) and influenza B, continues to decline, with a positivity rate of 1.8%, remaining below the epidemic threshold. RSV circulation remains low, while SARS-CoV-2 activity increased to a positivity rate of 6.8%. SARI cases remain below moderate levels, with most cases associated with RSV, followed by SARS-CoV-2.
- **Chile:** Influenza activity has remained low in recent weeks, with a positivity rate of 5.7%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable, while RSV circulation remains high but is decreasing compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 19.1%. The majority of ILI and SARI cases are associated with RSV.
- **Paraguay:** Influenza activity continues to decline, with most cases attributed to influenza B and a positivity rate of 3.3%. ILI cases remain below the epidemic threshold. RSV activity decreased in the latest EW, reaching a positivity rate of 18.9%, reflected in the detection of SARI cases. SARS-CoV-2 circulation remains low, but shows an upward trend.
- **Uruguay:** Influenza B/Victoria circulation remains below the seasonal threshold this EW, with a positivity rate of 5.2%. SARI cases are observed at high levels, mainly associated with RSV. RSV circulation decreased to a positivity rate of 26.2%, and SARS-CoV-2 activity remains low and stable.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://paho.org).



Situación Regional: La actividad de influenza en las Américas se mantiene baja. Para SARS-CoV-2 muestra un incremento en las últimas semanas epidemiológicas (SE). Para VSR la circulación a nivel regional muestra una tendencia descendente. En América del Norte, la actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales. En el Caribe, la circulación disminuye presentando una positividad de 8%. El subtipo A(H1N1)pdm09 continúa siendo el predominante. La actividad del VSR se mantiene baja y estable en América del Norte, mientras que en el Caribe mantiene una positividad del 4.9%. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta en América del Norte y el Caribe, donde la positividad alcanzó un 14.4% respectivamente. En Centroamérica, la actividad de influenza mantiene una tendencia al descenso, con una positividad del 5.6%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene esta semana con una positividad del 5.1%, mientras que VSR se mantiene esta SE a una positividad del 15.5%. En la subregión andina, la actividad de influenza A se mantiene respecto a la SE anterior, con una positividad del 5.4%. La actividad del VSR aumenta a una positividad del 10.1%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 disminuye levemente en comparación a la última semana, con una positividad del 5.9%. En Brasil y el Cono Sur, la actividad de influenza continúa disminuyendo, con una positividad del 2.7%. La circulación del VSR disminuye con respecto a la SE anterior, con una positividad del 10.9%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos, pero con una tendencia al aumento. La circulación de otros virus respiratorios (OVR) presenta niveles elevados y con una tendencia ascendente a nivel regional. Destaca la subregión de Brasil y el cono sur con detección de Rinovirus, Parainfluenza y Metapneumovirus.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene baja en la subregión, con una positividad de 0.5%, y se mantiene en niveles interestacionales en México, Canadá y Estados Unidos. La mayoría de los casos SARI positivos se han asociado con influenza y SARS-CoV-2. La actividad del VSR sigue siendo baja y estable en todos los países de la subregión. La actividad de SARS-CoV-2 aumenta en la subregión con una positividad del 7.2%. En Estados Unidos alcanza un 11%, Canadá un 6.5%, ambos con tendencia al ascenso, mientras que México presenta una positividad de 9.1% y una tendencia a la mantención.

Caribe: La actividad de influenza, impulsada principalmente por A(H1N1)pdm09, disminuye en la última SE, con una tasa de positividad subregional del 8%. En Haití, Belice, Santa Lucía la actividad de influenza continúa en niveles epidémicos. En contraste, en Jamaica, Surinam y República Dominicana se mantiene en niveles interestacionales. En Barbados, Guyana, Las Islas Caimán y San Vincent y Las granadinas la actividad de influenza se mantiene baja. En Cuba la actividad aumenta respecto de la SE anterior con una positividad del 7.8%. La circulación del VSR en la subregión aumenta con respecto a la SE anterior, con una positividad del 5%. En Cuba, Barbados y las Islas Caimán la circulación disminuye en comparación a la SE anterior. En Belice, Haití la circulación se mantiene baja. Guyana y San Vincent y las granadinas mantienen niveles bajos y sin cambios en comparación con la SE anterior. En República Dominicana y Santa Lucía la circulación aumenta en comparación a la SE anterior. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye esta SE con respecto a la anterior, presentando positividad subregional de 14.4%. En Belice, República Dominicana, Jamaica y San Vincent y las granadinas la actividad disminuyó. Barbados mantiene niveles altos de circulación, pero con una tendencia a la disminución y una positividad del 28.2%. Guyana mantiene niveles bajos y estables. En Haití, Santa Lucía, Islas Caimán, la positividad aumentó. Destaca Cuba con una positividad del 26% y mantiene una tendencia ascendente.

Centroamérica: La actividad de influenza disminuye su circulación en la subregión, caracterizada por la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B/Victoria, que representa la mayoría de los casos notificados de ILI. La positividad actual es del 5.6%. La circulación del VSR se mantiene elevada, con tendencia a la mantención, y una positividad del 15.5%, y que se ve reflejado en la detección de casos SARI. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo esta semana, alcanzando una positividad de 5.1%.

Por país:

- **El Salvador:** La actividad de influenza A(H1N1)pmd09 disminuye a niveles interestacionales, con una positividad de 3.9%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye respecto de la SE anterior alcanzando una positividad del 8.7%. La actividad del VSR disminuyó esta SE, manteniéndose en niveles altos y alcanzando una positividad de 32.3%.
- **Guatemala:** La actividad de influenza, impulsada principalmente por A(H1N1)pdm09, mantiene su tendencia a la disminución, con una positividad de 4.5%. La circulación de VSR aumenta su circulación, alcanzando una positividad del 7.9%. SARS-CoV-2 se mantiene esta SE con una positividad del 5.4%. Los casos de SARI son atribuidos principalmente a VSR.
- **Honduras:** La actividad de influenza, impulsada por influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B, disminuyó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 1.5%. La circulación del VSR se mantuvo en niveles altos sin cambios en su tendencia presentando una positividad del 23.2%, por último, SARS-CoV-2 disminuyó a una positividad de 7.1%. La mayoría de los casos SARI se asocian a VSR y SARS-CoV-2. Para los casos ILI, influenza representa una importante proporción de los casos.



- **Panamá: Panamá:** La actividad de influenza disminuye durante la última SE, presentando una positividad de 8.5% y principalmente asociada a influenza B/Victoria. La mayoría de los casos SARI están asociados a influenza. SARS-CoV-2 aumentó respecto a la SE anterior, alcanzando tasas de positividad de 4.1%. VSR se mantiene con respecto de la SE previa con una positividad del 11.8%. Los casos de ILI están asociados a SARS-CoV-2 en su mayoría.

Subregión Andina: La actividad de influenza se mantiene respecto de la SE previa, con una positividad de 5.4%, asociada principalmente con la circulación de A(H1N1)pdm09. La circulación de VSR aumenta, presentando una positividad de 10.1%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye alcanzando una positividad del 5.9%. Los casos de SARI asociados con influenza muestran una tendencia descendente y el virus más frecuentemente identificado es VSR. Para los casos ILI se observa una disminución de casos asociados a VSR.

Por país:

- **Bolivia:** La actividad de influenza B se mantiene en niveles interestacionales, mientras que VSR disminuye, manteniendo una proporción importante de los casos SARI asociados a este virus.
- **Colombia:** La actividad de influenza A(H1N1)pdm09, aumentó en la última SE, con una positividad actual del 5.1%, situándose en niveles interestacionales. Los casos asociados a SARS-CoV-2 disminuyen en la última semana, alcanzando una positividad del 7.1%, mientras que la actividad del VSR se mantiene alta, con tendencia al aumento y una positividad del 12.1%. VSR se presenta en la mayoría de los casos SARI e influenza en la mayoría de los casos ILI.
- **Ecuador:** La actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales, y disminuyendo con respecto a SE anterior, presentando una positividad de 3.8%. La circulación del VSR se mantiene en niveles bajos y con una positividad de 1.6%. La actividad de SARS-CoV-2 frena su ascenso, con una positividad del 13.4%. Los casos de SARI se atribuyen principalmente a influenza.
- **Perú:** La circulación de influenza disminuye en la última SE, presentando una positividad del 5.9% y situándose en niveles interestacionales. La circulación de VSR disminuye en la última SE a 8.1% y SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. La mayor proporción de casos de SARI se encuentran asociados a VSR.







Brasil y el Cono Sur: La actividad de influenza en la subregión, asociada a influenza A, mantiene su tendencia al descenso, con una positividad de 2.7%. La circulación del VSR se mantiene alta y disminuye en la última semana, indicando una positividad del 11%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, sin embargo, comienza a mostrar una tendencia al ascenso con una positividad del 4.5%. La detección de casos SARI ha mostrado una tendencia descendente constante en las últimas semanas, asociada principalmente a VSR.

Por país:

- **Argentina:** La circulación de influenza disminuye a niveles interestacionales. La actividad del VSR disminuye la última SE con una positividad de 27.9%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, pero con una leve tendencia al ascenso y una positividad del 6.7%.
- **Brasil:** Influenza, con circulación concurrente de influenza A(H3N2) e influenza B, continúa disminuyendo, con una positividad de 1.8%, situándose por debajo del umbral epidémico. La circulación de VSR se mantiene en niveles bajos, mientras que SARS-CoV-2 aumenta a una positividad del 6.8%. Los casos SARI se mantienen por debajo de niveles moderados, con la mayoría de los casos asociados a VSR, seguido de SARS-CoV-2.
- **Chile:** La actividad de influenza se mantiene baja en las últimas semanas, con una positividad del 5.7%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, mientras que la circulación de VSR mantiene niveles altos y disminuyendo respecto de la SE anterior, alcanzando una positividad de 19.1%. La mayor proporción de casos de ILI e SARI corresponden a VSR.
- **Paraguay:** La actividad de influenza continúa disminuyendo, con la mayoría de los casos atribuidos a influenza B y una positividad de 3.3%. Los casos ILI se mantienen por debajo del umbral epidémico. La actividad del VSR disminuye la última SE, alcanzando una positividad de 18.9% y reflejándose en la detección de casos SARI. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja, pero con tendencia al ascenso.
- **Uruguay:** La circulación de influenza B/Victoria se mantiene bajo el umbral estacional esta SE, alcanzando un 5.2% de positividad. Los casos SARI se observan en niveles altos, asociados principalmente con VSR. La circulación del VSR disminuyó a una positividad de 26.2%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.




Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Influenza, COVID-19 and RSV Hospitalization Rates (cases per 100 000 population)/Tasas de hospitalización para Influenza, VRS y COVID-19 (casos por 100.000 habitantes)





Open data set available at: [Rates of Laboratory-Confirmed RSV, COVID-19, and Flu Hospitalizations from the RESP-NET Surveillance Systems | Data | Centers for Disease Control and Prevention](https://www.cdc.gov/respiratory/rsv/covid-19/flu-hospitalizations)




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR




ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE



SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



ARI cases by EW/casos IRA por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de OVR




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus


No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



cases/casos

No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



cases/casos

No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



cases/casos

cases/casos

PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases per EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

