

# FILARIOSE LYMPHATIQUE



## + Objectif d'impact

Élimination en tant que problème de santé publique

## + Objectif d'élimination

<1% prévalence de la microfilarémie ou <1% prévalence de l'antigénémie chez les personnes de 20 ans et plus

## + Objectifs programmatiques

≥65 % couverture médicamenteuse par l'AMM dans l'ensemble de la population de chaque zone d'endémie en utilisant deux médicaments (diéthylcarbamazine et albendazole [DA]) ou trois (ivermectine, diéthylcarbamazine et albendazole [IDA])

100 % couverture géographique par les services de prise en charge de la morbidité et de prévention des incapacités dans toutes les zones où vivent des patients atteints de filariose lymphatique

## Actions pour parvenir à l'élimination

### 1 Mettre fin à la transmission par la mise en œuvre d'interventions :

- Mener des campagnes d'AMM chaque année dans 100 % des unités d'endémie afin d'obtenir une couverture médicamenteuse efficace (≥65 %) de l'ensemble de la population : ≥5 tournées avec DA ou 2 tournées avec IDA
- Évaluer l'impact en effectuant des tests sanguins au niveau de sites sentinelles et de sites de contrôle ponctuel, puis en réalisant des enquêtes d'évaluation de la transmission ou des études d'impact de l'administration d'IDA

### 2 Lutte antivectorielle :

- Combiner la pulvérisation d'insecticide à effet rémanent et l'utilisation de moustiquaires pour lutter efficacement contre les populations de vecteurs

## Meilleurs investissements

### 3 Réduire les souffrances et améliorer la qualité de vie :

- Évaluer la charge de morbidité pour estimer le nombre de patients présentant un lymphœdème et une hydrocéle par unité d'endémie
- Atteindre une couverture géographique de 100 % afin de garantir la disponibilité des services de prise en charge de la morbidité et de prévention des incapacités et de fournir les services essentiels de soins dans chaque district où vivent des patients atteints de filariose lymphatique

### 4 Surveillance post-AMM :

- Continuer la surveillance active pour surveiller l'élimination dans les zones où la filariose lymphatique était endémique par le passé

## Pour en savoir plus

· Organisation mondiale de la Santé. Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse dans le cadre du Programme mondial pour l'élimination de la filariose lymphatique : manuel à l'intention des programmes nationaux d'élimination. Genève : OMS ; 2013. Disponible sur : <https://iris.who.int/handle/10665/85616>.

· Organisation mondiale de la Santé. Guideline: Alternative mass drug administration regimens to eliminate lymphatic filariasis. Genève : OMS ; 2017. Disponible sur : <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550161>.



Découvrez le portefeuille de fonds renouvelables régionaux de l'OPS pour améliorer l'accès aux technologies vitales.

**OPS**



Organisation  
panaméricaine  
de la Santé

Organisation  
mondiale de la Santé  
Région des Amériques