

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (SYPHILIS ET GONORRÉE)



Initiative
d'Élimination 3

+ Objectif d'impact

Élimination en tant que problème
de santé publique

+ Objectif d'élimination

90 % réduction des nouveaux cas de syphilis et de
gonorrhée par rapport à 202

+ Objectifs programmatiques

90 % des populations clés et prioritaires font l'objet d'un
dépistage de la syphilis et de la gonorrhée chaque année
95 % des personnes diagnostiquées avec la syphilis ou
la gonorrhée sont traitées

Actions pour parvenir à l'élimination

① Intensifier le dépistage grâce à des stratégies innovantes :

- Élargir le dépistage systématique et périodique
de la syphilis et de la gonorrhée en diversifiant
les approches (p. ex., autotest, double test du
VIH et de la syphilis)
- Mettre en œuvre des stratégies pour prévenir et
traiter les partenaires sexuels afin d'interrompre
la transmission

② Intégrer la lutte contre les infections sexuellement transmissibles aux soins primaires :

- Proposer des services de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles dans le cadre des
soins de santé primaires et de la planification
familiale, ainsi que dans les services spécialisés
dans l'infection à VIH et les services de santé
reproductive
- Garantir la disponibilité de médicaments
essentiels tels que la benzathine benzylpénicilline
G et la ceftriaxone à tous les niveaux de soins

Meilleurs investissements

③ Traiter tôt et efficacement :

- Fournir un traitement dès que le diagnostic de syphilis
ou de gonorrhée est posé afin de prévenir la transmission
et les complications
- Explorer de nouvelles approches thérapeutiques, par
exemple la prophylaxie post-exposition par la
doxycycline, si la situation s'y prête

④ Encourager des pratiques sexuelles sans danger et éducation sanitaire :

- Fournir une éducation en matière de santé sexuelle
et reproductive qui soit inclusive et adaptée à l'âge,
en ciblant les populations clés
- Garantir l'accès à des préservatifs gratuits ou peu
coûteux, et promouvoir leur utilisation correcte et
systématique

⑤ Avoir recours à des interventions ciblées et fondées sur les données :

- Se servir des activités systématiques de dépistage et de
surveillance pour viser les populations clés (p. ex., les
femmes enceintes, les hommes ayant des rapports
sexuels avec d'autres hommes, les travailleurs du sexe)
avec des interventions ciblées

Pour en savoir plus

· Organisation panaméricaine de la Santé. Guidance for the elimination of syphilis and congenital syphilis in the Americas. Technical note. Washington, D.C. : OPS ; 2024. Disponible sur : <https://iris.paho.org/handle/10665.2/61824>.

· Organisation mondiale de la Santé. Stratégies mondiales du secteur de la santé contre, respectivement, le VIH, l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030. Genève : OMS ; 2022. Disponible sur : <https://www.who.int/fr/publications/i/item/978924005377>.



Découvrez le portefeuille de fonds renouvelables régionaux
de l'OPS pour améliorer l'accès aux technologies vitales.

OPS

Organisation
panaméricaine
de la Santé

Organisation
mondiale de la Santé
Région des Amériques