

FILARIOSE LINFÁTICA



+ Meta de impacto

Eliminação como problema de saúde pública

+ Meta de eliminação

<1% prevalência de microfilaremia ou prevalência de antigenemia <1% em pessoas de 20 anos ou mais

+ Metas programáticas

Ações para alcançar a eliminação

1 Interromper a transmissão por meio de:

- Implementar o tratamento em massa anualmente em 100% de todas as unidades endêmicas, alcançando uma cobertura efetiva dos medicamentos ($\geq 65\%$) na população total: ≥ 5 rodadas no caso de DA ou 2 rodadas com IDA
- Avaliar o impacto por meio de exames de sangue em áreas sentinelas e de controle aleatório, acompanhados de inquéritos de avaliação da transmissão ou do impacto do uso de IDA

2 Controle de vetores:

- Combinar a borrifação de inseticida de efeito residual ao uso de mosquiteiro para suprimir de forma efetiva as populações de vetores

$\geq 65\%$ de cobertura do tratamento em massa com terapia dupla (dietetilcarbamazina e albendazol [DA]) ou tripla (ivermectina, dietetylcarbamazina e albendazol [IDA]) em toda a população de cada área endêmica

100% de cobertura geográfica dos serviços de manejo da morbidade e prevenção da incapacidade (MMPI) em todas as áreas com pacientes conhecidos

Melhores investimentos

3 Reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida:

- Avaliar a carga de doença para estimar o número de pacientes com linfedema e hidrocele por unidade endêmica
- Alcançar 100% de cobertura geográfica para assegurar a disponibilidade de serviços de MMPI e oferecer o pacote essencial de cuidados em todos os distritos com pacientes conhecidos

4 Vigilância após o tratamento em massa:

- Continuar a vigilância ativa para monitorar a eliminação em áreas anteriormente endêmicas

Informações adicionais

· Organização Mundial da Saúde. Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos: manual para programas nacionais de eliminação da filariose. Genebra: OMS; 2011. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/44580>.

· Organização Mundial da Saúde. Guideline: alternative mass drug administration regimens to eliminate lymphatic filariasis. Genebra: OMS; 2017. Disponível em: <https://who.int/publications/i/item/9789241550161>.



Explore o portfólio de Fundos Rotativos Regionais da OPAS para melhorar o acesso a tecnologias que salvam vidas.