

ONCOCERCOSE



+ Meta de impacto

Eliminação da transmissão

+ Metas de eliminação

<0.1% de prevalência de mosquitos transmissores

<0.1% de soroprevalência de oncocercose em menores de 10 anos

+ Meta programática

≥85% de cobertura do tratamento em massa com ivermectina nas populações elegíveis

Ações para alcançar a eliminação

1 Interromper a transmissão:

- Implementar tratamento em massa com ivermectina da população que vive em áreas de transmissão (preferencialmente duas vezes por ano em áreas de alta transmissão) pelo menos durante 12 a 15 anos

2 Controle de vetores:

- Reduzir as populações de simuliídeos (borrachudos), se possível, por meio do manejo ambiental

3 Vigilância:

- Implementar o monitoramento entomológico (infecção por simuliídeos) e sorológico (testagem em comunidades)

4 Envolvimento da comunidade:

- Assegurar que a comunidade esteja a cargo da distribuição e da adesão para alcançar uma alta cobertura do tratamento em massa

5 Vigilância após o tratamento em massa:

- Continuar a vigilância ativa para monitorar a eliminação em áreas anteriormente endêmicas

Informações adicionais

· Organização Pan-Americana da Saúde. Oncocercosis – “Ceguera de los ríos”. Washington, D.C.: OPAS; 2025 [consultado em 18 de abril de 2025]. Disponível em: <https://www.paho.org/es/temas/oncocercosis-ceguera-rios>.

· Organização Mundial da Saúde. Guidelines for stopping mass drug administration and verifying elimination of human onchocerciasis: criteria and procedures. Genebra: OMS; 2016. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/204180>.



Explore o portfólio de Fundos Rotativos Regionais da OPAS para melhorar o acesso a tecnologias que salvam vidas.

OPAS

