

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2025–51

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of December 26, 2025/
Datos hasta el 26 de Diciembre de 2025

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Subregional NAM
Data sources	CAN
Method.Note ENG	MEX
Method.Note ESP	MEX 2
Summary/Resumen ENG	USA
Summary/Resumen ENG 2	USA 2
Summary/Resumen ESP	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP 2	BLZ
Summary/Resumen ESP 3	CUB
Regional INF	DOM
Regional INF 4 EW/SE	HTI
Regional RSV	JAM
Regional SC-2	LCA
Regional ORV	SUR
Regional SARI-IRAG	BRB
% Positivity/%Positividad	CYM
Regional ILI- ETI	GUY
Subregional NAM	GUY 2
Subregional CAR.	VCT
Subregional CAM.	Subregional CAM.
Subregional AND.	SLV
Subregional BSC.	GTM
	GTM 2
	HND
	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2



The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-prevention-and-control/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).



Regional Situation: Influenza activity in the Americas continues an upward trend, mainly driven by activity in the Northern Hemisphere, with a regional positivity of 16.2%. Influenza A(H3N2) continues to predominate among subtyped samples in all regions, except in the Andean subregion. RSV circulation remains at low levels (<1%), while SARS-CoV-2 positivity continues to decline, reaching 5.4%. In North America, influenza circulation is likely near its peak, with a positivity of 22%. RSV activity remains low, with a slight increase to 2.2%, while SARS-CoV-2 positivity decreased to 5.2%. In the Caribbean, influenza circulation is elevated, with a positivity of 34%. RSV activity continues to decline, reaching 7%, while SARS-CoV-2 remains at low levels (<1%). In Central America, influenza activity remained stable over the past four epidemiological weeks (EWs), with a positivity of approximately 12.2%. SARS-CoV-2 circulation remained low and stable, while RSV activity remained elevated at 10.6%. In the Andean subregion, influenza activity stabilized over the past three EWs at a positivity of 7.2%, while RSV circulation continued to increase, reaching 5.8%. SARS-CoV-2 circulation increased compared with the previous two EWs, reaching a positivity of 5.1%. In Brazil and the Southern Cone, influenza activity decreased compared with the previous EW, with a positivity of 12.6%. RSV circulation remains at interseasonal levels (1.1%), while SARS-CoV-2 activity remained stable, at 8.4%. Circulation of other respiratory viruses (ORVs) has continued to decline since early October, with a regional positivity of 2.7%. Rhinovirus and parainfluenza are the most frequently detected ORVs.

North America: Influenza activity has continued to increase since early October, reaching a positivity of 22%, with influenza A(H3N2) accounting for 75% of subtyped samples. RSV circulation remains low, with a slight increase to 2.2%, while SARS-CoV-2 positivity decreased to 5.2% compared to the previous EW. Influenza remains the most frequently detected virus (2.1%) among ILI cases. SARI cases increased in recent weeks and were mainly associated with influenza (6%). At the country level, Canada reported elevated influenza activity with an upward trend, reaching 16.3%, largely attributable to influenza A(H3N2). Mexico reported elevated influenza circulation, with a positivity of 11.4%, driven by influenza A(H3N2). The United States continued to show an upward trend in influenza activity, reaching a positivity of 25.6%, predominantly due to influenza A(H3N2). ILI cases and influenza hospitalization rates continued to increase. Regarding SARS-CoV-2, positivity remained stable in Canada (6.2%), continued to decrease in Mexico (1.2%), and showed a slight increase in the United States (3.8%). RSV activity remained low but increased over recent weeks in Canada (1.8%), the United States (4.1%), and Mexico (4.3%).

Caribbean: Influenza activity increased over recent EWs, reaching a subregional positivity of 34.0%, with influenza A(H3N2) accounting for 76% of subtyped samples. RSV circulation continued to decrease over the past four EWs, reaching a positivity of 7%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable at 0.9%. SARI and ILI cases remained low. At the country level, influenza activity increased in Belize (13.4%), the Dominican Republic (29.1%), Barbados (33.5%), Guyana (6.8%), and Saint Vincent and the Grenadines (63.0%), mainly driven by influenza A(H3N2). No clear trends were identified in Jamaica (2.2%), Suriname (11.1%), or the Cayman Islands (27.4%), while Cuba maintained a downward trend in influenza circulation (2.5%). RSV positivity remained elevated in Belize (39.8%), the Cayman Islands (12.1%), and Guyana (8.2%), while decreases continued in Cuba (17.6%) and the Dominican Republic (4.1%). RSV activity remained stable in Saint Lucia (4.6%) and Jamaica (2.2%). SARS-CoV-2 activity increased in Cuba (4.0%), while other countries maintained low and stable circulation.

Central America: Influenza activity remained relatively stable over the past four EWs, with a positivity of 12.2%. Influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 accounted for 42% and 26% of subtyped samples, respectively. RSV circulation remained elevated (10.6%), while SARS-CoV-2 activity remained low and stable (<1.0%).

• **By Country:**

- **Guatemala:** Influenza activity increased after three weeks of decline, reaching 13.3%, with influenza A(H3N2) as the predominant subtype. RSV circulation stabilized at 13.3% following three weeks of decline. SARS-CoV-2 positivity remained below 1%. SARI cases continued to decrease, mainly associated with RSV.
- **Honduras:** Influenza circulation remained elevated at 25.0%. RSV circulation decreased to 1.0%, while SARS-CoV-2 activity remained low and stable. Most SARI and ILI cases were associated with influenza.
- **Nicaragua:** Influenza activity increased after three weeks of decline, reaching a positivity of 20.0%. RSV remains relatively stable at 2.3%, while SARS-CoV-2 remained low and stable.

Continues on the next page





- **Panama:** Influenza activity maintained an upward trend at epidemic levels, reaching a positivity of 9.4%, mainly associated with influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2). RSV circulation remained elevated but showed a downward trend, reaching a positivity of 13.4%. SARS-CoV-2 remained low and stable (0.5%). SARI cases remain elevated, primarily associated with RSV and influenza.

Andean Subregion: Influenza activity remained relatively stable over the past three EWs, with a positivity of 7.2%. Influenza A(H1N1)pdm09 accounted for 74% of subtyped samples. RSV circulation continued to increase over the past four EWs, reaching 5.8%, while SARS-CoV-2 activity remained stable at 5.1%.

By Country:

- **Colombia:** Influenza activity increased over recent EWs, reaching a positivity of 5.5%, with influenza A(H1N1)pdm09 as the predominant subtype. RSV activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 5.8%. SARS-CoV-2 activity remained stable at 5.8% over the past 4 EWs. Influenza and RSV predominated among SARI cases.
- **Ecuador:** Influenza activity reached moderate levels and continued to increase, reaching a positivity of 24.5%, driven by influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2). RSV circulation remained low and stable (2%), while SARS-CoV-2 activity remained stable at 6%. The proportion of SARI cases associated with influenza increased.
- **Venezuela:** Influenza activity continued to increase, reaching a positivity of 14.6%, with concurrent circulation of influenza A(H3N2) and influenza B. RSV circulation remained elevated with a positivity of 12.5%. SARS-CoV-2 activity remained low and stable.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity decreased compared with the previous EW, reaching a positivity of 12.6%, predominantly associated with influenza A(H3N2). RSV circulation remained low and stable (1.1%), while SARS-CoV-2 activity remained stable over recent EWs at 8.4%. ILI and SARI cases continued to decrease, mainly associated with influenza, followed by SARS-CoV-2.

By Country:

- **Argentina:** Influenza circulation remained stable at a positivity of 2.9%, driven mainly by influenza B. RSV activity increased over the past four EWs (2.8%), while SARS-CoV-2 activity decreased to 10.3%. Both SARI and ILI cases show a decreasing trend.
- **Brazil:** Influenza activity increased compared to the past three EWs, reaching a positivity of 10.7%, mainly associated with influenza A(H3N2). RSV circulation continued to increase over the past three EWs, reaching 2%, while SARS-CoV-2 circulation remained stable at 5.5%. SARI cases decreased.
- **Chile:** Influenza A activity decreased but remained elevated at a positivity of 16.2%. SARS-CoV-2 activity continued to increase, reaching a 8.6% positivity, while RSV circulation remained low and stable (<1%). Influenza accounted for the largest proportion of SARI cases (13%).
- **Paraguay:** Influenza activity decreased over two consecutive EWs, reaching a positivity of 12.4%, with most cases attributed to influenza B. RSV continued to decline (1.1%), while SARS-CoV-2 activity remained stable at 6.4%.
- **Uruguay:** Influenza and RSV activity remained low and stable. SARS-CoV-2 activity declined this EW, reaching 12.5% positivity.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates](#) | [PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](#).





Situación Regional: La actividad de influenza en las Américas continúa con una tendencia ascendente, impulsada principalmente por la actividad en el hemisferio norte, con una positividad regional de 16.2%. La influenza A(H3N2) continúa predominando entre las muestras subtipificadas en todas las regiones, excepto en la subregión andina. La circulación de VSR se mantiene en niveles bajos (<1%), mientras que la positividad de SARS-CoV-2 continúa en descenso, alcanzando 5.4%. En América del Norte, la circulación de influenza probablemente se encuentra cerca de su pico, con una positividad de 22%. La actividad de VSR permanece baja, con un ligero aumento a 2.2%, mientras que la positividad de SARS-CoV-2 disminuyó a 5.2%. En el Caribe, la circulación de influenza es elevada, con una positividad de 34%. La actividad de VSR continúa disminuyendo, alcanzando 7%, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos (<1%). En Centroamérica, la actividad de influenza se mantuvo estable durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas (SE), con una positividad de aproximadamente 12.2%. La circulación de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable, mientras que la actividad de VSR permaneció elevada en 10.6%. En la subregión andina, la actividad de influenza se estabilizó durante las últimas tres SE, con una positividad de 7.2%, mientras que la circulación de VSR continuó en aumento, alcanzando 5.8%. La circulación de SARS-CoV-2 aumentó en comparación con las dos SE previas, alcanzando una positividad de 5.1%. En Brasil y el Cono Sur, la actividad de influenza disminuyó en comparación con la SE previa, con una positividad de 12.6%. La circulación de VSR se mantiene en niveles interestacionales (1.1%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permaneció estable en 8.4%. La circulación de otros virus respiratorios (OVR) ha continuado disminuyendo desde inicios de octubre, con una positividad regional de 2.7%. El rinovirus y el virus parainfluenza continúan siendo los OVR detectados con mayor frecuencia.

América del Norte: La actividad de influenza ha continuado en aumento desde inicios de octubre, alcanzando una positividad de 22%, con influenza A(H3N2) representando el 75% de las muestras subtipificadas. La circulación de VSR permanece baja, con un ligero aumento a 2.2%, mientras que la positividad de SARS-CoV-2 disminuyó a 5.2% en comparación con la SE previa. La influenza continúa siendo el virus detectado con mayor frecuencia entre los casos de ETI (2.1%). Los casos de IRAG aumentaron en las últimas semanas y estuvieron principalmente asociados con influenza (6%). A nivel de país, Canadá reportó una actividad elevada de influenza con una tendencia ascendente, alcanzando 16.3%, atribuida principalmente a influenza A(H3N2). México reportó una circulación elevada de influenza, con una positividad de 11.4%, impulsada por influenza A(H3N2). Estados Unidos continuó mostrando una tendencia ascendente en la actividad de influenza, alcanzando una positividad de 25.6%, predominantemente por influenza A(H3N2). Los casos de ETI y las tasas de hospitalización por influenza continuaron en aumento. En cuanto a SARS-CoV-2, la positividad se mantuvo estable en Canadá (6.2%), continuó disminuyendo en México (1.2%) y mostró un ligero aumento en Estados Unidos (3.8%). La actividad de VSR permaneció baja, pero aumentó en las últimas semanas en Canadá (1.8%), Estados Unidos (4.1%) y México (4.3%).

Caribe: La actividad de influenza aumentó en las SE recientes, alcanzando una positividad subregional de 34.0%, con influenza A(H3N2) representando el 76% de las muestras subtipificadas. La circulación de VSR continuó disminuyendo durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 7%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable en 0.9%. Los casos de IRAG y ETI permanecieron bajos. A nivel de país, la actividad de influenza aumentó en Belice (13.4%), República Dominicana (29.1%), Barbados (33.5%), Guyana (6.8%) y San Vicente y las Granadinas (63.0%), impulsada principalmente por influenza A(H3N2). No se identificaron tendencias claras en Jamaica (2.2%), Surinam (11.1%) ni en Islas Caimán (27.4%), mientras que Cuba mantuvo una tendencia descendente en la circulación de influenza (2.5%). La positividad de VSR se mantuvo elevada en Belice (39.8%), Islas Caimán (12.1%) y Guyana (8.2%), mientras que continuaron los descensos en Cuba (17.6%) y República Dominicana (4.1%). La actividad de VSR se mantuvo estable en Santa Lucía (4.6%) y Jamaica (2.2%). La actividad de SARS-CoV-2 aumentó en Cuba (4.0%), mientras que los demás países mantuvieron una circulación baja y estable.

Centroamérica: La actividad de influenza se mantuvo relativamente estable durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 12.2%. La influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09 representaron el 42% y el 26% de las muestras subtipificadas, respectivamente. La circulación de VSR permaneció elevada (10.6%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable (<1.0%).

Continúa en la siguiente página





Por país:

- **Guatemala:** La actividad de influenza aumentó tras tres semanas de descenso, alcanzando 13.3%, con influenza A(H3N2) como subtipo predominante. La circulación de VSR se estabilizó en 13.3% tras tres semanas de descenso. La positividad de SARS-CoV-2 se mantuvo por debajo de 1%. Los casos de IRAG continuaron disminuyendo, principalmente asociados con VSR.
- **Honduras:** La circulación de influenza permaneció elevada (25.0%). La circulación de VSR disminuyó a 1.0%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable. La mayoría de los casos de IRAG y ETI estuvieron asociados con influenza.
- **Nicaragua:** La actividad de influenza aumentó tras tres semanas de descenso, alcanzando una positividad de 20.0%. La circulación de VSR se mantuvo relativamente estable (2.3%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permaneció baja y estable.
- **Panamá:** La actividad de influenza mantuvo una tendencia ascendente en niveles epidémicos, alcanzando una positividad de 9.4%, principalmente asociada con influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2). La circulación de VSR permaneció elevada, aunque con una tendencia descendente, alcanzando 13.4%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable (0.5%). Los casos de IRAG permanecieron elevados, principalmente asociados con VSR e influenza.

Subregión Andina: La actividad de influenza se mantuvo relativamente estable durante las últimas tres SE, con una positividad de 7.2%. La influenza A(H1N1)pdm09 representó el 74% de las muestras subtipificadas. La circulación de VSR continuó aumentando durante las últimas cuatro SE, alcanzando 5.8%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en 5.1%.

Por país:

- **Colombia:** La actividad de influenza aumentó en las SE recientes, alcanzando una positividad de 5.5%, con influenza A(H1N1)pdm09 como subtipo predominante. La actividad de VSR aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando 5.8%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en 5.8% durante las últimas cuatro SE. La influenza y el VSR predominaron entre los casos de IRAG.
- **Ecuador:** La actividad de influenza alcanzó niveles moderados y continuó en aumento, llegando a una positividad de 24.5%, impulsada por influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). La circulación de VSR se mantuvo baja y estable (2%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permaneció estable en 6%. Aumentó la proporción de casos de IRAG asociados con influenza.
- **Venezuela:** La actividad de influenza continuó en aumento, alcanzando una positividad de 14.6%, con circulación concurrente de influenza A(H3N2) e influenza B. La circulación de VSR permaneció elevada (12.5%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable.

Brasil y el Cono Sur: La actividad de influenza disminuyó en comparación con la SE previa, alcanzando una positividad de 12.6%, predominantemente asociada con influenza A(H3N2). La circulación de VSR permaneció baja y estable (1.1%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en las SE recientes, con una positividad de 8.4%. Los casos de ETI e IRAG continuaron disminuyendo, principalmente asociados con influenza, seguidos por SARS-CoV-2.

Por país:

- **Argentina:** La circulación de influenza se mantuvo estable (2.9%), impulsada principalmente por influenza B. La actividad de VSR aumentó durante las últimas cuatro SE (2.8%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 disminuyó a 10.3%. Tanto los casos de IRAG como de ETI mostraron una tendencia descendente.
- **Brasil:** La actividad de influenza aumentó en comparación con las últimas tres SE, alcanzando una positividad de 10.7%, principalmente asociada con influenza A(H3N2). La circulación de VSR continuó aumentando, alcanzando 2.0%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en 5.5%. Los casos de IRAG disminuyeron.

Continúa en la siguiente página





- **Chile:** La actividad de influenza A disminuyó, aunque permaneció elevada (16.2%). La actividad de SARS-CoV-2 continuó en aumento, alcanzando una positividad de 8.6%, mientras que la circulación de VSR se mantuvo baja y estable (<1%). La influenza representó la mayor proporción de los casos de IRAG (13%).
- **Paraguay:** La actividad de influenza disminuyó durante dos SE consecutivas, alcanzando 12.4%, con la mayoría de los casos atribuidos a influenza B. La actividad de VSR continuó disminuyendo (1.1%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en 6.4%.
- **Uruguay:** La actividad de influenza y VSR se mantuvo baja y estable. La actividad de SARS-CoV-2 disminuyó en esta SE, alcanzando una positividad de 12.5%.







Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América




Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur




RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen COVID-19 Influenza RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE

Pathog... COVID-19 Influenza RSV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Influenza, COVID-19 and RSV Hospitalization Rates (cases per 100 000 population)/Tasas de hospitalización para Influenza, VRS y COVID-19 (casos por 100.000 habitantes)




Open data set available at: [Rates of Laboratory-Confirmed RSV, COVID-19, and Flu Hospitalizations from the RESP-NET Surveillance Systems | Data | Centers for Disease Control and Prevention](https://www.cdc.gov/respiratory/RSV/COVID-19/Flu/Hospitalizations/)




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2.



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




● ADENO ● Boca ● Corona ● METAPNEUMO ● PARAINFLUENZA ▶






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




● ADENO ● Boca ● Corona ● METAPNEU... ● PARAINFLUE... ● RHINO


Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID



No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus

No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus

No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID



No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus

No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

