

LINFOMA DE HODGKIN

SEÑALES DE ALERTA Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO

Neoplasia maligna del sistema linfático, caracterizada por la presencia de células de Reed-Sternberg

ALTO ÍNDICE DE CURACIÓN CUANDO SE DIAGNOSTICA DE FORMA ADECUADA Y TEMPRANA

EPIDEMIOLOGÍA ¿EN QUIÉN SOSPECHARLO?



6% de los cánceres infantiles




Más frecuente en adolescentes (15–19 años)

Mayor riesgo en pacientes con:




✓ **Inmunodeficiencias**



✓ **Infección por virus de Epstein-Barr**

SIGNO CARDINAL DE ALARMA ADENOPATÍA INDOLORA PERSISTENTE

- ✓ **Indolora**
- ✓ **Firme** (consistencia gomosa)
- ✓ **≥ 2 cm**
- ✓ **Cervical o supraclavicular** (más frecuente)
 - Axilar
 - Inguinal
 - Infradiafragmático
- ✓ **Persistente > 4 semanas**



SÍNTOMAS SISTÉMICOS SÍNTOMAS B



Fiebre inexplicable

Temperatura oral > 38 °C



Pérdida de peso

> 10 % en los últimos 6 meses (sin causa aparente)



Sudoración nocturna profusa



OTROS SÍNTOMAS O SIGNOS



• **Prurito generalizado**



• **Fatiga persistente**



• **Tos, disnea o dolor torácico** (sugiere masa mediastínica)

COMPROMISO EXTRAGANGLIONAR



Pulmón



Hígado



Hueso



Médula ósea

¿CUANDO REFERIR?

➔ Referir de inmediato a Hemato-Oncología Pediátrica ante la presencia de cualquiera de los signos o síntomas de alarma descritos

DIAGNÓSTICO OPORTUNO = ACCIÓN

Colaboración OPS-CLEHOP

Fortaleciendo el diagnóstico temprano del cáncer infantil