



Epidemiological week /
Semana epidemiológica:

2026-19

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios



Data as of May 22, 2026 /
Datos hasta el 22 de mayo de 2026



Respiratory Viruses Team / Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit / Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	USA
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ENG 3	BLZ
Summary/Resumen ESP	DOM
Summary/Resumen ESP 2	JAM
Summary/Resumen ESP 3	SUR
Regional INF	GUY
Regional INF 4 EW/SE	Subregional CAM.
Regional RSV	SLV
Regional SC-2	GTM
Regional ORV	HND
Regional SARI-IRAG	HND 2
% Positivity/%Positividad	NIC
Regional ILI- ETI	PAN
Subregional NAM	Subregional AND.
Subregional CAR.	BOL
Subregional CAM.	BOL 2
Subregional AND.	COL
Subregional BSC.	COL 2
	ECU
	PER
	PER 2
	Subregional BSC.
	ARG
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-prevention-and-control/communicable-disease-surveillance-and-response/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional situation:

In EW 19 of 2026, respiratory virus activity in the Region of the Americas deepens the pattern of inter-hemispheric seasonal transition observed in previous weeks, with an increasingly marked divergence between hemispheres. North America, the Caribbean, and Central America are consolidating the end of the 2025–2026 season, with influenza positivity at low levels close to the interseasonal baseline. In contrast, Brazil and the Southern Cone establish themselves as the subregion of greatest epidemiological relevance for this reporting period, intensifying an accelerated upward trend of the start of the austral winter season, led by Argentina. The Andean Subregion maintains a mixed pattern, with an aggregate decline in influenza but divergent trajectories between countries and with RSV cases that continue to rise. The inter-hemispheric predominance of subtypes persists: influenza B, which has characterized the end of the Northern Hemisphere season, and influenza A, mainly A(H3N2), in the subregions of the Southern Hemisphere. Likewise, RSV shows opposite patterns according to hemisphere: declining in North America and rising in the Andean Region and in Brazil and the Southern Cone, consistent with the start of the austral season. SARS-CoV-2 maintains its generalized decline in all subregions, with no sign of resurgence. The burden of SARI and ILI is declining in the Northern Hemisphere, while the indicators are beginning to reflect an increase in the Southern Cone.

North America:

The subregion is consolidating the end of the Northern Hemisphere influenza season. Subregional influenza positivity continues its sustained decline, falling below 5% and approaching the interseasonal baseline, with a sustained predominance of influenza B in the characterizations of the last 4 weeks. RSV continues its sustained downward trend and SARS-CoV-2 remains at low levels with a downward trend. ILI and SARI indicators continue to approach the interseasonal baseline. The activity of other respiratory viruses persists at elevated levels, with a springtime resurgence of rhinovirus and metapneumovirus.

By country

- **Canada:** Influenza activity continues its post-peak decline, maintaining the marked predominance of influenza B (close to 90% of recent characterizations). RSV and SARS-CoV-2 maintain their downward trend toward low levels. The activity of other respiratory viruses persists at elevated levels, particularly rhinovirus and metapneumovirus, consistent with the springtime resurgence characteristic of the subregion.
- **United States:** The sustained downward trend is maintained in the three main respiratory viruses monitored. Influenza positivity stands at approximately 1.9%, RSV at 1.7%, and SARS-CoV-2 close to 0.7%, all in continuous decline toward the interseasonal baseline.
- **Mexico:** Influenza activity continues its sustained decline after the winter peak, maintaining the predominance of A(H3N2) in the characterizations of the last 4 weeks (approximately 75%), with a minor presence of influenza B. RSV remains stable at low levels and SARS-CoV-2 with minimal circulation. The activity of other respiratory viruses shows a slight resurgence.

Caribbean:

The subregion is consolidating the end of the Northern Hemisphere season, with subregional influenza positivity stabilized at low levels, in continuity with the post-peak decline (2.3%) and close to interseasonal levels. In the last 4 weeks, the cocirculation characteristic of the subregion persists, with B Victoria and A(H3N2) as the majority components and A(H1N1)pdm09 in a smaller proportion. SARI and ILI indicators maintain the decline consistent with the end of the season. RSV and SARS-CoV-2 remain at low interseasonal levels. The low volume of samples notified by the countries of the subregion (in several cases, between 1 and 3 positive samples per country, or with data reflecting residual circulation) limits the specificity of the analysis at the country level; trends should be interpreted in an aggregate manner and with caution.

Continues on the next page





Central America:

The subregion is completing its post-peak decline of influenza, with subregional positivity stabilizing at low levels, in continuity with the downward trajectory recorded (8.8%). The predominance of A(H3N2) persists in the characterizations of the last 4 weeks, with cocirculation of influenza B in a smaller proportion. SARI and ILI indicators maintain the post-peak decline, progressively approaching the interseasonal baseline. RSV and SARS-CoV-2 remain stable at low levels. The activity of other respiratory viruses persists at elevated levels in several countries, with rhinovirus as the main contributor.

By country

- **El Salvador:** Influenza activity continues its post-peak decline, with an almost exclusive predominance of A(H3N2). RSV and SARS-CoV-2 remain at low levels.
- **Guatemala:** Maintains the post-peak decline that began in mid-March, with a predominance of A(H3N2) and cocirculation of influenza B in a smaller proportion. The activity of other respiratory viruses persists at elevated levels, with rhinovirus as the main contributor.
- **Honduras:** The post-peak decline persists, with influenza positivity stable at low levels and a diverse subtype distribution, with cocirculation of A(H3N2) and influenza B. SARI and ILI cases remain below the epidemic threshold.
- **Nicaragua:** Influenza activity remains at low levels, with a predominance of A(H3N2). RSV shows a slight upward trend, consistent with the hypothesis of an early start of the season raised in previous weeks. The activity of other respiratory viruses remains active.
- **Panama:** The post-peak downward trend of influenza continues. RSV maintains a slight sustained increase and SARS-CoV-2 remains at low levels.

Andean Subregion:

The subregion maintains a general downward trend in influenza positivity, in continuity with the post-peak trajectory of previous weeks (7% positivity), but with divergent trajectories at the country level and a sustained predominance of influenza A in recent characterizations. The most relevant epidemiological element of the subregion continues to be the sustained rise of RSV, which remains the subregion with the highest circulation of this virus in the Americas. SARS-CoV-2 remains at low levels. SARI and ILI indicators show a general decline, with a slight increase in the proportion of SARI cases positive for influenza and a growing increase of RSV as a codominant agent of severe respiratory disease.

By country

- **Bolivia:** Influenza activity persists at elevated levels, contrasting with the subregional pattern, with an almost exclusive predominance of influenza A. SARI and ILI cases remain elevated, with influenza as the main causative agent. RSV and SARS-CoV-2 remain at low levels. Bolivia continues to be the country with the highest influenza activity in the subregion.
- **Colombia:** Influenza activity remains at moderate to low levels with a downward trend, with influenza A being the most characterized. RSV continues as the main epidemiological contributor of the subregion, codominant with influenza as a causative agent of SARI. ILI cases show a decline.
- **Ecuador:** The post-peak decline of influenza continues. RSV persists at moderate to high levels with a sustained upward trend, positioning itself as one of the countries with the highest RSV circulation in the subregion, which justifies close monitoring of the pressure on pediatric services. SARS-CoV-2 remains low.
- **Peru:** Maintains the sustained decline of influenza, with a predominance of influenza A. RSV shows an upward trend and SARS-CoV-2 remains in decline.

Continues on the next page





Brazil and the Southern Cone:

Key subregion for this reporting period. The transition toward the austral winter season is consolidating and intensifying, with subregional influenza positivity maintaining a sustained upward trajectory (9.4% in this reporting period), and a predominance of influenza A as the dominant subtype in the characterizations of the last 4 weeks. RSV accompanies this seasonal dynamic with a sustained rise, positioning itself as the second virus in relevance after influenza. SARS-CoV-2 continues its decline, at low interseasonal levels. SARI and ILI indicators show an incipient increase, anticipating greater pressure on health services in the coming weeks. Given the pace of the virological rise, it is recommended to prioritize risk communication actions, reinforcement of influenza vaccination, and preparation of hospital capacity.

By country

- **Argentina:** Presents the most marked rise in the region, with a trajectory of an early and accelerated start of the season. Influenza positivity remains high after the rise recorded in previous weeks (19.1% in this reporting period), with a massive predominance of influenza A. RSV and SARS-CoV-2 remain at low levels.
- **Brazil:** Influenza activity maintains a moderate upward trend, with a sustained predominance of A(H3N2). RSV shows a sustained rise, positioning itself as the virus of relevance in transmission. SARS-CoV-2 continues its sustained decline.
- **Chile:** The moderate upward trend of influenza continues, with a predominance of influenza A. RSV remains at low levels. ILI indicators continue to rise, while SARI indicators show a moderate evolution.
- **Paraguay:** After a prolonged plateau at elevated levels for several weeks, influenza activity shows signs of decline in positivity, maintaining the predominance of A(H3N2). RSV and SARS-CoV-2 remain at low levels.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO | Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org/epidemiological-alerts-and-updates).





Situación regional:

En la SE 19 de 2026, la actividad de virus respiratorios en la Región de las Américas profundiza el patrón de transición estacional inter-hemisférica observado en las semanas previas, con una divergencia cada vez más marcada entre hemisferios. América del Norte, el Caribe y Centroamérica consolidan el fin de la temporada 2025–2026, con positivities de influenza en niveles bajos próximos a la línea de base interestacional. En contraste, Brasil y el Cono Sur se afirman como la subregión de mayor relevancia epidemiológica para este periodo de reporte, intensificando una tendencia ascendente y acelerada de inicio de temporada invernal austral, liderada por Argentina. La Subregión Andina mantiene un patrón mixto, con descenso agregado de influenza pero trayectorias divergentes entre países y con casos de VRS que continúan en ascenso. Persiste el predominio inter-hemisférico de subtipos: influenza B que ha caracterizado el cierre de temporada del Hemisferio Norte e influenza A, principalmente A(H3N2), en las subregiones del Hemisferio Sur. Igualmente el VRS muestra patrones opuestos según hemisferio: en descenso en América del Norte y en ascenso en la Región Andina y en Brasil y el Cono Sur, consistente con el inicio de la temporada austral. El SARS-CoV-2 mantiene su descenso generalizado en todas las subregiones, sin señal de resurgimiento. La carga de IRAG y ETI desciende en el Hemisferio Norte, mientras los indicadores comienzan a reflejar un incremento en el Cono Sur.

América del Norte:

La subregión consolida el fin de temporada de influenza del Hemisferio Norte. La positividad subregional de influenza continúa su descenso sostenido, ubicándose por debajo del 5% y aproximándose a la línea de base interestacional, con predominio sostenido de influenza B en las caracterizaciones de las últimas 4 semanas. El VRS continua su tendencia descendente sostenida y el SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos con tendencia a la baja. Los indicadores de ETI e IRAG continúan acercándose a la línea de base interestacional. La actividad de otros virus respiratorios persiste elevada, con un repunte primaveral de rinovirus y metapneumovirus.

Por país

- **Canadá:** La actividad de influenza continúa su descenso post-pico, manteniendo el predominio marcado de influenza B (cercano al 90% de las caracterizaciones recientes). El VRS y el SARS-CoV-2 mantienen su tendencia descendente hacia niveles bajos. La actividad de otros virus respiratorios persiste elevada, particularmente rinovirus y metapneumovirus, consistente con el repunte primaveral característico de la subregión.
- **Estados Unidos:** Se mantiene la tendencia descendente sostenida en los tres virus respiratorios principales monitoreados. La positividad de influenza se ubica en aproximadamente 1,9%, el VRS en 1,7% y el SARS-CoV-2 cercano al 0,7%, todos en descenso continuo hacia la línea de base interestacional.
- **México:** La actividad de influenza continúa en descenso sostenido tras el pico de invierno, manteniendo el predominio de A(H3N2) en las caracterizaciones de las últimas 4 semanas (aproximadamente 75%), con presencia menor de influenza B. El VRS se mantiene estable en niveles bajos y el SARS-CoV-2 con circulación mínima. La actividad de otros virus respiratorios muestra un leve repunte.

Caribe:

La subregión consolida el fin de temporada del Hemisferio Norte, con la positividad subregional de influenza estabilizada en niveles bajos, en continuidad con el descenso post-pico (2,3%) y próxima a niveles interestacionales. En las últimas 4 semanas persiste la cocirculación característica de la subregión, con B Victoria y A(H3N2) como componentes mayoritarios y A(H1N1)pdm09 en menor proporción. Los indicadores de IRAG y ETI mantienen el descenso consistente con el cierre de temporada. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen en niveles bajos interestacionales. El bajo volumen de muestras notificadas por los países de la subregión (en varios casos, entre 1 y 3 muestras positivas por país, o con datos que reflejan circulación residual) limita la especificidad del análisis a nivel de país; las tendencias deben interpretarse de forma agregada y con cautela.

Continúa en la siguiente página





Centroamérica:

La subregión completa su descenso post-pico de influenza, con la positividad subregional estabilizándose en niveles bajos, en continuidad con la trayectoria descendente registrada (8,8%). Persiste el predominio de A(H3N2) en las caracterizaciones de las últimas 4 semanas, con cocirculación de influenza B en proporción menor. Los indicadores de IRAG y ETI mantienen el descenso post-pico, aproximándose progresivamente a la línea de base interestacional. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen estables en niveles bajos. La actividad de otros virus respiratorios persiste elevada en varios países, con rinovirus como principal contribuyente.

Por país

- **El Salvador:** La actividad de influenza continúa su descenso post-pico, con predominio casi exclusivo de A(H3N2). El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen en niveles bajos.
- **Guatemala:** Mantiene el descenso post-pico iniciado a mediados de marzo, con predominio de A(H3N2) y cocirculación de influenza B en proporción menor. La actividad de otros virus respiratorios persiste elevada, con rinovirus como principal contribuyente.
- **Honduras:** Persiste el descenso post-pico, con positividad de influenza estable en niveles bajos y una distribución de subtipos diversa, con cocirculación de A(H3N2) e influenza B. Los casos de IRAG y ETI se mantienen por debajo del umbral epidémico.
- **Nicaragua:** La actividad de influenza se mantiene en niveles bajos, con predominio de A(H3N2). El VRS muestra una tendencia ascendente leve, consistente con la hipótesis de un inicio de temporada temprano planteada en semanas previas. La actividad de otros virus respiratorios permanece activa.
- **Panamá:** Continúa la tendencia descendente post-pico de influenza. El VRS mantiene un leve aumento sostenido y el SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos.

Subregión Andina:

La subregión mantiene una tendencia general descendente en la positividad de influenza, en continuidad con la trayectoria post-pico de las semanas previas (7% de positividad), pero con trayectorias divergentes a nivel de país y predominio sostenido de influenza A en las caracterizaciones recientes. El elemento epidemiológico más relevante de la subregión continúa siendo el ascenso sostenido del VRS, que se mantiene como la subregión con mayor circulación de este virus en las Américas. El SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos. Los indicadores de IRAG y ETI muestran descenso general, con un leve aumento en la proporción de casos de IRAG positivos a influenza y un aumento creciente del VRS como agente codominante de la enfermedad respiratoria grave.

Por país

- **Bolivia:** La actividad de influenza persiste en niveles elevados, contrastando con el patrón subregional, con predominio casi exclusivo de influenza A. Los casos de IRAG y ETI se mantienen elevados, con influenza como principal causante. El VRS y el SARS-CoV-2 permanecen en niveles bajos. Bolivia continúa siendo el país con la actividad de influenza más alta de la subregión.
- **Colombia:** La actividad de influenza se mantiene en niveles moderados a bajos con tendencia descendente, siendo influenza A la mayormente caracterizada. El VRS continúa como principal contribuyente epidemiológico de la subregión, codominante con influenza como causante de IRAG. Los casos de ETI muestran descenso.
- **Ecuador:** Continúa el descenso post-pico de influenza. El VRS persiste en niveles moderados a altos con tendencia ascendente sostenida, posicionándose como uno de los países con mayor circulación de VRS de la subregión, lo que justifica un monitoreo estrecho de la presión sobre los servicios pediátricos. El SARS-CoV-2 permanece bajo.
- **Perú:** Mantiene el descenso sostenido de influenza, con predominio de influenza A. El VRS muestra una tendencia ascendente y el SARS-CoV-2 se mantiene en descenso.

Continúa en la siguiente página





Brasil y el Cono Sur:

Subregión clave para este periodo de reporte. Se consolida e intensifica la transición hacia la temporada invernal austral, con la positividad subregional de influenza manteniendo una trayectoria ascendente sostenida (9,4% en este periodo de reporte), y predominio de influenza A como subtipo dominante en las caracterizaciones de las últimas 4 semanas. El VRS acompaña esta dinámica estacional con ascenso sostenido, posicionándose como el segundo virus en relevancia tras influenza. El SARS-CoV-2 continúa su descenso, en niveles interestacionales bajos. Los indicadores de IRAG y ETI muestran un incremento incipiente, anticipando una mayor presión sobre los servicios de salud en las próximas semanas. Dado el ritmo del ascenso virológico, se recomienda priorizar acciones de comunicación de riesgo, refuerzo de la vacunación antigripal y preparación de la capacidad hospitalaria.

Por país

- **Argentina:** Presenta el ascenso más marcado de la región, con una trayectoria de inicio de temporada temprano y acelerado. La positividad de influenza se mantiene alta tras el ascenso registrado en semanas previas (19,1% en este periodo de reporte), con predominio masivo de influenza A. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen en niveles bajos.
- **Brasil:** La actividad de influenza mantiene una tendencia al alza moderada, con predominio sostenido de A(H3N2). El VRS muestra un ascenso sostenido, posicionándose como el virus en relevancia de transmisión. El SARS-CoV-2 continúa su descenso sostenido.
- **Chile:** Continúa la tendencia ascendente moderada de influenza, con predominio de influenza A. El VRS se mantiene en niveles bajos. Los indicadores de ETI continúan al alza, mientras los de IRAG muestran una evolución moderada.
- **Paraguay:** Tras una meseta prolongada en niveles elevados durante varias semanas, la actividad de influenza muestra señales de descenso en la positividad, manteniendo el predominio de A(H3N2). El VRS y el SARS-CoV-2 permanecen en niveles bajos.







Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad




Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina









Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur











RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas

● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE

Pathog... ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE





Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de OVR




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N2009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2.




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1





ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE





SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE





ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE y % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE y % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA



SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE





ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE y % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE y % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE





SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE y % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE y % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV

