

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026–26

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of July 10, 2026/
Datos hasta el 10 de julio de 2026

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	MEX 2
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ENG 3	BLZ
Summary/Resumen ESP	DOM
Summary/Resumen ESP 2	HTI
Summary/Resumen ESP 3	JAM
Regional INF	LCA
Regional INF 4 EW/SE	SUR
Regional RSV	BRB
Regional SC-2	CYM
Regional ORV	GUY
Regional SARI-IRAG	GUY 2
% Positivity/%Positividad	VCT
Regional ILI- ETI	Subregional CAM.
Subregional NAM	SLV
Subregional CAR.	GTM
Subregional CAM.	GTM 2
Subregional AND.	HND
Subregional BSC.	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2



The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>



Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/tools/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation:

During epidemiological week 26, influenza activity in the Region of the Americas remains stable. In North America, a downward trend is observed, with low levels of circulation. The Caribbean and Central America continue to show low activity, with positivity rates of 5.5% and 9.4%, respectively, while the Andean Region shows a slight increase, with a positivity rate of 7.5%. In contrast, Brazil and the Southern Cone are experiencing a sustained increase in activity, with a positivity rate of 16.3% in EW26. Regionally, influenza A remains the predominant virus, accounting for 57.1% of subtyped samples, with influenza A(H3N2) accounting for 20.6%. In North America and the Caribbean, influenza B is the predominant strain detected. The RSV shows an upward trend, primarily in Central America, Brazil, and the Southern Cone. Meanwhile, SARS-CoV-2 circulation remains stable and at low levels in most subregions, except for the Caribbean, where it reached a positivity rate of 10.6% for the most recent epidemiological week. Hospitalizations for acute respiratory infections (SARI) are trending downward, while outpatient visits for respiratory tract infections (ILI) are trending upward in the Caribbean, primarily related to the circulation of SARS-CoV-2.

North America: Influenza activity remains low and stable, with a regional positivity rate below 1% in EW26, during the inter-seasonal period. Influenza B is the predominant strain, accounting for 62% of cases. Both hospitalizations for severe acute respiratory infections (SARI) and outpatient visits for acute respiratory infections (ILI) remain at low levels. Respiratory syncytial virus (RSV) and SARS-CoV-2 levels remain low and stable.

By country

- **Canada:** Influenza activity remains low, with a positivity rate of 0.7% in EW26, with unsub typed influenza B continuing to predominate at 83.2%. RSV and SARS-CoV-2 continue their downward trend, with positivity rates below 1%. Activity of other respiratory viruses continues to trend upward, with rhinovirus predominating.
- **Mexico:** Influenza activity continues to decline steadily, with a positivity rate of 4.1% in EW26 and influenza A(H3N2) predominating (56.8%). RSV remains stable at low levels of circulation (1.1%). Meanwhile, SARS-CoV-2 circulation has shown an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 11.2%.

Caribbean: Influenza activity shows a slight upward trend, with a regional positivity rate of 5.2% in EW26, with influenza B Victoria predominating (38.7%) and A(H3N2) co-circulating (24%). SARI indicators remain at low levels, while ILI have increased in recent weeks. RSV circulation remains low, while SARS-CoV-2 levels remain high, though trending downward, with a positivity rate of 10.1% for EW26.

By country

- **Dominican Republic:** Influenza activity reached a positivity rate of 12% in EW26. Over the past four weeks, a decline has been observed in the detection of RSV and SARS-CoV-2, which reached a positivity rate of 2.7%.
- **Cayman Islands:** A slight increase in SARS-CoV-2 circulation was recorded over the past four weeks, reaching a positivity rate of 8.9% in EW26, although this is attributable to a small number of positive samples.
- **Guyana:** Influenza and RSV activity remains low and stable, with influenza type B predominating; an increase in SARS-CoV-2 circulation has been recorded over the past four weeks, reaching a positivity rate of 19.2% in EW26. Consultations for acute respiratory infections show an upward trend, primarily related to SARS-CoV-2 circulation.

Central America: Influenza activity remains stable in the subregion, with a positivity rate of nearly 10% over the past three weeks and a predominance of influenza A(H3N2) (62.8%). In contrast, RSV circulation continues to rise, reaching a positivity rate of 19.1%. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low levels and shows a sustained downward trend, with a positivity rate of 2%.

Continues on the next page





By Country

- **El Salvador:** Influenza activity remains high, with a slight decline during EW26, with a positivity rate of 12.8% and a predominance of A(H3N2) at 89.5%.
- **Guatemala:** Influenza activity is low and stable, with a positivity rate of 1.6% and predominant circulation of influenza A(H3N2); transmissibility levels remain below the epidemic threshold. RSV circulation decreased during the past week, with a positivity rate of 7.9% in EW26. Meanwhile, SARS-CoV-2 showed a slight upward trend (5.7% in EW25 and 10.2% in EW26). Hospitalizations for severe acute respiratory infections (SARI) and outpatient visits for acute respiratory infections (ILI) remain low.
- **Honduras:** An upward trend in influenza circulation is observed; the positivity rate increased from 0.8% in EW24 to 7.9% in EW26, with a small number of viral detections. Among positive cases, influenza A(H3N2) predominated, accounting for 75% of subtyped samples. Similarly, SARS-CoV-2 shows an upward trend, with the positivity rate increasing from 1.2% in EW23 to 11.4% in EW26.
- **Nicaragua:** Influenza activity showed an upward trend over the last four epidemiological weeks, with a positivity rate of 9.2%; transmissibility levels are above the epidemic threshold. RSV continued to increase, reaching a positivity rate of nearly 28.1% in EW26, while SARS-CoV-2 remained at low and stable levels, with a positivity rate below 1%.
- **Panama:** Influenza activity remains high, although it is trending downward, with a positivity rate of 17.5% in EW26. Influenza A(H3N2) is the predominant circulating strain, accounting for 87.4% of subtyped samples; transmissibility levels remain above the epidemic threshold. Meanwhile, RSV continues to show an upward trend, with a positivity rate that rose from 11.2% in EW24 to 20.8% in EW26.

Andean subregion: The subregion continues to show a stable trend in influenza circulation, with a positivity rate of 7.5% in EW26. Among the subtyped samples, influenza A(H3N2) predominates, accounting for 34.2%. In contrast, RSV continues to show a sustained decline, with a positivity rate that fell from 12.1% in EW23 to 7.1% in EW26, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. The indicators for ILI and SARI show an overall downward trend.

By country

- **Bolivia:** The rise in influenza circulation continues, with a positivity rate of 11.1% in EW26; transmissibility levels are above the moderate threshold. Influenza A(H1N1) is the predominant strain, accounting for 80% of cases. RSV shows an upward trend (from 5.9% in week 23 to 10.2% in EW26), while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Colombia:** Influenza activity remains at low levels but is trending upward, with a positivity rate of 8.1% in EW26. Meanwhile, RSV continues to circulate at moderate levels, with a positivity rate of 8.9%, although its levels have fluctuated in recent weeks. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Ecuador:** Influenza activity remains low and stable, with a positivity rate of 4.5% in EW26. In contrast, RSV continues to show a sustained upward trend, with the positivity rate rising from 17.2% in EW24 to 25.1% in EW26. Meanwhile, SARS-CoV-2 continues to circulate at low levels, with a positivity rate of 4.9%.
- **Peru:** Influenza activity continues to show a low and stable trend, with a positivity rate of 5.7% in epidemiological EW26. In contrast, RSV has maintained a downward trend over the last four epidemiological weeks. Meanwhile, SARS-CoV-2 continues to circulate at low levels.
- **Venezuela:** Influenza activity has increased over the past four epidemiological weeks. Influenza A(H3N2) is the predominant strain in circulation. Meanwhile, the circulation of RSV and SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.

Continues on the next page





Brazil and the Southern Cone: The subregion is in the Southern Hemisphere winter season, with a sustained increase in influenza activity, with a positivity rate reaching 16.3% in EW26. Influenza A(H3N2) is the predominant strain, with influenza B co-circulating. RSV is following this seasonal trend and continues to rise, with a positivity rate of 12.8% in EW26. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. Indicators for ILI and SARI cases show a downward trend over the past four weeks.

By Country

- **Argentina:** Influenza activity remains high, consistent with the winter season, reaching a positivity rate of 34% in EW26. Unsubtyped influenza A is the predominant strain, and transmissibility levels remain above the high threshold. Meanwhile, both RSV and SARS-CoV-2 remain at low levels of circulation; however, they show a slight upward trend.
- **Brazil:** Influenza activity has remained at moderate and stable levels over the past few weeks, with a positivity rate of 6.9% in EW26. Influenza B is the predominant strain, account for 63.2% of subtyped samples. Meanwhile, RSV continues to show a high trend, reaching a positivity rate of 16.2% in EW26, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Chile:** Influenza activity continues to rise, with the positivity rate increasing from 26.7% in EW23 to 33.1% in EW26. Unsubtyped influenza A is the predominant strain in circulation, and transmissibility levels remain above the high threshold, consistent with the observed increase in ILI cases. RSV has begun an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 7.2% in EW26. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Paraguay:** Influenza activity remains at high levels, with a positivity rate of 15.5% in EW26. Influenza A(H3N2) is the predominant strain, accounting for 93.6% of subtyped samples, and transmissibility levels remain above the seasonal threshold. Meanwhile, RSV shows an upward trend and reached a positivity rate of 12.7% in EW25. SARS-CoV-2 remains at low levels. RSV continues to be the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Uruguay:** Influenza activity continues to rise, with a sustained increase in positivity that reached 27.9% in EW26. Influenza A(H3N2) is the predominant circulating strain, while transmissibility levels remain above the epidemic threshold. RSV has begun an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 11.7% in EW26. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).



Situación regional: en la semana epidemiológica 26 la actividad de influenza en la Región de las Américas se mantiene estable. En América del Norte se observa una tendencia descendente, con niveles bajos de circulación. El Caribe y Centroamérica mantienen una actividad baja, con un porcentaje de positividad del 5,5% y 9,4% respectivamente, mientras que la Región Andina presenta un ligero ascenso, con una positividad del 7,5%. En contraste, en Brasil y el Cono Sur se registra un incremento sostenido de la actividad, con un porcentaje de positividad del 16,3% en la SE26. A nivel regional, influenza A sigue siendo el virus predominante representando el 57,1% entre las muestras subtipificadas, influenza A(H3N2) representa el 20,6%. En América del Norte y el Caribe predomina la detección de influenza tipo B. El VSR muestra una tendencia ascendente principalmente en Centroamérica y Brasil y el Cono Sur. Por su parte, la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable y en niveles bajos en la mayoría de las subregiones a excepción del Caribe donde alcanza un porcentaje de positividad del 10,6% para la última semana epidemiológica. Las hospitalizaciones por IRAG muestran una tendencia descendente mientras que las consultas por ETI muestran una tendencia al ascenso en el Caribe, principalmente relacionadas con la circulación de SARS-CoV-2.

América del Norte: la actividad de influenza se mantiene baja y estable, con una positividad regional inferior al 1% en la SE26, en el contexto del periodo interestacional. Predomina la circulación de influenza tipo B con el 62%. Tanto las hospitalizaciones por IRAG como las consultas por ETI se mantienen en niveles bajos. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen bajos y estables.

Por país

- **Canadá:** la actividad de influenza permanece baja, con una positividad del 0,7% en la SE26, manteniendo el predominio de influenza B no subtipificada con el 83,2%. El VRS y el SARS-CoV-2 continúan tendencia descendente, con positivities inferiores al 1%. La actividad de otros virus respiratorios permanece con tendencia al aumento, con predominio de rinovirus.
- **México:** la actividad de influenza continúa en descenso sostenido, con una positividad de 4,1% en la SE26 y predominio de influenza A(H3N2) (56,8%). El VRS se mantiene estable en niveles bajos de circulación (1,1%). Por su parte, SARS-CoV-2 presenta una circulación con tendencia al ascenso en las últimas cuatro semanas, alcanzando una positividad del 11,2%.

Caribe: la actividad de influenza presenta una leve tendencia al ascenso, con una positividad regional de 5,2% en la SE26, con predominio de influenza B Victoria (38,7%) y cocirculación de A(H3N2) (24%). Los indicadores de IRAG se mantienen en niveles bajos mientras que las consultas por ETI presentan un incremento en las últimas semanas. La circulación del VSR permanece baja, mientras que SARS-CoV-2 continúa elevado, aunque con tendencia al descenso, con positividad del 10,1% para la SE26.

Por país

- **República Dominicana:** la actividad de influenza alcanza una positividad del 12% en la SE26. Durante las últimas cuatro semanas se identifica un descenso en la detección de VSR y SARS-CoV-2 el cual alcanzó una positividad del 2,7%.
- **Islas Caimán:** se registra un leve aumento en la circulación de SARS-CoV-2 durante las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad del 8,9% en la SE26, aunque atribuible a un número reducido de muestras positivas.
- **Guyana:** la actividad de influenza y VSR se mantiene baja y estable, con predominio en la detección de influenza tipo B; se registra un aumento en la circulación de SARS-CoV-2 durante las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad del 19,2% en la SE26. Las consultas por ETI muestran una tendencia al ascenso, principalmente relacionadas con la circulación de SARS-CoV-2.

Centroamérica: la actividad de influenza se mantiene estable en la subregión, con una positividad cercana al 10% durante las últimas tres semanas y predominio de influenza A(H3N2) (62,8%). En contraste, la circulación del VRS continúa en ascenso, alcanzando una positividad de 19,1%. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y muestra una tendencia descendente sostenida, con una positividad de 2%.

Continúa en la siguiente página





Por país

- **El Salvador:** la actividad de influenza se mantiene elevada con ligero descenso durante la SE26, con positividad del 12,8% con predominio de A(H3N2) con el 89,5%.
- **Guatemala:** la actividad de influenza es baja y estable, con una positividad del 1,6% y circulación predominante de influenza A(H3N2), los niveles de transmisibilidad se ubican bajo el umbral epidémico. La circulación de VSR disminuyó durante la última semana con una positividad de 7,9% en la SE22. Por su parte SARS-CoV-2 con leve tendencia al incremento (5,7% en SE 25 y 10,2% en SE26). Las hospitalizaciones por IRAG y las consultas por ETI se mantienen bajas.
- **Honduras:** se observa una tendencia al ascenso en la circulación de influenza, la positividad aumentó de 0,8% en la SE24 a 7,9% en la SE26, con un número reducido de detecciones virales. Entre los casos positivos, predominó influenza A(H3N2), que representó el 75% de las muestras subtipificadas. De manera similar SARS-CoV-2 presenta una tendencia al ascenso con positividad aumentó de 1,2% en la SE23 a 11,4% en la SE26.
- **Nicaragua:** la actividad de influenza mostró una tendencia ascendente durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas, con una positividad de 9,2%, los niveles de transmisibilidad se ubican sobre el umbral epidémico. El VRS continuó incrementándose y alcanzó una positividad cercana al 28,1% en la SE26, mientras que SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos y estables, con una positividad inferior al 1%.
- **Panamá:** la actividad de influenza continúa elevada, aunque con tendencia al descenso, con una positividad de 17,5% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), que representa el 87,4% de las muestras subtipificadas, los niveles de transmisibilidad se mantienen por encima del umbral epidémico. Por su parte, el VRS continúa mostrando una tendencia ascendente, con una positividad que aumentó de 11,2% en la SE24 a 20,8% en la SE26.

Subregión andina: la subregión mantiene una tendencia estable en la circulación de influenza, con una positividad de 7,5% en la SE26. Entre las muestras subtipificadas, predomina influenza A(H3N2) con el 34,2%. En contraste, el VRS continúa mostrando un descenso sostenido, con una positividad que pasó de 12,1% en la SE23 a 7,1% en la SE26, mientras que SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables. Los indicadores de ETI e IRAG presentan una tendencia general al descenso.

Por país

- **Bolivia:** continúa el ascenso en la circulación de influenza con un porcentaje de positividad del 11,1% en la SE26, los niveles de transmisibilidad se ubican sobre el umbral moderado. Predomina la detección de influenza A(H1N1) con el 80%. El VRS muestra una tendencia ascendente (5,9% en SE23 a 10,2% en SE26), el SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Colombia:** la actividad de influenza se mantiene en niveles bajos con tendencia al ascenso, con una positividad de 8,1% en la SE26. Por su parte, el VRS continúa circulando en niveles moderados, con una positividad de 8,9%, aunque con un comportamiento fluctuante en las últimas semanas. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en el país.
- **Ecuador:** la actividad de influenza continúa baja y estable con una positividad de 4,5% en la SE26. En contraste, el VRS mantiene una tendencia ascendente sostenida, con un incremento de la positividad de 17,2% en la SE24 a 25,1% en la SE26. Por su parte, SARS-CoV-2 continúa circulando en niveles bajos con una positividad de 4,9%.
- **Perú:** la actividad de influenza continúa mostrando una tendencia baja y estable, con una positividad de 5,7 % en la SE26. En contraste, el VRS mantiene una tendencia descendente en las últimas cuatro SE. Por su parte, SARS-CoV-2 continúa se mantiene en niveles bajos de circulación.
- **Venezuela:** la actividad de influenza mostró un incremento durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas. Predomina la circulación de influenza A(H3N2). Por su parte, la circulación de VRS y SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables.

Continúa en la siguiente página



Brasil y el Cono Sur: la subregión se encuentra en la temporada invernal austral, con un aumento sostenido de la actividad de influenza, cuya positividad alcanzó 16,3% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), con cocirculación de influenza tipo B. El VRS acompaña esta tendencia estacional y continúa en ascenso, con una positividad de 12,8% en la SE26. Por su parte, SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. Los indicadores de ETI e IRAG muestran una tendencia descendente en las últimas cuatro semanas.

Por país

- **Argentina:** la actividad de influenza continúa elevada correspondiente con la temporada invernal, alcanzando una positividad de 34% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A no subtipificada, los niveles de transmisibilidad se mantienen por encima del umbral alto. Por su parte, tanto el VRS como SARS-CoV-2 permanecen en niveles bajos de circulación; sin embargo, muestran una leve tendencia al ascenso.
- **Brasil:** la actividad de influenza se mantiene en niveles moderados y estables durante las últimas semanas, con una positividad de 6,9% en la SE26. Predomina la circulación de influenza B, que representa el 63,2% de las muestras subtipificadas. Por su parte, el VRS continúa mostrando una tendencia elevada, alcanzando una positividad de 16,2% en la SE26, mientras que SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Chile:** la actividad de influenza continúa en aumento, con una positividad que pasó de 26,7% en la SE23 a 33,1% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A no subtipificada, los niveles de transmisibilidad se mantienen por encima del umbral alto, en concordancia con el incremento observado en los casos ETI. El VSR ha comenzado una tendencia ascendente en las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad de 7,2% en la SE26. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Paraguay:** continúa la actividad de influenza en niveles elevados, con una positividad del 15,5% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), que representa el 93,6% de las muestras subtipificadas, los niveles de transmisibilidad continúan por encima del umbral estacional. Por su parte, el VRS muestra una tendencia ascendente y alcanzó una positividad de 12,7% en la SE25. SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en el país.
- **Uruguay:** la actividad de influenza continúa en ascenso, con un aumento sostenido de la positividad que alcanzó 27,9% en la SE26. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), mientras que los niveles de transmisibilidad se mantienen por encima del umbral epidémico. El VSR ha comenzado una tendencia ascendente en las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad de 11,7% en la SE26. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.


Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV




ADENO Boca Corona METAPNEU... PARAINFLUE... RHINO






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE




No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




EW




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR



ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWS/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

