



Epidemiological week /
Semana epidemiológica:

2026–30

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of Aug 07, 2026 /
Datos hasta el 07 de agosto de 2026



Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	MEX 2
Summary/Resumen ENG 2	USA
Summary/Resumen ENG 3	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP	BLZ
Summary/Resumen ESP 2	CUB
Summary/Resumen ESP 3	DOM
Regional INF	HTI
Regional INF 4 EW/SE	IAM
Regional RSV	LCA
Regional SC-2	SUR
Regional ORV	BRB
Regional SARI-IRAG	CYM
% Positivity/%Positividad	GUY
Regional ILI- ETI	GUY 2
Subregional NAM	VCT
Subregional CAR.	Subregional CAM.
Subregional CAM.	SLV
Subregional AND.	GTM
Subregional BSC.	GTM 2
	HND
	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>



Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).



Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
VRS: Virus Respiratorio Sincitial
SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2
OMS: Organización Mundial de la Salud
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/tools/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation: In epidemiological week 30, influenza activity in the Region of the Americas continues to trend downward. Low levels of circulation are observed in North America. The Caribbean and Central America continue to show low activity, although with an upward trend, with positivity rates of 9.6% and 9.9%, respectively. The Andean Region shows a stable trend, with a positivity rate of 6.4%. In contrast, Brazil and the Southern Cone are experiencing a sustained decline in activity, with a positivity rate of 10.7% in EW30. Regionally, influenza B is the predominant virus, accounting for 50.8% of all influenza-positive samples. In the Caribbean and in Brazil and the Southern Cone, influenza type B is the predominant strain detected, while in Central America and the Andean Region, influenza A(H3N2) is the predominant strain detected. RSV is showing an upward trend, primarily in Central America and in Brazil and the Southern Cone. Meanwhile, SARS-CoV-2 circulation remains stable and at low levels in most subregions, except for the Caribbean, where the positivity rate reaches 8.2%. Hospitalizations for severe acute respiratory infection (SARI) and outpatient visits for influenza-like illness (ILI) are showing a downward trend in all subregions.

North America: Influenza activity remains low and stable, with a positivity rate below 1% in EW30. Influenza B is the predominant strain, accounting for 58% of cases. Both hospitalizations for severe acute respiratory infection (SARI) and outpatient visits for influenza-like illness (ILI) remain at low levels. RSV and SARS-CoV-2 remain low and stable.

By country

- **Canada:** Influenza activity remains low, with a positivity rate of 0.6% in EW30, with influenza A predominating. RSV circulation remains low and stable, with a positivity rate below 1%, while SARS-CoV-2 activity is trending upward.
- **Mexico:** Influenza and RSV activity is low, with positivity rates of 4.6% and 1.4%, respectively, in EW30, and influenza B/Victoria is predominant (56.8%). Meanwhile, SARS-CoV-2 circulation has shown an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 21.9% in EW30. SARI and ILI cases remain at low levels.
- **United States:** Influenza and OVR activity remain low, with a positivity rate below 1% in EW30, and influenza A(H1N1)pdm09 predominating among influenza-positive samples.

Caribbean: Influenza activity continues to trend upward, with a regional positivity rate of 9.3% in EW30, with influenza A(H3N2) predominating (40.7%) and influenza B/Victoria co-circulating (36.1%). In Haiti, Jamaica, and Suriname, activity remains low, with increases in Saint Lucia, Barbados, and the Cayman Islands. SARI indicators and ILI cases remain low. The circulation of RSV and SARS-CoV-2 continues to be low at the regional level.

By country

- **Belize:** SARS-CoV-2 activity has increased in recent weeks, reaching a positivity rate of 28% in EW30. Meanwhile, the circulation of influenza and RSV remains low, with positivity rates below 1% and 5%, respectively.
- **Cuba:** Influenza activity remains high, reaching a positivity rate of 18.1% in EW30 and staying above the epidemic threshold. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been the predominant strain detected (52.6%), followed by influenza B/Victoria (21.1%).
- **Dominican Republic:** Influenza activity is trending upward, reaching a positivity rate of 17% in EW30, without exceeding the epidemic threshold. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been the predominant strain detected (94.4%). The circulation of RSV and SARS-CoV-2 remains low, with positivity rates below 1%.
- **Guyana:** A downward trend is observed in influenza circulation, with a positivity rate of nearly 4% in EW30 and a predominance of influenza B/Victoria (66.7%). SARS-CoV-2 circulation remains high, though trending downward, with a positivity rate of nearly 16% in EW30, while RSV shows a slight increase, reaching a positivity rate of 5%.

Continues on the next page



Central America: Influenza activity remains stable, with a regional positivity rate of nearly 10% in EW30. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been predominant (73.9%), followed by unsubtype influenza A (16.5%). RSV circulation is trending upward, with a positivity rate of 19%, while SARS-CoV-2 remains at low levels. ILI cases and hospitalizations for SARI have remained stable in recent weeks.

By Country

- **El Salvador:** Influenza activity is trending downward, with a positivity rate of 7% in EW30, predominantly influenza A(H3N2) (95.5%). Meanwhile, SARS-CoV-2 is trending upward, reaching a positivity rate of 12% in EW30, while RSV remains low, with a slight upward trend.
- **Guatemala:** Influenza circulation remains stable and below the epidemic threshold, with a positivity rate of 3.7% in EW30. Influenza B/Victoria is the predominant strain detected (69.2%), followed by influenza A(H3N2) (30.8%). RSV and SARS-CoV-2 show a sustained increase, with positivity rates of 15.7% and 20.1%, respectively. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Honduras:** Influenza activity has shown an upward trend over the past week, with a positivity rate of 4.5% in EW30, although it remains below the epidemic threshold. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at high levels, though with a downward trend, with a positivity rate of 16% in EW30, after reaching 20% in SE29. RSV activity remains low and stable.
- **Nicaragua:** Influenza activity remains stable, with transmissibility levels above the epidemic threshold and a positivity rate of 12% in EW30. Influenza A(H3N2) has been predominant over the past four weeks (73.8%). RSV circulation is high, with a positivity rate of nearly 23.6% in EW30, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Panama:** Influenza activity is trending downward, with a positivity rate of 15.7% in EW30, remaining above the epidemic threshold. Meanwhile, RSV continues to rise, with a positivity rate of 32.5%. SARS-CoV-2 has remained at low and stable levels in recent weeks.

Andean Subregion: In the subregion, influenza activity remains at low and stable levels, with a regional positivity rate of 6.9% in EW30. Among subtyped samples, influenza A(H3N2) predominates (34.4%), with less circulation of A(H1N1)pdm09 (6.4%). RSV activity remains high, although it is trending downward, while SARS-CoV-2 activity remains low, with a positivity rate of 2%. ILI cases and hospitalizations for SARI show a downward trend through EW30.

By country

- **Bolivia:** Influenza activity increased over the past four epidemiological weeks, with a positivity rate of 9.3% in EW30; transmissibility levels remain below the epidemic threshold. Influenza A(H1N1)pdm09 is the predominant strain, accounting for 75% of cases. RSV shows a stable trend (8.1% in EW30), while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Colombia:** Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 activity remains at low levels and is trending downward, with positivity rates of 6.3%, 6.6%, and 4.8%, respectively, in EW30. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Ecuador:** Influenza activity remains low, although it has shown an upward trend over the past week, with a positivity rate of 8.2% in EW30. In contrast, RSV continues a steady downward trend, with positivity rates ranging from 27.9% in SE27 to 16.2% in EW30. Meanwhile, SARS-CoV-2 continues to circulate at low levels, with a positivity rate of 3.5%. Influenza remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Peru:** Influenza activity continues to show a low and stable trend, with a positivity rate of 6.6% in EW30. In contrast, RSV has maintained a downward trend over the last four SE. Meanwhile, SARS-CoV-2 continues to circulate at low levels.
- **Venezuela:** Influenza activity has increased over the past four epidemiological weeks, with transmissibility levels above the epidemic threshold. Influenza A(H3N2) is the predominant strain, accounting for 54.5% of cases. Meanwhile, RSV circulation remains at low and stable levels, while SARS-CoV-2 continues to rise, reaching a positivity rate of 28.9%.

Continues on the next page





Brazil and the Southern Cone: The subregion is currently in the Southern Hemisphere winter season, with a decline in influenza activity over the past four weeks and a positivity rate of 10.1% in EW30. During this period, influenza B is the predominant strain, accounting for 58.6% of cases. RSV follows this seasonal trend and maintains a positivity rate of 13.3% in EW30. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. ILI and SARI indicators show a downward trend over the past four weeks.

By Country

- **Argentina:** Influenza activity has shown a downward trend over the past four weeks; however, transmissibility levels remain above the moderate threshold, with a positivity rate of 12.7% in EW30. Meanwhile, RSV activity shows an upward trend, reaching a positivity rate of 14.5% in the last week, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Brazil:** Influenza activity has remained at moderate and stable levels over the past few weeks, with a positivity rate of 7% in EW30. Influenza B is the predominant strain, accounting for 85.3% of subtyped samples. Meanwhile, RSV continues to show a high trend, reaching a positivity rate of 13.6% in EW30, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Chile:** Influenza activity remains high, although it is trending downward, with the positivity rate falling from 26.9% in SE27 to 22.4% in EW30. Unsubtyped influenza A is the predominant strain in circulation; transmissibility levels remain above the moderate threshold, consistent with the observed increase in ILI cases. RSV has continued an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 10.3% in EW30. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Paraguay:** Influenza activity continues to decline, with a positivity rate of 1.8% in EW30. Influenza A(H3N2) is the predominant strain, accounting for 77.1% of subtyped samples; transmissibility levels are below the seasonal threshold. Meanwhile, RSV shows an upward trend and reached a positivity rate of 27.2% in EW30. SARS-CoV-2 remains at low levels. RSV remains the primary virus associated with SARI cases.
- **Uruguay:** Influenza activity continues to decline, with a sustained decrease in positivity that reached 11.2% in EW30. Influenza A(H3N2) predominates, transmissibility levels are below the epidemic threshold. Meanwhile, RSV continues to rise, reaching a positivity rate of 34.5% in EW30. SARS-CoV-2, meanwhile, remains at low and stable levels. RSV remains the primary virus associated with SARI cases.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/programs/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO | Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org/en/topics/avian-influenza).





Situación regional: En la semana epidemiológica 30, la actividad de influenza en la Región de las Américas mantiene una tendencia al descenso. En América del Norte se observan bajos niveles de circulación. El Caribe y Centroamérica mantienen una actividad baja, aunque con tendencia al ascenso, con un porcentaje de positividad del 9,6% y 9,9% respectivamente. La Región Andina presenta una tendencia estable, con una positividad del 6,4%. En contraste, en Brasil y el Cono Sur se registra una disminución sostenida de la actividad, con un porcentaje de positividad del 10,7% en la SE30. A nivel regional, el virus de influenza B es el virus predominante representando el 50,8% del total de muestras positivas para influenza. En el Caribe y Brasil y el Cono Sur predomina la detección de influenza tipo B, mientras que en Centroamérica y la Región Andina predomina la detección de influenza A(H3N2). El VSR muestra una tendencia ascendente principalmente en Centroamérica y Brasil y el Cono Sur. Por su parte, la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable y en niveles bajos en la mayoría de las subregiones a excepción del Caribe donde alcanza un porcentaje de positividad del 8,2%. Las hospitalizaciones por IRAG y las consultas por ETI muestran una tendencia descendente en todas las subregiones.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene baja y estable, con una positividad inferior al 1 % en la SE30. Predomina la circulación de influenza tipo B con el 58 %. Tanto las hospitalizaciones por IRAG como las consultas por ETI se mantienen en niveles bajos. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen bajos y estables.

Por país

- **Canadá:** la actividad de influenza permanece baja, con una positividad del 0,6% en la SE30, con predominio de influenza A. La circulación de VRS continúa baja y estable, con positividad inferior al 1%, mientras que la actividad de y el SARS-CoV-2 presenta una tendencia al aumento.
- **México:** la actividad de influenza y VSR es baja con una positividad de 4,6% y 1,4% respectivamente en la SE30 y predominio de influenza B/Victoria (56,8%). Por su parte, SARS-CoV-2 presenta una circulación con tendencia al ascenso en las últimas cuatro semanas, alcanzando una positividad del 21,9% en la SE30. Tanto las hospitalizaciones por IRAG como las consultas por ETI se mantienen en niveles bajos.
- **Estados Unidos:** la actividad de influenza y OVR permanece baja, con una positividad inferior al 1% en la SE30, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 entre las muestras positivas para influenza.

Caribe: la actividad de influenza mantiene una tendencia al ascenso, con una positividad regional de 9,3% en la SE30, con predominio de influenza A(H3N2) (40,7%) y cocirculación de influenza B/Victoria (36,1%). En Haití, Jamaica y Surinam la actividad se mantiene baja, con incrementos en Santa Lucía, Barbados e Islas Caimán. Los indicadores de IRAG y las consultas por ETI permanecen bajos. La circulación de VSR y SARS-CoV-2 continúa siendo baja a nivel regional.

Por país

- **Belice:** la actividad de SARS-CoV-2 muestra un incremento en las últimas semanas, alcanzando una positividad del 28% en la SE30. Mientras que la circulación de influenza y VSR se mantiene baja, con positividad inferior al 1% y 5% respectivamente.
- **Cuba:** la actividad de influenza se mantiene elevada, alcanzando una positividad de 18,1% en la SE30 y manteniéndose por encima del umbral epidémico. En las últimas cuatro semanas predomina la detección de influenza A(H3N2) (52,6%), seguida de influenza B/Victoria (21,1%).
- **República Dominicana:** la actividad de influenza presenta una tendencia al ascenso, alcanzando una positividad de 17% en la SE30, sin superar el umbral epidémico. En las últimas cuatro semanas predomina la detección de influenza A(H3N2) (94,4%). La circulación de VSR y SARS-CoV-2 permanece baja, con positividad inferior al 1%.
- **Guyana:** se observa una tendencia al descenso en la circulación de influenza, con una positividad cercana al 4% en la SE30 y predominio de influenza B/Victoria (66,7%). La circulación de SARS-CoV-2 permanece elevada, aunque con tendencia al descenso, con una positividad cercana al 16% en la SE30, mientras que el VSR muestra un ligero incremento, alcanzando 5% de positividad.

Continúa en la siguiente página





Centroamérica: la actividad de influenza se mantiene estable, con una positividad regional cercana al 10% en la SE30. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2) (73,9%), seguida de influenza A no subtipificada (16,5%). La circulación de VSR muestra una tendencia al ascenso, con una positividad del 19%, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos. Las consultas por ETI al igual que las hospitalizaciones por IRAG muestran una tendencia estable en las últimas semanas.

Por países

- **El Salvador:** la actividad de influenza muestra una tendencia al descenso, con una positividad del 7% en la SE30, con predominio de influenza A(H3N2) (95,5%). Por su parte SARS-CoV-2 presenta una tendencia al ascenso, alcanzando 12% de positividad en la SE30, mientras que el VSR se mantiene bajo, con una leve tendencia al incremento.
- **Guatemala:** la circulación de influenza permanece estable y bajo el umbral epidémico, con una positividad de 3,7% en la SE30. Predomina la detección de influenza B/Victoria (69,2%), seguida de influenza A(H3N2) (30,8%). El VSR y SARS-CoV-2 presentan un incremento sostenido, con una positividad del 15,7% y 20,1% respectivamente. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.
- **Honduras:** la actividad de influenza presenta una tendencia al ascenso en la última semana, con una positividad de 4,5% en la SE30, aunque se mantiene por debajo del umbral epidémico. Por su parte SARS-CoV-2 mantiene niveles elevados, aunque con tendencia al descenso, con una positividad de 16% en la SE30, luego de alcanzar 20% en la SE29. La actividad de VSR permanece baja y estable.
- **Nicaragua:** la actividad de influenza se mantiene estable con los niveles de transmisibilidad sobre el umbral epidémico y una positividad del 12% en la SE30. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2) (73,8%). La circulación de VSR es elevada, con una positividad cercana al 23,6% en la SE30, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables.
- **Panamá:** La actividad de influenza presenta una tendencia al descenso, con una positividad del 15,7% en la SE30, manteniéndose sobre el umbral epidémico. Por su parte el VSR continúa en ascenso, con una positividad del 32,5%. SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables en las últimas semanas.

Subregión andina: en la subregión la actividad de influenza se mantiene en niveles bajos y estables con una positividad regional de 6,9% en la SE30. Entre las muestras subtipificadas predomina la influenza A(H3N2) (34,4%), con menor circulación de A(H1N1)pdm09 (6,4%). La actividad del VSR permanece elevada, aunque con tendencia descendente, mientras SARS-CoV-2 se mantiene bajo, con una positividad de 2%. Las consultas por ETI y las hospitalizaciones por IRAG muestran una tendencia descendente hacia la SE30.

Por países

- **Bolivia:** la actividad de influenza mostró un incremento durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas con un porcentaje de positividad del 9,3% en la SE30, los niveles de transmisibilidad se ubican bajo el umbral epidémico. Predomina la detección de influenza A(H1N1)pdm09 con el 75%. El VRS muestra una tendencia estable (8,1% en SE30), el SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Colombia:** la actividad de influenza VSR y SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos con tendencia al descenso, con una positividad de 6,3%, 6,6 y 4,8 respectivamente en la SE30. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.
- **Ecuador:** la actividad de influenza continúa baja, aunque con tendencia al ascenso durante la última semana con una positividad de 8,2% en la SE30. En contraste, el VRS mantiene una tendencia descendente sostenida, con una positividad de 27,9% en la SE27 a 16,2% en la SE30. Por su parte, SARS-CoV-2 continúa circulando en niveles bajos con una positividad de 3,5%. La influenza se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.
- **Perú:** la actividad de influenza continúa mostrando una tendencia baja y estable, con una positividad de 6,6 % en la SE30. En contraste, el VRS mantiene una tendencia descendente en las últimas cuatro SE. Por su parte, SARS-CoV-2 continúa se mantiene en niveles bajos de circulación.

Continúa en la siguiente página





Venezuela: la actividad de influenza mostró un incremento durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas, con los niveles de transmisibilidad sobre el umbral epidémico. Predomina la circulación de influenza A(H3N2) con el 54,5%. Por su parte, la circulación de VRS se mantiene en niveles bajos y estables, mientras que el SARS-CoV-2 continua en ascenso alcanzando una positividad de 28,9%.

Brasil y el Cono Sur: la subregión se encuentra en la temporada invernal austral, con un descenso de la actividad de influenza durante las últimas cuatro semanas y una positividad de 10,1% en la SE30. En este periodo predomina la circulación de influenza B con el 58,6%. El VRS acompaña esta tendencia estacional y mantiene una positividad de 13,3% en la SE30. Por su parte, SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. Los indicadores de ETI e IRAG muestran una tendencia descendente en las últimas cuatro semanas.

Por países

- **Argentina:** la actividad de influenza presenta una tendencia descendente durante las últimas cuatro semanas; sin embargo, los niveles de transmisibilidad permanecen sobre el umbral moderado, con una positividad del 12,7% en la SE30. Por su parte la actividad del VRS muestra una tendencia ascendente, alcanzando 14,5% de positividad en la última semana, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables.
- **Brasil:** la actividad de influenza se mantiene en niveles moderados y estables durante las últimas semanas, con una positividad de 7% en la SE30. Predomina la circulación de influenza B, que representa el 85,3% de las muestras subtipificadas. Por su parte, el VRS continúa mostrando una tendencia elevada, alcanzando una positividad de 13,6% en la SE30, mientras que SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.
- **Chile:** la actividad de influenza continúa elevada, aunque con tendencia descendente con una positividad que pasó de 26,9% en la SE27 a 22,4% en la SE30. Predomina la circulación de influenza A no subtipificada, los niveles de transmisibilidad se mantienen por encima del umbral moderado, en concordancia con el incremento observado en los casos ETI. El VSR ha continúa con una tendencia ascendente en las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad de 10,3% en la SE30. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Paraguay:** la actividad de influenza continúa en descenso, con una positividad del 1,8% en la SE30. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), que representa el 77,1% de las muestras subtipificadas, los niveles de transmisibilidad se ubican bajo el umbral estacional. Por su parte, el VRS muestra una tendencia ascendente y alcanzó una positividad de 27,2% en la SE30. SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG.
- **Uruguay:** la actividad de influenza continúa en descenso, con una disminución sostenida de la positividad que alcanzó 11,2% en la SE30. Predomina la circulación de influenza A(H3N2), mientras que los niveles de transmisibilidad se encuentran por debajo del umbral epidémico. Por su parte el VSR continúa en ascenso alcanzando una positividad de 34,5% en la SE30. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG.


Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad







Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América









Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur









SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses


Last 4 EWs / Últimas 4 SE

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Navigation menu / Menú de navegación




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR



EW







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




● ADENO ● Boca ● Corona ● METAPNE... ● PARAINFL... ● RHINO






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWS/Distribucion de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1





ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE y % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE y % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA



SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE





ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID



No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus

No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

