

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026–31

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of Aug 14, 2026/
Datos hasta el 14 de agosto de 2026



Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	USA
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ENG 3	BLZ
Summary/Resumen ESP	CUB
Summary/Resumen ESP 2	DOM
Summary/Resumen ESP 3	HTI
Regional INF	IAM
Regional INF 4 EW/SE	LCA
Regional RSV	SUR
Regional SC-2	BRB
Regional ORV	CYM
Regional SARI-IRAG	GUY
% Positivity/%Positividad	GUY 2
Regional ILI- ETI	VCT
Subregional NAM	Subregional CAM.
Subregional CAR.	SLV
Subregional CAM.	GTM
Subregional AND.	GTM 2
Subregional BSC.	HND
	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/publications/m/item/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation: Across the Region of the Americas, respiratory virus activity remains heterogeneous. Influenza activity is generally low, stable, or declining in most subregions, although elevated or epidemic-level activity persists in selected countries, including Cuba, the Dominican Republic, Nicaragua, Ecuador, and Chile. RSV activity remains low in North America but is elevated or increasing in parts of Central America and the Southern Cone, particularly Panama, Argentina, Chile, and Uruguay, with high positivity also observed in Suriname. SARS-CoV-2 activity remains low or at interseasonal levels in several countries but has increased in parts of North America, the Caribbean, and Central America, with elevated positivity in Mexico, Suriname, Guyana, El Salvador, Guatemala, and Honduras. Overall, ILI and SARI activity is stable or declining in several subregions, although continued monitoring is warranted given localized increases in RSV and SARS-CoV-2 circulation and persistent influenza activity in selected countries.

North America: Influenza activity remains at interseasonal levels across the subregion, with positivity at 0.7%. RSV activity (0.3%) remains low and stable at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 circulation has stabilized at 2.1% positivity following an increase over the previous two EWs. Outpatient influenza-like illness (ILI) and severe acute respiratory infection (SARI) cases continue to decrease, with influenza positivity among SARI cases at 4%. In **Canada**, influenza activity remains low and stable below the epidemic threshold, with positivity at 0.5%. RSV activity remains at interseasonal levels, with positivity at 0.2%. SARS-CoV-2 circulation showed a slight increase over the past two EWs but remains low, with positivity at 1%. Other respiratory virus (ORV) activity continues to decline following a peak four EWs ago, with rhinovirus predominating. In **Mexico**, influenza activity remains stable at interseasonal levels, with positivity at 3.8% and predominance of influenza B. RSV circulation has remained stable over the past four EWs, with positivity at 2%. SARS-CoV-2 activity remains stable but elevated, with positivity at 22%, and increased detection observed among ILI and SARI cases. The proportion of SARI cases admitted to the ICU has increased but remains comparable to levels observed during the same EWs in previous years. In the **United States**, influenza activity remains at interseasonal levels, with positivity at 0.6%. RSV activity remains low and stable, with positivity at 0.4%. SARS-CoV-2 circulation has shown a slow but steady increase over the past six EWs, with positivity at 3%.

Caribbean: Influenza circulation decreased for a second consecutive EW, reaching a positivity of 8.6%, with cocirculation of influenza B and A(H3N2). RSV activity remains stable at a positivity of 5.2%, while SARS-CoV-2 circulation increased over the past two EWs, reaching a positivity of 8.5%.

- **Cuba:** Influenza circulation remains above the epidemic threshold, with a positivity of 22.1% and predominance of influenza A(H3N2). RSV and SARS-CoV-2 activity remain low and stable.
- **Dominican Republic:** Influenza activity maintains an upward trend and remains above the epidemic threshold, with a positivity of 18.6%. RSV and SARS-CoV-2 activity remain low and stable at interseasonal levels.
- **Haiti:** Influenza and SARS-CoV-2 circulation decreased over the past four EWs, while RSV activity remains low and stable.
- **Jamaica:** Influenza activity remains at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 activity is stable, with a positivity of 8.3%.
- **Saint Lucia:** Influenza circulation remains stable but elevated, with a positivity of 11.1%. SARS-CoV-2 activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 5.6%.
- **Suriname:** Influenza circulation remains at interseasonal levels, while RSV activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 47.5%. SARS-CoV-2 circulation decreased compared with the previous EW but remains elevated, with a positivity of 42.5%.
- **Barbados:** Influenza activity decreased compared with the previous EW, reaching a positivity of 1.7%. SARS-CoV-2 circulation also decreased compared with the previous EW, reaching a positivity of 5.3%.
- **Cayman Islands:** Influenza activity continued to decline over the past two EWs, reaching a positivity of 2.1%. RSV and SARS-CoV-2 circulation increased over the same period, reaching positivity of 2.2% and 11.6%, respectively.
- **Guyana:** Influenza activity remains stable, with a positivity of 4.5%. SARS-CoV-2 circulation decreased compared with the previous EW but remains elevated, with a positivity of 14.6%.
- **Saint Vincent and the Grenadines:** Influenza circulation decreased compared with the previous EW but remains elevated, with a positivity of 18.2% and predominance of influenza B. RSV and SARS-CoV-2 activity continue at interseasonal levels.

Continues on the next page





Central America: Influenza activity has remained relatively stable over the past three months, following a steady decline from the peak observed at the beginning of the year. Positivity is currently at 9.8%, with predominance of influenza A(H3N2). RSV activity has remained elevated since mid-July, with a positivity of 19.7%. SARS-CoV-2 circulation increased over the past four EWs, reaching a positivity of 5.9%.

- **El Salvador:** Influenza circulation has maintained a downward trend since early April, reaching a positivity of 6.6% and remaining below the epidemic threshold. RSV activity increased compared with the previous EW but remains at interseasonal levels, with a positivity of 1.8%. SARS-CoV-2 circulation continues an upward trend, reaching a positivity of 22.3%.
- **Guatemala:** Influenza activity remains at interseasonal levels, with a positivity of 4.3%. RSV activity increased over the past three EWs, reaching a positivity of 16.2%, while SARS-CoV-2 activity decreased, reaching a positivity of 17.4%.
- **Honduras:** Influenza circulation increased over the past two EWs but remains at interseasonal levels, with a positivity of 4.5%. RSV activity remains low and stable, while SARS-CoV-2 activity decreased over the past two EWs, reaching a positivity of 13%. However, a corresponding decline in the proportion of SARS-CoV-2 detections among SARI cases has not yet been observed, with positivity remaining at 5.5%.
- **Nicaragua:** Influenza activity remains at epidemic levels, with positivity stable over the past three EWs at around 12.3%. RSV activity decreased over the past two EWs but remains elevated, with a positivity of 20.7%, while SARS-CoV-2 activity increased for a third consecutive EW, reaching a positivity of 3.2%.
- **Panama:** Influenza activity continues a sustained downward trend, reaching a positivity of 14.1%, with predominance of influenza A(H3N2). RSV activity maintains an upward trend, reaching a positivity of 39.8%, with a concurrent increase in RSV detections among ILI cases. SARS-CoV-2 activity increased compared with the previous EW, reaching a positivity of 4.9%.

Andean Subregion: Influenza activity remains stable, with positivity at 6.8% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity continues to decline, although more gradually, with positivity at 8.9%, while SARS-CoV-2 activity remains stable at interseasonal levels, with positivity at 2.9%.

- **Colombia:** Influenza activity remains stable below the epidemic threshold, with a positivity of 6.3% and cocirculation of influenza B and A(H3N2). RSV activity increased compared with the previous EW, reaching a positivity of 7.4%, while SARS-CoV-2 circulation continues to decline, reaching a positivity of 4.0%.
- **Ecuador:** Influenza activity remains at epidemic levels, with a positivity of 7.2% and predominance of influenza B. RSV circulation maintains a downward trend but remains elevated, with a positivity of 14.5%. SARS-CoV-2 circulation remains stable, with a positivity of 3.6%.
- **Peru:** Influenza circulation remains stable below the epidemic threshold, with a positivity of 6.9% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity decreased compared with the previous EW, reaching a positivity of 11.6%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable at interseasonal levels, with a positivity of 0.3%.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity continues to decline after reaching a peak three EWs ago, with a current positivity of 9.8% and predominance of influenza B. RSV circulation decreased slightly over the past two EWs, following a period of increasing activity, with a positivity of 12.7%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with a positivity of 0.7%. SARI cases continue to decline and are predominantly associated with RSV and influenza, with detection proportions of 11% and 5%, respectively.

- **Argentina:** Influenza activity maintains a downward trend following a peak two months ago, with a positivity of 11.1% and cocirculation of influenza B and A(H3N2). RSV activity has continued to increase over the past two months, reaching a positivity of 16.6%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with a positivity of 1.0%.

Continues on the next page



- **Brazil:** Influenza circulation remains stable at interseasonal levels, with a positivity of 6.8% and predominance of influenza B. RSV activity continues a downward trend following a peak two months ago, reaching a positivity of 11.6%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with a positivity of 0.9%.
- **Chile:** Influenza activity maintains a downward trend but remains at moderate levels, reaching a positivity of 20.5%, with cocirculation of influenza B and A(H3N2). RSV activity has continued to increase over the past three months, reaching a positivity of 12.9%, while SARS-CoV-2 circulation remains low and stable, with a positivity of 0.1%. SARI cases remain elevated, with RSV detected in 20% of cases.
- **Paraguay:** Influenza activity continues to decline, reaching interseasonal levels, with a positivity of 2.5% and predominance of influenza A(H3N2). RSV circulation decreased in the most recent EW, reaching a positivity of 28.1%, following a steady increase over the past three months. SARS-CoV-2 activity remains stable at interseasonal levels.
- **Uruguay:** Influenza activity maintains a downward trend, reaching interseasonal levels, with a positivity of 7.5% and predominance of influenza A(H3N2). RSV circulation has continued to increase over the past three months, reaching a positivity of 38.7%, while SARS-CoV-2 activity remains at interseasonal levels, with a positivity of 3.1%.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/programs/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org/).





Situación regional: En la Región de las Américas, la actividad de los virus respiratorios continúa mostrando tendencias heterogéneas. La actividad de influenza es, en general, baja, estable o con tendencia descendente en la mayoría de las subregiones, aunque persiste actividad elevada o en niveles epidémicos en algunos países, incluidos Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Chile. La actividad del VSR se mantiene baja en América del Norte, pero permanece elevada o en aumento en partes de América Central y el Cono Sur, particularmente en Panamá, Argentina, Chile y Uruguay, con una positividad elevada también en Suriname. La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja o en niveles interestacionales en varios países, aunque ha aumentado en partes de América del Norte, el Caribe y América Central, con positivities elevadas en México, Suriname, Guyana, El Salvador, Guatemala y Honduras. En general, la actividad de ETI e IRAG se mantiene estable o en descenso en varias subregiones, aunque se recomienda continuar el monitoreo ante los incrementos localizados en la circulación del VSR y SARS-CoV-2 y la persistencia de actividad de influenza en algunos países.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales en toda la subregión, con una positividad de 0,7%. La actividad del VSR (0,3%) se mantiene baja y estable en niveles interestacionales, mientras que la circulación del SARS-CoV-2 se ha estabilizado, con una positividad de 2,1%, tras el aumento observado durante las dos SE anteriores. Las consultas ambulatorias por enfermedad tipo influenza (ETI) y los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) continúan disminuyendo, con una positividad para influenza de 4% entre los casos de IRAG. En **Canadá**, la actividad de influenza se mantiene baja y estable por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 0,5%. La actividad del VSR se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 0,2%. La circulación del SARS-CoV-2 mostró un ligero aumento durante las últimas dos SE, pero se mantiene baja, con una positividad de 1%. La actividad de otros virus respiratorios (OVR) continúa disminuyendo tras alcanzar un pico hace cuatro SE, con predominio de rinovirus. En **México**, la actividad de influenza se mantiene estable en niveles inter estacionales, con una positividad de 3,8% y predominio de influenza B. La circulación del VSR se ha mantenido estable durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 2%. La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene estable pero elevada, con una positividad de 22%, y se observa un aumento en la detección entre los casos de ETI e IRAG. La proporción de casos de IRAG ingresados en la UCI ha aumentado, pero se mantiene comparable con los niveles observados durante las mismas SE de años anteriores. En los **Estados Unidos**, la actividad de influenza se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 0,6%. La actividad del VSR se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,4%. La circulación del SARS-CoV-2 ha mostrado un aumento lento pero sostenido durante las últimas seis SE, con una positividad de 3%.

Caribe: La circulación de influenza disminuyó por segunda SE consecutiva, alcanzando una positividad de 8,6%, con cocirculación de influenza B y A(H3N2). La actividad del VSR se mantiene estable, con una positividad de 5,2%, mientras que la circulación del SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 8,5%.

- **Cuba:** La circulación de influenza se mantiene por encima del umbral epidémico, con una positividad de 22,1% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR y del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.
- **República Dominicana:** La actividad de influenza mantiene una tendencia ascendente y permanece por encima del umbral epidémico, con una positividad de 18,6%. La actividad del VSR y del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable en niveles inter estacionales.
- **Haití:** La circulación de influenza y SARS-CoV-2 disminuyó durante las últimas cuatro SE, mientras que la actividad del VSR se mantiene baja y estable.
- **Jamaica:** La actividad de influenza se mantiene en niveles inter estacionales, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene estable, con una positividad de 8,3%.
- **Santa Lucía:** La circulación de influenza se mantiene estable pero elevada, con una positividad de 11,1%. La actividad del SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 5,6%.
- **Suriname:** La circulación de influenza se mantiene en niveles inter estacionales, mientras que la actividad del VSR aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 47,5%. La circulación del SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene elevada, con una positividad de 42,5%.

Continúa en la siguiente página





- **Barbados:** La actividad de influenza disminuyó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 1,7%. La circulación del SARS-CoV-2 también disminuyó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 5,3%.
- **Islas Caimán:** La actividad de influenza continuó disminuyendo durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 2,1%. La circulación del VSR y del SARS-CoV-2 aumentó durante el mismo período, alcanzando positivities de 2,2% y 11,6%, respectivamente.
- **Guyana:** La actividad de influenza se mantiene estable, con una positividad de 4,5%. La circulación del SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene elevada, con una positividad de 14,6%.
- **San Vicente y las Granadinas:** La circulación de influenza disminuyó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene elevada, con una positividad de 18,2% y predominio de influenza B. La actividad del VSR y del SARS-CoV-2 se mantiene en niveles inter estacionales.

América Central: La actividad de influenza se ha mantenido relativamente estable durante los últimos tres meses, tras un descenso sostenido desde el pico observado a principios de año. La positividad se sitúa actualmente en 9,8%, con predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR se ha mantenido elevada desde mediados de julio, con una positividad de 19,7%. La circulación del SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 5,9%.

- **El Salvador:** La circulación de influenza ha mantenido una tendencia descendente desde principios de abril, alcanzando una positividad de 6,6% y permaneciendo por debajo del umbral epidémico. La actividad del VSR aumentó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 1,8%. La circulación del SARS-CoV-2 continúa con una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 22,3%.
- **Guatemala:** La actividad de influenza se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 4,3%. La actividad del VSR aumentó durante las últimas tres SE, alcanzando una positividad de 16,2%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 disminuyó, alcanzando una positividad de 17,4%.
- **Honduras:** La circulación de influenza aumentó durante las últimas dos SE, pero se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 4,5%. La actividad del VSR se mantiene baja y estable, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 disminuyó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 13%. Sin embargo, aún no se ha observado una disminución correspondiente en la proporción de detecciones de SARS-CoV-2 entre los casos de IRAG, cuya positividad se mantiene en 5,5%.
- **Nicaragua:** La actividad de influenza se mantiene en niveles epidémicos, con una positividad estable durante las últimas tres SE, alrededor de 12,3%. La actividad del VSR disminuyó durante las últimas dos SE, pero se mantiene elevada, con una positividad de 20,7%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 aumentó por tercera SE consecutiva, alcanzando una positividad de 3,2%.
- **Panamá:** La actividad de influenza continúa con una tendencia descendente sostenida, alcanzando una positividad de 14,1%, con predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR mantiene una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 39,8%, acompañada de un aumento en las detecciones de VSR entre los casos de ETI. La actividad del SARS-CoV-2 aumentó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 4,9%.

Subregión Andina: La actividad de influenza se mantiene estable, con una positividad de 6,8% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR continúa disminuyendo, aunque de manera más gradual, con una positividad de 8,9%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene estable en niveles inter estacionales, con una positividad de 2,9%.

- **Colombia:** La actividad de influenza se mantiene estable por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,3% y cocirculación de influenza B y A(H3N2). La actividad del VSR aumentó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 7,4%, mientras que la circulación del SARS-CoV-2 continúa disminuyendo, alcanzando una positividad de 4,0%.
- **Ecuador:** La actividad de influenza se mantiene en niveles epidémicos, con una positividad de 7,2% y predominio de influenza B. La circulación del VSR mantiene una tendencia descendente, pero permanece elevada, con una positividad de 14,5%. La circulación del SARS-CoV-2 se mantiene estable, con una positividad de 3,6%.

Continúa en la siguiente página



- **Perú:** La circulación de influenza se mantiene estable por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,9% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR disminuyó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 11,6%. La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable en niveles inter estacionales, con una positividad de 0,3%.

Brasil y Cono Sur: La actividad de influenza continúa disminuyendo después de alcanzar un pico hace tres SE, con una positividad actual de 9,8% y predominio de influenza B. La circulación del VSR disminuyó ligeramente durante las últimas dos SE, tras un período de aumento de la actividad, con una positividad de 12,7%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,7%. Los casos de IRAG continúan disminuyendo y están asociados predominantemente con VSR e influenza, con proporciones de detección de 11% y 5%, respectivamente.

- **Argentina:** La actividad de influenza mantiene una tendencia descendente tras alcanzar un pico hace dos meses, con una positividad de 11,1% y cocirculación de influenza B y A(H3N2). La actividad del VSR ha continuado aumentando durante los últimos dos meses, alcanzando una positividad de 16,6%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 1,0%.
- **Brasil:** La circulación de influenza se mantiene estable en niveles inter estacionales, con una positividad de 6,8% y predominio de influenza B. La actividad del VSR continúa con una tendencia descendente tras alcanzar un pico hace dos meses, con una positividad de 11,6%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,9%.
- **Chile:** La actividad de influenza mantiene una tendencia descendente, pero permanece en niveles moderados, alcanzando una positividad de 20,5%, con cocirculación de influenza B y A(H3N2). La actividad del VSR ha continuado aumentando durante los últimos tres meses, alcanzando una positividad de 12,9%, mientras que la circulación del SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,1%. Los casos de IRAG permanecen elevados, con detección de VSR en 20% de los casos.
- **Paraguay:** La actividad de influenza continúa disminuyendo, alcanzando niveles inter estacionales, con una positividad de 2,5% y predominio de influenza A(H3N2). La circulación del VSR disminuyó en la SE más reciente, alcanzando una positividad de 28,1%, tras un aumento sostenido durante los últimos tres meses. La actividad del SARS-CoV-2 se mantiene estable en niveles inter estacionales.
- **Uruguay:** La actividad de influenza mantiene una tendencia descendente, alcanzando niveles inter estacionales, con una positividad de 7,5% y predominio de influenza A(H3N2). La circulación del VSR ha continuado aumentando durante los últimos tres meses, alcanzando una positividad de 38,7%, mientras que la actividad del SARS-CoV-2 se mantiene en niveles inter estacionales, con una positividad de 3,1%.







Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV



● ADENO ● Boca ● Corona ● METAPNEU... ● PARAINFLUE... ● RHINO





Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Last 4 EWs/Últimas 4 SE



Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza

Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE





Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR




EW




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR



ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWS/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbranes PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

casos/casos

casos/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbranes PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE





SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

