

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026–33

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of Aug 28, 2026/
Datos hasta el 28 de agosto de 2026



Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	USA
Summary/Resumen ENG 2	Subregional CAR.
Summary/Resumen ENG 3	BLZ
Summary/Resumen ESP	CUB
Summary/Resumen ESP 2	DOM
Summary/Resumen ESP 3	JAM
Regional INF	LCA
Regional INF 4 EW/SE	BRB
Regional RSV	CYM
Regional SC-2	GUY
Regional ORV	GUY 2
Regional SARI-IRAG	VCT
% Positivity/%Positividad	Subregional CAM.
Regional ILI- ETI	SLV
Subregional NAM	GTM
Subregional CAR.	GTM 2
Subregional CAM.	HND
Subregional AND.	HND 2
Subregional BSC.	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-prevention-and-control/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation: Across the Americas, influenza activity is generally declining or remains at interseasonal levels, although epidemic-level activity persists in Nicaragua, Panama, Ecuador, and Chile. Influenza B predominates in several countries, particularly in the Southern Cone, while A(H3N2) continues to predominate in parts of Central America and the Andean subregion. RSV activity remains elevated in several countries, particularly in Central America and the Southern Cone. Increasing activity is observed in Guatemala, Panama, Colombia, Argentina, and Chile, while particularly high positivity is reported in Paraguay and Uruguay. In contrast, RSV activity is low or declining across much of North America, the Caribbean, and parts of the Andean subregion. SARS-CoV-2 activity remains generally low or stable across North America, the Andean subregion, and the Southern Cone. However, increasing or elevated activity is observed in parts of the Caribbean and Central America, particularly in Belize, Barbados, the Cayman Islands, Mexico, and Nicaragua. Overall, ILI and SARI trends remain stable or declining in most subregions, although SARI activity remains elevated in Chile and Uruguay, largely associated with RSV circulation.

North America: Influenza activity remains at interseasonal levels across the subregion, with positivity at 0.8%. RSV activity also remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 0.2%. SARS-CoV-2 circulation is stable, with positivity at 2.3%, following a small increase in activity last month. In **Canada**, influenza activity remains low and stable below the epidemic threshold, with positivity at 0.6%. RSV activity remains at interseasonal levels, with positivity at 0.1%. SARS-CoV-2 circulation continues to show a slight increase compared with the previous two epidemiological weeks (EWs) but remains low, with positivity at 1.4%. Other respiratory virus (ORV) activity has stabilized following a downward trend, with positivity at 7% and rhinovirus predominating. In **Mexico**, influenza activity increased slightly compared with the previous EW but remains below the epidemic threshold, with positivity at 5.2% and predominance of influenza B (78.5%). RSV circulation has remained stable over the past four EWs, with positivity at 1.7%. SARS-CoV-2 activity decreased compared with the previous EW but remains elevated, with positivity at 20.6%. In the **United States**, influenza activity remains at interseasonal levels, with positivity at 0.9%. RSV and SARS-CoV-2 activity remain low and stable, with positivity at 1.1% and 0.8%, respectively.

Caribbean: Influenza circulation remains stable, with positivity at 10.9% and cocirculation of influenza B (65%) and A(H3N2). RSV activity decreased compared with the previous EW, with positivity at 2.9%, while SARS-CoV-2 circulation continued to increase over the past two EWs, reaching a positivity of 13.3%.

- **Belize:** Influenza activity remains at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 activity has increased in recent weeks, reaching 25% positivity, although based on a small number of samples.
- **Cuba:** Influenza circulation reached interseasonal levels, with positivity at 7.7% and predominance of influenza A(H3N2). RSV and SARS-CoV-2 activity remain low and stable.
- **Dominican Republic:** Influenza activity decreased after a sustained upward trend over the past four EWs, with positivity at 16.7% and predominance of influenza A(H3N2). SARS-CoV-2 activity remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 1.5%.
- **Jamaica:** Influenza and RSV activity remain at interseasonal levels. SARS-CoV-2 activity remains low and stable following a peak approximately one month ago.
- **Saint Lucia:** Influenza and RSV circulation remain elevated, both with positivity at 16.7%. SARS-CoV-2 activity remains at interseasonal levels.
- **Barbados:** Influenza activity continued to increase over the past two EWs, reaching a positivity of 8.7%, with predominance of influenza B. RSV activity remains low, with positivity at 0.7%. SARS-CoV-2 circulation also increased over the past two EWs, reaching a positivity of 21.7%.
- **Cayman Islands:** Influenza activity remained low and stable over the past two EWs, with positivity at 2.7% and predominance of influenza B. RSV circulation decreased compared with the previous EW, with positivity at 1%. SARS-CoV-2 activity maintained a sustained upward trend over the past four EWs, reaching a positivity of 22.9%.
- **Guyana:** Influenza activity decreased compared with the previous EW but remains elevated, with positivity at 14% and predominance of influenza B. RSV circulation remains at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 maintained a sustained downward trend over the past two months, reaching a positivity of 3%.
- **Saint Vincent and the Grenadines:** Influenza circulation increased over the past two EWs, reaching a positivity of 47.2%, although based on a small number of samples. RSV and SARS-CoV-2 activity remain low and stable.

Continues on the next page





Central America: Influenza activity continues to decline following the peak observed at the beginning of the year. Positivity is currently 6.7%, with influenza A(H3N2) predominating. RSV activity maintains an upward trend that intensified two months ago, reaching a positivity of 19%. SARS-CoV-2 circulation has also increased over the past two months, reaching a positivity of 7.8%. However, both ILI and SARI cases continue to decrease.

- **El Salvador:** Influenza circulation reached interseasonal levels. RSV activity remains low and stable, with positivity at 1.8%. SARS-CoV-2 circulation decreased over the past two EWs after potentially reaching a peak, with current positivity at 17.9%.
- **Guatemala:** Influenza activity reached interseasonal levels, with positivity at 0.4%. RSV activity continued to increase over the past six EWs, reaching a positivity of 20.2%, while SARS-CoV-2 activity decreased, reaching a positivity of 13.9%.
- **Honduras:** Influenza circulation continued to decline, reaching interseasonal levels, with positivity at 1.5%. RSV activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 2.4%. SARS-CoV-2 activity continued to decrease over the past four EWs, with positivity at 10.3%. The proportion of SARS-CoV-2 detections among ILI and SARI cases also declined.
- **Nicaragua:** Influenza activity remains at epidemic levels, with positivity at 9.4%. RSV activity remains elevated and stable, with positivity at 21.8%. SARS-CoV-2 activity increased over the past four EWs, reaching a positivity of 7.2%.
- **Panama:** Influenza activity remains stable at epidemic levels, with positivity at 9.3% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity maintains an upward trend, reaching a positivity of 25%, with a concurrent increase in RSV detections among ILI cases. SARS-CoV-2 activity remains stable, with positivity at 4%.

Andean Subregion: Influenza activity remains stable, with positivity at 6.8% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity stabilized following a downward trend, with positivity at 8.9%. SARS-CoV-2 activity increased compared with the previous EW, with positivity at 3.3%.

- **Bolivia:** Influenza activity remains at interseasonal levels but increased compared with the previous EW, reaching a positivity of 5.1%. RSV circulation decreased slightly, reaching a positivity of 8.3%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable.
- **Colombia:** Influenza activity remains below the epidemic threshold, with positivity at 6.6% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity increased over the past four EWs, reaching a positivity of 9%, while SARS-CoV-2 circulation remains at interseasonal levels, with positivity at 4.3%.
- **Ecuador:** Influenza activity remains at epidemic levels, with positivity at 7.8% and predominance of influenza B. RSV circulation maintains a downward trend, with positivity at 10.1%. SARS-CoV-2 circulation remains low and stable, with positivity at 4.5%.
- **Peru:** Influenza circulation remains stable below the epidemic threshold, with positivity at 6.3% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity maintains a downward trend since the end of May, with positivity at 9.3%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 0.2%.
- **Venezuela:** Influenza circulation continues to decline after peaking four weeks ago, with current positivity at 15.4% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity reached interseasonal levels, while SARS-CoV-2 circulation remains stable, with positivity at 8.2%.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity continues to decline after peaking a month ago, with positivity at 8% and predominance of influenza B. RSV circulation remains elevated but stable, with positivity at 12.9%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 0.5%. SARI cases continue to decline, along with the proportion of RSV and influenza detections among SARI cases.

- **Argentina:** The downward trend in influenza activity slowed for the first time in two months, with positivity at 7.9% and predominance of influenza B. RSV activity continued to increase over the past two months, reaching a positivity of 20.3%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 1.0%.
- **Brazil:** Influenza circulation remains at interseasonal levels and continues to decline, with positivity at 5.6% and predominance of influenza B. RSV activity continues a downward trend following a peak two months ago, reaching a positivity of 8.8%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 0.6%.

Continues on the next page





- **Chile:** Influenza activity maintains a downward trend but remains at epidemic levels, with positivity at 14% and cocirculation of influenza B and A(H3N2). RSV activity continued to increase over the past three months, reaching a positivity of 16.6%, while SARS-CoV-2 circulation remains low and stable, with positivity at 0.2%. SARI cases remain elevated, with RSV detected in 22% of cases.
- **Paraguay:** Influenza activity remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 1.9%. RSV circulation remains elevated but stable, with positivity at 26%. SARS-CoV-2 activity remains stable at interseasonal levels.
- **Uruguay:** Influenza activity reached interseasonal levels, with positivity at 2.4%. RSV circulation remains elevated, with positivity at 43.5%, while SARS-CoV-2 activity remains at interseasonal levels, with positivity at 2.5%. SARI cases remain elevated, with RSV detected in 17.2% of cases.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).





Situación regional: En las Américas, la actividad de influenza presenta en general una tendencia descendente o se mantiene en niveles interestacionales, aunque persiste actividad en niveles epidémicos en Nicaragua, Panamá, Ecuador y Chile. La influenza B predomina en varios países, particularmente en el Cono Sur, mientras que A(H3N2) continúa predominando en partes de Centroamérica y la subregión Andina. La actividad del VSR permanece elevada en varios países, particularmente en Centroamérica y el Cono Sur. Se observa un aumento de la actividad en Guatemala, Panamá, Colombia, Argentina y Chile, mientras que Paraguay y Uruguay presentan positivities particularmente elevadas. En contraste, la actividad del VSR es baja o presenta una tendencia descendente en gran parte de América del Norte, el Caribe y algunos países de la subregión Andina. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en general baja o estable en América del Norte, la subregión Andina y el Cono Sur. Sin embargo, se observa actividad elevada o en aumento en algunos países del Caribe y Centroamérica, particularmente en Belice, Barbados, Islas Caimán, México y Nicaragua. En general, las tendencias de ETI e IRAG se mantienen estables o descendentes en la mayoría de las subregiones, aunque la actividad de IRAG permanece elevada en Chile y Uruguay, principalmente asociada con la circulación del VSR.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales en toda la subregión, con una positividad de 0,8%. La actividad del VSR también se mantiene baja y estable en niveles interestacionales, con una positividad de 0,2%. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con una positividad de 2,3%, tras un pequeño aumento de la actividad el mes pasado. En **Canadá**, la actividad de influenza se mantiene baja y estable, por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 0,6%. La actividad del VSR permanece en niveles interestacionales, con una positividad de 0,1%. La circulación de SARS-CoV-2 continúa mostrando un ligero aumento en comparación con las dos (semanas epidemiológicas) SE anteriores, pero se mantiene baja, con una positividad de 1,4%. La actividad de otros virus respiratorios (OVR) se ha estabilizado tras una tendencia descendente, con una positividad de 7% y predominio de rinovirus. En **México**, la actividad de influenza aumentó ligeramente en comparación con la SE anterior, pero se mantiene por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 5,2% y predominio de influenza B (78,5%). La circulación del VSR se ha mantenido estable durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 1,7%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene elevada, con una positividad de 20,6%. En los **Estados Unidos**, la actividad de influenza permanece en niveles interestacionales, con una positividad de 0,9%. La actividad del VSR y SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con positivities de 1,1% y 0,8%, respectivamente.

Caribe: La circulación de influenza se mantiene estable, con una positividad de 10,9% y cocirculación de influenza B (65%) y A(H3N2). La actividad del VSR disminuyó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 2,9%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 continuó aumentando durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 13,3%.

- **Belice:** La actividad de influenza permanece en niveles interestacionales, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 ha aumentado en las últimas semanas, alcanzando una positividad de 25%, aunque con base en un número reducido de muestras.
- **Cuba:** La circulación de influenza alcanzó niveles interestacionales, con una positividad de 7,7% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR y SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.
- **República Dominicana:** La actividad de influenza disminuyó después de una tendencia ascendente sostenida durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 16,7% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable en niveles interestacionales, con una positividad de 1,5%.
- **Jamaica:** La actividad de influenza y VSR permanece en niveles interestacionales. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable tras un pico observado aproximadamente hace un mes.
- **Santa Lucía:** La circulación de influenza y VSR permanece elevada, ambas con una positividad de 16,7%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene en niveles interestacionales.
- **Barbados:** La actividad de influenza continuó aumentando durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 8,7%, con predominio de influenza B. La actividad del VSR se mantiene baja, con una positividad de 0,7%. La circulación de SARS-CoV-2 también aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 21,7%.

Continúa en la siguiente página



- **Islas Caimán:** La actividad de influenza se mantuvo baja y estable durante las últimas dos SE, con una positividad de 2,7% y predominio de influenza B. La circulación del VSR disminuyó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 1%. La actividad de SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia ascendente sostenida durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 22,9%.
- **Guyana:** La actividad de influenza disminuyó en comparación con la SE anterior, pero se mantiene elevada, con una positividad de 14% y predominio de influenza B. La circulación del VSR permanece en niveles interestacionales, mientras que SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia descendente sostenida durante los últimos dos meses, alcanzando una positividad de 3%.
- **San Vicente y las Granadinas:** La circulación de influenza aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 47,2%, aunque con base en un número reducido de muestras. La actividad del VSR y SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.

Centroamérica: La actividad de influenza continúa disminuyendo tras el pico observado a principios de año. La positividad se sitúa actualmente en 6,7%, con predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR mantiene una tendencia ascendente que se intensificó hace dos meses, alcanzando una positividad de 19%. La circulación de SARS-CoV-2 también ha aumentado durante los últimos dos meses, alcanzando una positividad de 7,8%. Sin embargo, tanto los casos de ETI como de IRAG continúan disminuyendo.

- **El Salvador:** La circulación de influenza alcanzó niveles interestacionales. La actividad del VSR se mantiene baja y estable, con una positividad de 1,8%. La circulación de SARS-CoV-2 disminuyó durante las últimas dos SE, después de haber alcanzado posiblemente un pico, con una positividad actual de 17,9%.
- **Guatemala:** La actividad de influenza alcanzó niveles interestacionales, con una positividad de 0,4%. La actividad del VSR continuó aumentando durante las últimas seis SE, alcanzando una positividad de 20,2%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 disminuyó, alcanzando una positividad de 13,9%.
- **Honduras:** La circulación de influenza continuó disminuyendo, alcanzando niveles interestacionales, con una positividad de 1,5%. La actividad del VSR aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 2,4%. La actividad de SARS-CoV-2 continuó disminuyendo durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 10,3%. La proporción de detecciones de SARS-CoV-2 entre los casos de ETI e IRAG también disminuyó.
- **Nicaragua:** La actividad de influenza se mantiene en niveles epidémicos, con una positividad de 9,4%. La actividad del VSR permanece elevada y estable, con una positividad de 21,8%. La actividad de SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 7,2%.
- **Panamá:** La actividad de influenza se mantiene estable en niveles epidémicos, con una positividad de 9,3% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR mantiene una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 25%, con un aumento simultáneo de las detecciones de VSR entre los casos de ETI. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con una positividad de 4%.

Subregión Andina: La actividad de influenza se mantiene estable, con una positividad de 6,8% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR se estabilizó después de una tendencia descendente, con una positividad de 8,9%. La actividad de SARS-CoV-2 aumentó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 3,3%.

- **Bolivia:** La actividad de influenza permanece en niveles interestacionales, aunque aumentó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 5,1%. La circulación del VSR disminuyó ligeramente, alcanzando una positividad de 8,3%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable.
- **Colombia:** La actividad de influenza se mantiene por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,6% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR aumentó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 9%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 permanece en niveles interestacionales, con una positividad de 4,3%.
- **Ecuador:** La actividad de influenza se mantiene en niveles epidémicos, con una positividad de 7,8% y predominio de influenza B. La circulación del VSR mantiene una tendencia descendente, con una positividad de 10,1%. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 4,5%.

Continúa en la siguiente página



- **Perú:** La circulación de influenza se mantiene estable por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,3% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR mantiene una tendencia descendente desde finales de mayo, con una positividad de 9,3%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable en niveles interestacionales, con una positividad de 0,2%.
- **Venezuela:** La circulación de influenza continúa disminuyendo después de alcanzar un pico hace cuatro semanas, con una positividad actual de 15,4% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VSR alcanzó niveles interestacionales, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con una positividad de 8,2%.

Brasil y Cono Sur: La actividad de influenza continúa disminuyendo después de alcanzar un pico hace un mes, con una positividad de 8% y predominio de influenza B. La circulación del VSR permanece elevada pero estable, con una positividad de 12,9%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,5%. Los casos de IRAG continúan disminuyendo, al igual que la proporción de detecciones de VSR e influenza entre los casos de IRAG.

- **Argentina:** La tendencia descendente de la actividad de influenza se desaceleró por primera vez en dos meses, con una positividad de 7,9% y predominio de influenza B. La actividad del VSR continuó aumentando durante los últimos dos meses, alcanzando una positividad de 20,3%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 1,0%.
- **Brasil:** La circulación de influenza permanece en niveles interestacionales y continúa disminuyendo, con una positividad de 5,6% y predominio de influenza B. La actividad del VSR mantiene una tendencia descendente después de alcanzar un pico hace dos meses, con una positividad de 8,8%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,6%.
- **Chile:** La actividad de influenza mantiene una tendencia descendente, pero permanece en niveles epidémicos, con una positividad de 14% y cocirculación de influenza B y A(H3N2). La actividad del VSR continuó aumentando durante los últimos tres meses, alcanzando una positividad de 16,6%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene baja y estable, con una positividad de 0,2%. Los casos de IRAG permanecen elevados, con detección de VSR en 22% de los casos.
- **Paraguay:** La actividad de influenza se mantiene baja y estable en niveles interestacionales, con una positividad de 1,9%. La circulación del VSR permanece elevada pero estable, con una positividad de 26%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene estable en niveles interestacionales.
- **Uruguay:** La actividad de influenza alcanzó niveles interestacionales, con una positividad de 2,4%. La circulación del VSR permanece elevada, con una positividad de 43,5%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permanece en niveles interestacionales, con una positividad de 2,5%. Los casos de IRAG permanecen elevados, con detección de VSR en 17,2% de los casos.


Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS](#) | [Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](https://paho.org).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV



ADENO Boca Corona METAPNEU... PARAINFLUE... RHINO







Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR



EW







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

