

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026–34

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of Sep 04, 2026/
Datos hasta el 04 de Septiembre de 2026

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	MEX 2
Summary/Resumen ENG 2	USA
Summary/Resumen ENG 3	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP	BLZ
Summary/Resumen ESP 2	BRB
Summary/Resumen ESP 3	CUB
Regional INF	CYM
Regional INF 4 EW/SE	DOM
Regional RSV	GUY
Regional SC-2	GUY 2
Regional ORV	HTI
Regional SARI-IRAG	IAM
% Positivity/%Positividad	LCA
Regional ILI- ETI	SUR
Subregional NAM	VCT
Subregional CAR.	Subregional CAM.
Subregional CAM.	SLV
Subregional AND.	GTM
Subregional BSC.	GTM 2
	HND
	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-surveillance-and-response/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





Regional Situation:

In epidemiological week 34, influenza activity in the Region of the Americas continues to trend downward. Low levels of circulation are observed in North America. The Caribbean and Central America continue to show low activity, with positivity rates of 7.1% and 7.6%, respectively. The Andean Region shows a stable trend, with a positivity rate of 5.9%. In contrast, Brazil and the Southern Cone are experiencing a sustained decline in activity, with a positivity rate of 7.8% in EW34. Regionally, influenza B is the predominant virus, accounting for 59.5% of all influenza-positive samples. In the Caribbean and in Brazil and the Southern Cone, influenza type B is the predominant strain detected, while in Central America and the Andean Region, influenza type A is the predominant strain detected. The RSV shows a downward trend at the regional level, except for Central America and Brazil and the Southern Cone, where the positivity rate stands at 16.6% and 11.5%, respectively. Meanwhile, the circulation of SARS-CoV-2 remains stable and at low levels in most subregions, except for the Caribbean and Central America, where the positivity rate reaches 13.9% and 10.2%, respectively. Regarding other respiratory viruses, the trend is upward at the regional level, with rhinovirus being the most detected.

North America: Influenza activity remains low, with a positivity rate below 1% in EW34. Influenza A(H1N1)pdm09 is the predominant strain, accounting for 15.2% of influenza-positive samples. Both SARI and ILI cases remain at low levels. RSV and SARS-CoV-2 levels remain low and stable.

By country

- **Canada:** Influenza activity remains low, with transmissibility levels below the epidemic threshold in EW34; influenza A(H1N1)pdm09 is predominant. RSV circulation remains low and stable, with a positivity rate below 1%, while SARS-CoV-2 activity shows an upward trend with a positivity rate of 1.6%.
- **Mexico:** Influenza and RSV activity is low, with positivity rates of 5.2% and 2.7%, respectively, in EW34, and influenza B/Victoria is the predominant strain (78.5%). Meanwhile, SARS-CoV-2 circulation has shown a downward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 17.69% in EW34. Both SARI and ILI cases remain at low levels.

Caribbean: Influenza activity has shown a downward trend in recent weeks, with a regional positivity rate of 7% in EW34, with influenza B/Victoria predominating (47.1%). The circulation of SARS-CoV-2 has shown an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 13.9% in EW34.

By country

- **Barbados:** Influenza activity has increased, reaching a positivity rate of 8.7% in EW34. Influenza B/Victoria has been predominant over the past four weeks. The SARS-CoV-2 positivity rate remains high (18.2%), while the RSV positivity rate remains low, at less than 1%.
- **Cuba:** Influenza activity remains high, with a positivity rate of 13.2% in EW34. Over the past four weeks, influenza B/Victoria has been predominant (46.7%), followed by influenza A(H1N1)pdm09 (26.7%) and influenza A(H3N2) (26.7%). RSV and SARS-CoV-2 activity remains low, with sporadic detections in recent weeks.
- **Cayman Islands:** Influenza activity shows a low and stable trend. The SARS-CoV-2 positivity rate remains moderate, at around 15.8%, while that of RSV remains low, below 1%.
- **Dominican Republic:** Influenza activity is on a downward trend, with a positivity rate of 6.7% in EW34. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has predominated, followed by influenza B/Victoria. SARS-CoV-2 and RSV positivity rates remain low, with no detections in recent weeks.
- **Guyana:** In recent weeks, there has been a decline in influenza circulation, with a positivity rate of 6.4% in EW34, after reaching levels close to 15% in previous weeks. Influenza B is the predominant strain detected. The positivity rates for RSV and SARS-CoV-2 remain low.

Continues on the next page



Central America: After remaining at moderate levels in previous weeks, the influenza positivity rate decreased to 7.6% in EW34, with influenza A(H3N2) predominating (55.7%). In contrast, the RSV positivity rate remains high, at around 16.6%, while SARS-CoV-2 has recently increased, reaching approximately 10.2%. ILI cases have shown a downward trend in recent months, as have SARI cases, which remain at levels lower than those observed at the beginning of the year.

By country

- **El Salvador:** Influenza circulation remains at low levels, with a positivity rate of 6.5% in EW34, following a downward trend observed in recent weeks. Influenza A(H3N2) has been predominant over the past four weeks (58.3%). The SARS-CoV-2 positivity rate remains around 18.9%, while the RSV positivity rate is low, at nearly 2%.
- **Guatemala:** In recent weeks, low influenza circulation has been observed, with a positivity rate of 6.6% in EW34, while RSV maintains a high positivity rate of 21.3%, accounting for the largest proportion of SARI cases. In the past four weeks, influenza A(H3N2) was the predominant strain detected (58.8%). The SARS-CoV-2 positivity rate remains high, at nearly 13%, although it shows a downward trend compared to previous weeks.
- **Honduras:** Influenza circulation remains low and below the epidemic threshold, with a downward trend in recent weeks. ILI and SARI cases also show a decrease, while the SARS-CoV-2 positivity rate continues to decline, reaching 5.7%.
- **Nicaragua:** Influenza circulation remains low, though above the epidemic threshold, with a positivity rate of 8.9% in EW34. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been the predominant strain detected (59.3%). The SARS-CoV-2 positivity rate has recently increased, reaching 9.8%, while the RSV positivity rate has decreased over the past three weeks, reaching 14.9%.
- **Panama:** Influenza circulation remains around the epidemic threshold, with a positivity rate of 9.5% in EW34. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been the predominant strain detected (46.7%). The RSV positivity rate remains high and is trending upward, reaching 34.7%, while SARS-CoV-2 remains at low levels, around 5.4%.

Andean subregion: In this subregion, influenza circulation is showing a downward trend, with a positivity rate of 5.9%. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) (34.4%) has been the predominant subtype among all subtyped samples. The positivity rate for RSV is declining, while SARS-CoV-2 remains at low levels (3.5%). ILI and SARI cases are also showing a downward trend, consistent with the recent decline in the circulation of influenza and other respiratory viruses.

By country

- **Bolivia:** Influenza circulation remains at low levels, with a positivity rate of 3.2% in EW34, below the epidemic threshold. Over the past four weeks, influenza A(H3N2) been predominant, accounting for 66.7%. The RSV positivity rate continues to decline, reaching 6.5%, while SARS-CoV-2 remains at low levels.
- **Colombia:** Influenza circulation remains at low levels, with a positivity rate of 6% in EW34, below the epidemic threshold; over the past four weeks, influenza A(H3N2) has been predominant. The positivity rate for RSV remains at moderate levels (7%), although it is trending downward, while SARS-CoV-2 is trending upward.
- **Ecuador:** Influenza circulation remains at moderate levels, with a positivity rate of 8.7%—above the epidemic threshold in EW34. Over the past four weeks, undetermined influenza B has predominated (80%). The RSV positivity rate stands at around 7.1%, with a downward trend, while SARS-CoV-2 remains at low levels, close to 2%.
- **Peru:** Influenza activity remains low and stable, with a positivity rate of 6% in EW34. In the last four weeks, untyped influenza A has predominated (76.6%). The RSV positivity rate has also decreased, from levels near 12% to around 7% in EW34, while SARS-CoV-2 remains low (<1%).
- **Venezuela:** Influenza activity has shown a downward trend in recent weeks, with influenza A(H3N2) (58.3%) and B/Victoria (33.3%) predominating.

Continues on the next page



Brazil and the Southern Cone: The subregion is in the Southern Hemisphere winter season, with a decline in influenza activity over the past four weeks and a positivity rate of 7.8% in EW34. During this period, influenza B circulation predominates, accounting for 72.7%. RSV is following this seasonal trend and maintains a positivity rate of 11.5% in EW34. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. SARI cases continue to decline, while ILI cases have shown an upward trend over the past four weeks.

By country

- **Argentina:** Influenza activity has shown a downward trend over the past three weeks; however, in EW34, the positivity rate was 17.6%. Transmission levels remain above the moderate threshold. Meanwhile, RSV activity shows an upward trend, reaching a positivity rate of 20.2% in EP33, while SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.
- **Brazil:** Over the past four epidemiological weeks, a downward trend has been observed in the circulation of influenza and RSV, with positivity rates of 4.5% and 6.4%, respectively, in EPW34. Influenza B is the predominant strain, accounting for 93.2% of influenza-positive samples. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels.
- **Chile:** Influenza activity remains high, though with a downward trend; transmissibility is above the epidemic threshold, with a positivity rate of 13.4% in EW34. Influenza B is the predominant strain. RSV has continued to show an upward trend over the past four weeks, reaching a positivity rate of 17.1% in EW34. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. ILI and SARI cases remain at high levels; RSV remains the primary virus associated with SARI cases, while influenza is more strongly associated with ARI cases.
- **Paraguay:** Influenza and SARS-CoV-2 activity remains low and stable. Meanwhile, RSV shows an upward trend and reached a positivity rate of 27.5% in EW34.
- **Uruguay:** Influenza activity remains below the epidemic threshold. RSV circulation predominates, reaching a positivity rate of 34.3% in EW34. Meanwhile, SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. RSV remains the primary virus associated with SARI cases in the country.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).



Situación regional:

En la semana epidemiológica 34, la actividad de influenza en la Región de las Américas mantiene una tendencia al descenso. En América del Norte se observan bajos niveles de circulación. El Caribe y Centroamérica mantienen una actividad baja, con un porcentaje de positividad del 7,1% y 7,6% respectivamente. La Región Andina presenta una tendencia estable, con una positividad del 5,9%. En contraste, en Brasil y el Cono Sur se registra una disminución sostenida de la actividad, con un porcentaje de positividad del 7,8 en la SE34. A nivel regional, el virus de influenza B es el virus predominante representando el 59,5% del total de muestras positivas para influenza. En el Caribe y Brasil y el Cono Sur predomina la detección de influenza tipo B, mientras que en Centroamérica y la Región Andina predomina la detección de influenza tipo A. El VSR muestra una tendencia descendente a nivel regional a excepción de Centroamérica y Brasil y el Cono Sur donde el porcentaje de positividad alcanza 16,6% y 11,5%. Por su parte, la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable y en niveles bajos en la mayoría de las subregiones a excepción del Caribe y Centroamérica donde alcanza un porcentaje de positividad del 13,9% y 10,2% respectivamente. Con respecto a los otros virus respiratorios la tendencia es al ascenso a nivel regional con predominio de la detección de Rinovirus.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene baja con una positividad inferior al 1 % en la SE34. Predomina la circulación de influenza tipo A(H1N1)pdm09 con el 15,2% de las muestras positivas para influenza. Tanto las hospitalizaciones por IRAG como las consultas por ETI se mantienen en niveles bajos. El VRS y el SARS-CoV-2 se mantienen bajos y estables.

Por país

- **Canadá:** la actividad de influenza permanece baja, con niveles de transmisibilidad que se ubican por debajo del umbral epidémico en la SE34, se observa predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La circulación de VRS continúa baja y estable, con positividad inferior al 1%, mientras que la actividad de y el SARS-CoV-2 presenta una tendencia al aumento con una positividad de 1,6%.
- **México:** la actividad de influenza y VSR es baja con una positividad de 5,2% y 2,7% respectivamente en la SE34 y predominio de influenza B/Victoria (78,5%). Por su parte, SARS-CoV-2 presenta una circulación con tendencia al descenso en las últimas cuatro semanas, alcanzando una positividad del 17,69% en la SE34. Tanto las hospitalizaciones por IRAG como las consultas por ETI se mantienen en niveles bajos.

Caribe: la actividad de influenza presenta una tendencia al descenso durante las últimas semanas, con una positividad regional de 7% en la SE34, con predominio de influenza tipo B/Victoria (47,1%). La circulación de SARS-CoV-2 presenta una tendencia al ascenso durante las últimas 4 semanas alcanzando una positividad del 13,9% en la SE34.

Por país

- **Barbados:** la actividad de influenza muestra un incremento, alcanzando una positividad de 8,7% en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina influenza B/Victoria. La positividad de SARS-CoV-2 se mantiene elevada (18,2%), mientras que la de VRS permanece baja, inferior al 1%.
- **Cuba:** la actividad de influenza se mantiene elevada, con una positividad de 13,2% en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina influenza B/Victoria (46,7%), seguida de influenza A(H1N1)pdm09 (26,7%) e influenza A(H3N2) (26,7%). La actividad de VRS y SARS-CoV-2 se mantiene baja, con detecciones esporádicas en las últimas semanas.
- **Islas Caimán:** la actividad de influenza muestra una tendencia baja y estable. La positividad de SARS-CoV-2 se mantiene moderada, alrededor de 15,8%, mientras que la de VRS permanece baja, inferior al 1%.
- **República Dominicana:** la actividad de influenza muestra una tendencia descendente, con una positividad de 6,7% en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2), seguida de influenza B/Victoria. La positividad de SARS-CoV-2 y VRS se mantiene baja sin detecciones en las últimas semanas.
- **Guyana:** en las últimas semanas se observa un descenso en la circulación de influenza, con una positividad de 6,4% en la SE34, después de alcanzar valores cercanos al 15% en semanas anteriores. Predomina la detección de influenza B. La positividad de VRS y SARS-CoV-2 se mantiene baja.

Continúa en la siguiente página





Centroamérica: después de mantenerse en niveles moderados durante las semanas previas, la positividad de influenza disminuyó a 7,6% en la SE34 con predominio de influenza A(H3N2) (55,7%). En contraste, la positividad de VRS permanece elevada, alrededor de 16,6%, mientras que SARS-CoV-2 muestra un incremento reciente, alcanzando aproximadamente 10,2%. Las consultas por ETI han mostrado una tendencia descendente durante los últimos meses, al igual que las hospitalizaciones por IRAG, que se mantienen en niveles inferiores a los observados al inicio del año.

Por país

- **El Salvador:** la circulación de influenza se mantiene en niveles bajos, con una positividad de 6,5% en la SE34, luego de una tendencia descendente observada en las últimas semanas. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2) (58,3%). La positividad de SARS-CoV-2 se mantiene alrededor del 18,9%, mientras que la de VRS es baja, cercana al 2%.
- **Guatemala:** en las últimas semanas se observa una circulación baja de influenza, con una positividad del 6,6% en la SE34, mientras que el VRS mantiene una positividad elevada con 21,3% representando la mayor proporción de hospitalizaciones por IRAG. En las últimas cuatro semanas predominó la detección de influenza A(H3N2) (58,8%). La positividad de SARS-CoV-2 se mantiene elevada, cercana al 13%, aunque con una tendencia descendente respecto a semanas previas.
- **Honduras:** la circulación de influenza se mantiene baja y por debajo del umbral epidémico, con una tendencia descendente en las últimas semanas. Las consultas por ETI y las hospitalizaciones por IRAG también muestran una disminución, mientras que la positividad por SARS-CoV-2 continúa en descenso alcanzando una positividad del 5,7%.
- **Nicaragua:** la circulación de influenza se mantiene baja, aunque sobre el umbral epidémico, con una positividad de 8,9% en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina la detección de influenza A(H3N2) (59,3%). La positividad de SARS-CoV-2 muestra un incremento reciente, alcanzando 9,8%, mientras que la de VRS ha disminuido en las últimas tres semanas alcanzando 14,9%.
- **Panamá:** la circulación de influenza se mantiene alrededor del umbral epidémico, con una positividad de 9,5% en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina la detección de influenza A(H3N2) (46,7%). La positividad de VRS permanece elevada y con tendencia ascendente alcanzando 34,7%, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos, alrededor del 5,4%.

Subregión andina: en la subregión la circulación de influenza muestra una tendencia descendente, con una positividad de 5,9%. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2) (34,4%) entre el total de muestras subtipificadas. La positividad de VRS está en descenso, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos (3,5%). Las consultas por ETI y las hospitalizaciones por IRAG también muestran una tendencia descendente, en concordancia con la disminución reciente de la circulación de influenza y otros virus respiratorios.

Por país

- **Bolivia:** la circulación de influenza se mantiene en niveles bajos, con una positividad de 3,2% en la SE34, por debajo del umbral epidémico. En las últimas cuatro semanas predomina influenza A(H3N2) con el 66,7%. La positividad de VRS se mantiene en descenso alcanzando 6,5%, mientras que SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos.
- **Colombia:** la circulación de influenza se mantiene en niveles bajos, con una positividad del 6% en la SE34, por debajo del umbral epidémico; en las últimas cuatro semanas se observa predominio de influenza A(H3N2). La positividad de VRS se mantiene en niveles moderados (7%), aunque con tendencia descendente, mientras que SARS-CoV-2 presenta una tendencia al ascenso.
- **Ecuador:** la circulación de influenza se mantiene en niveles moderados, con una positividad de 8,7% por encima del umbral epidémico en la SE34. En las últimas cuatro semanas predomina influenza B no determinada (80%). La positividad de VRS se sitúa alrededor del 7,1%, con tendencia descendente, mientras que SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos, cercana al 2%.
- **Perú:** la actividad de influenza permanece baja y estable, con una positividad del 6% en la SE34. En las últimas cuatro SE predominó influenza A no subtipificada (76,6%). La positividad de VRS también disminuye, desde niveles cercanos al 12% hasta alrededor de 7% en la SE34, mientras que SARS-CoV-2 permanece bajo (<1%).
- **Venezuela:** la actividad de influenza muestra una tendencia descendente en las últimas semanas, con predominio de influenza A(H3N2) (58,3%) y B/Victoria (33,3%).

Continúa en la siguiente página



Brasil y el Cono Sur: la subregión se encuentra en la temporada invernal austral, con un descenso de la actividad de influenza durante las últimas cuatro semanas y una positividad de 7,8% en la SE34. En este periodo predomina la circulación de influenza B con el 72,7%. El VRS acompaña esta tendencia estacional y mantiene una positividad de 11,5% en la SE34. Por su parte, SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. Las hospitalizaciones por IRAG continúan en descenso mientras las consultas por ETI muestran una tendencia al ascenso en las últimas cuatro semanas.

Por país

- **Argentina:** la actividad de influenza presenta una tendencia descendente durante las tres semanas previas; sin embargo, en la SE34 el porcentaje de positividad fue de 17,6%. los niveles de transmisibilidad permanecen sobre el umbral moderado. Por su parte la actividad del VRS muestra una tendencia ascendente, alcanzando 20,2% de positividad en la SE33, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.
- **Brasil:** durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas se observa una tendencia descendente en la circulación de influenza y VRS con porcentajes de positividad de 4,5% y 6,4% respectivamente en la SE34. Predomina la circulación de influenza B, que representa el 93,2% de las muestras positivas para influenza. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables.
- **Chile:** la actividad de influenza continúa elevada, aunque con tendencia descendente, la transmisibilidad se ubica sobre el umbral epidémico con una positividad de 13,4% en la SE34. Predomina la circulación de influenza B. El VSR ha continúa con una tendencia ascendente en las últimas cuatro semanas alcanzando una positividad de 17,1% en la SE34. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables. Las consultas por ETI y las hospitalizaciones por IRAG continúan en niveles elevados; el VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG, mientras que influenza presenta una mayor asociación con los casos de ETI.
- **Paraguay:** la actividad de influenza y SARS-CoV-2 continúa baja y estable. Por su parte, el VRS muestra una tendencia ascendente y alcanzó una positividad de 27,5% en la SE34.
- **Uruguay:** la actividad de influenza continúa bajo el umbral epidémico. Predomina la circulación del VSR alcanzando una positividad de 34,3% en la SE34. Por su parte, SARS-CoV-2 permanece en niveles bajos y estables. El VRS se mantiene como el principal virus asociado a los casos de IRAG en el país.


Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad







Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur






SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas

● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses


Last 4 EWs / Últimas 4 SE

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Navigation menu / Menú de navegación




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



20 (100%)

ORV distribution/Distribución de ORV



EW







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de OVR




● ADENO ● Boca ● Corona ● METAPNE... ● PARAINFL... ● RHINO ▶




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2.



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWS/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE y % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE y % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



ARI cases by EW/casos IRA por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

