

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026–36

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of Sep 18, 2026/
Datos hasta el 18 de septiembre de 2026

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Summary/Resumen ENG 3
Data sources	Subregional NAM
Method.Note ENG	CAN
Method.Note ESP	MEX
Summary/Resumen ENG	MEX 2
Summary/Resumen ENG 2	USA
Summary/Resumen ENG 3	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP	BLZ
Summary/Resumen ESP 2	CUB
Summary/Resumen ESP 3	DOM
Regional INF	HTI
Regional INF 4 EW/SE	JAM
Regional RSV	LCA
Regional SC-2	SUR
Regional ORV	BRB
Regional SARI-IRAG	CYM
% Positivity/%Positividad	GUY
Regional ILI- ETI	GUY 2
Subregional NAM	VCT
Subregional CAR.	Subregional CAM.
Subregional CAM.	CRI
Subregional AND.	SLV
Subregional BSC.	GTM
	GTM 2
	HND
	HND 2
	NIC
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	BOL
	BOL 2
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/publications/m/item/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).



Regional Situation: Respiratory virus activity remained heterogeneous across the Americas. Influenza activity was generally low or at interseasonal levels in North America, Central America, and much of the Andean subregion, while higher activity persisted in parts of South America, with influenza B becoming increasingly prominent during the latter part of the season in several Southern Cone countries. RSV activity remained low in North America and the Caribbean and generally declined or stabilized in Central America and the Andean subregion, although elevated activity persisted in Panama and several Southern Cone countries. SARS-CoV-2 activity remained low and stable across much of South America but continued at higher levels in parts of the Caribbean and Central America, with increasing activity observed in some settings.

North America: Influenza activity remains at interseasonal levels across the subregion, with a slight increase over the past EW, with positivity at 1.4%. RSV activity also remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 0.3%. SARS-CoV-2 circulation increased over the past two EWs, with positivity at 3.1%. In **Canada**, influenza activity remains below the epidemic threshold, with positivity at 1.2% and predominance of influenza A(H1N1)pdm09. RSV activity remains at interseasonal levels, with positivity at 0.2%. SARS-CoV-2 circulation continues to show an upward tendency over the past four EWs, but remains low, with positivity at 2.5%. Other respiratory virus (ORV) activity increased over the past week, with positivity at 7.4%, driven mainly by rhinovirus. In **Mexico**, influenza activity remains stable below the epidemic threshold, with positivity at 6.4% and predominance of influenza B (78.5%). RSV circulation has remained stable over the past four EWs, with positivity at 3.1%. SARS-CoV-2 activity maintains a downward trend over the past month, with positivity at 14.9%. ORVs activity continues to decrease since mid-May, with positivity at 5.3%. In the **United States**, influenza activity remains at interseasonal levels but maintains an upward tendency, with positivity at 2.7%. RSV activity remains low and stable, with positivity at 0.4%, and SARS-CoV-2 circulation decreased compared to the previous EW, with positivity at 4.7%.

Caribbean: Influenza circulation is relatively stable over the last 3 EWs, with positivity at 6.8% and cocirculation of influenza B (65%) and A(H1N1)pdm09. RSV activity remains low and stable, with positivity at 2.6%, while SARS-CoV-2 circulation continues elevated, with a positivity of 15.6%.

- **Belize:** SARS-CoV-2 activity remains elevated, with positivity at 26.4%, although based on a small number of samples.
- **Cuba:** Influenza circulation continues at interseasonal levels, with positivity at 10.8% and cocirculation of influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) and influenza B. SARS-CoV-2 circulation remains at a positivity of 4.2%.
- **Dominican Republic:** Influenza activity decreased after a sustained upward trend over the past four EWs, with positivity at 2.5% and predominance of influenza A(H3N2). SARS-CoV-2 and RSV activity remain low and stable at interseasonal levels.
- **Barbados:** Influenza activity continued to increase over the past two EWs, reaching a positivity of 12.8%, with predominance of influenza B. RSV activity remains low and stable. SARS-CoV-2 circulation continues to increase, reaching a positivity of 24.5%.
- **Cayman Islands:** Influenza activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 6.4%, with predominance of influenza A(H1N1)pdm09. RSV circulation remains low and stable, with positivity at 1.8%. SARS-CoV-2 activity maintained a sustained downward trend over the past four EWs, reaching a positivity of 7.5%.
- **Guyana:** Influenza activity maintained a downward trend, reaching a positivity of 0.7%. RSV circulation remains at interseasonal levels, with a positivity of 0.7%, while SARS-CoV-2 maintained a sustained upward trend over the past two EWs, reaching a positivity of 15.1%.
- **Saint Vincent and the Grenadines:** Influenza circulation increased compared to the previous EW, reaching a positivity of 30%, although based on a small number of samples. RSV activity remains low and stable, while SARS-CoV-2 circulation remains elevated, with positivity at 25%, and cocirculation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B.

Central America: Influenza activity is stable, with positivity around 5.5% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity decreased over the past four EWs, reaching a positivity of 14.1%. SARS-CoV-2 circulation has also decreased over the past two EWs, reaching a positivity of 7%. Both ILI and SARI cases remain low and stable.

- **El Salvador:** Influenza circulation continues at interseasonal levels, with positivity at 5.1% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity remains low and stable, with positivity at 0.6%. SARS-CoV-2 circulation decreased over the past two EWs after potentially reaching a peak, with current positivity at 12.3%.

Continues on the next page



- **Guatemala:** Influenza activity remains at interseasonal levels, with 4.5% positivity and cocirculation of influenza A (H3N2) and influenza B. RSV activity decreased compared to the previous EW, following a sustained increase over the past two months, with positivity at 16.9%. SARS-CoV-2 activity has declined since mid-July, reaching a positivity of 8.6%.
- **Honduras:** Influenza circulation remains at interseasonal levels, with positivity at 2.3%. RSV activity decreased over the past two EWs, with positivity falling below 1%. SARS-CoV-2 activity has continued to decline over the past four EWs, reaching 2.5% positivity after peaking approximately two months ago. The proportion of SARS-CoV-2 detections among ILI and SARI cases also declined.
- **Nicaragua:** Influenza activity declined compared to the previous two EWs, but remains at epidemic levels, with positivity at 6.5% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity continues to decline after peaking about two months ago, with positivity at 7.8%. SARS-CoV-2 activity declines compared to the previous EW, with positivity at 8.7%.
- **Panama:** Influenza activity remains stable at interseasonal levels, with positivity at 5.7% and predominance of influenza B. RSV activity continues with an upward trend over the past 5 months, reaching a positivity of 27.6%, with a concurrent increase in RSV detections among SASRI cases. SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 1.2%.

Andean Subregion: Influenza activity is stable, with positivity at 5.6% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity stabilized following a downward trend, with positivity at 5.5%. SARS-CoV-2 activity is low and stable, with positivity at 3%.

- **Bolivia:** Influenza activity remains at interseasonal levels, with positivity at 3.9%. RSV circulation increased over the past two EWs but has remained relatively stable overall during the past four months, with positivity at 8.9%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable.
- **Colombia:** Influenza activity remains below the epidemic threshold, with positivity at 5.2% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity remains at 5.6% positivity over the past two EWs. SARS-CoV-2 circulation decreased compared to the previous EW, with positivity at 4.6%.
- **Ecuador:** Influenza activity remains at epidemic levels and continues to increase, reaching a positivity of 14.7%. The season has been prolonged, driven primarily by influenza B circulation. RSV activity declined over the past two months and has stabilized over the past two EWs, with positivity at 7.7%. SARS-CoV-2 activity increased over the past two EWs, reaching a positivity of 4.1%.
- **Peru:** Influenza circulation remains stable below the epidemic threshold, with positivity at 5.3% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity maintains a downward trend since the end of May, with positivity at 4.9%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable at interseasonal levels, with positivity at 0.4%. Although ILI and SARI cases have decreased over the past several weeks, driven by declining RSV circulation, influenza prevalence among ILI cases remains at 20%.
- **Venezuela:** Influenza activity reached epidemic levels, with positivity at 24.1% and predominance of influenza A(H3N2). RSV activity remains elevated, with positivity at 7.3%, while SARS-CoV-2 circulation remains low and stable, with positivity at 1.2%.

Brazil and the Southern Cone: The downward trend in influenza activity observed over the past three months has halted over the past three weeks, associated with increased influenza B circulation, with positivity at 8.1%. RSV circulation remains elevated but continues to decline gradually, with positivity at 11.3%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 0.6%. SARI cases continue to decline, along with the proportion of RSV and influenza detections among SARI cases.

- **Argentina:** After an early and intense influenza season, characterized by a predominance of influenza A(H3N2) and a peak in late May, activity is showing a second peak associated with increasing influenza B circulation. Influenza activity has risen steadily over the past month to moderate levels, with positivity at 15.6%. Despite the recent increase in influenza activity, SARI cases associated with influenza have not increased. RSV activity decreased compared with the previous EW, when activity reached its highest level of the season to date, with positivity currently at 19.8%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 1.5%.

Continues on the next page





- **Brazil:** Influenza season has been characterized by prolonged, moderate circulation rather than a single pronounced peak. Following an early period dominated by influenza A(H3N2), influenza B circulation increased during the latter part of the season and contributed to sustained activity. Influenza positivity is currently 4.4%, corresponding to interseasonal levels. RSV activity continues a downward trend over the past two months, reaching a positivity of 4.9%, while SARS-CoV-2 activity remains low and stable, with positivity at 0.7%.
- **Chile:** Influenza activity continues to decline but remains at epidemic levels and above the average curve. Influenza B circulation has increased during the latter part of the season, with overall influenza positivity at 11.7%. RSV activity remains elevated, with positivity reaching 17.8%, the highest level observed this season. SARS-CoV-2 circulation remains low and stable, with positivity at 0.1%. SARI cases remain elevated, with RSV detected in 18% of cases.
- **Paraguay:** Influenza activity reached interseasonal levels and remains low and stable, with positivity at 1.9%. The season was predominantly driven by influenza A(H3N2), although influenza B predominated over the past four EWs. RSV circulation continues elevated but with a sustained downward trend over the past six EWs, with positivity at 16%. SARS-CoV-2 activity remains low and stable.
- **Uruguay:** Influenza activity reached interseasonal levels, with positivity at 2.1%, following a season predominantly driven by influenza A(H3N2). RSV circulation remains elevated, with positivity at 39.6% and no clear trend. SARS-CoV-2 activity remains at interseasonal levels, with positivity at 2.9%. SARI cases remain elevated, with RSV detected in 16.6% of cases.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).



Situación regional: La actividad de los virus respiratorios se mantuvo heterogénea en la Región de las Américas. La actividad de influenza fue, en general, baja o se mantuvo en niveles interseasonales en América del Norte, Centroamérica y gran parte de la subregión Andina, mientras que persistieron niveles más elevados de actividad en algunas zonas de América del Sur, con un aumento de la circulación de influenza B durante la segunda parte de la temporada en varios países del Cono Sur. La actividad del VRS se mantuvo baja en América del Norte y el Caribe, y en general disminuyó o se estabilizó en Centroamérica y la subregión Andina, aunque persistió una actividad elevada en Panamá y varios países del Cono Sur. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable en gran parte de América del Sur, pero continuó en niveles más elevados en algunas zonas del Caribe y Centroamérica, con aumentos de la actividad en algunos países.

América del Norte: La actividad de influenza se mantiene en niveles interseasonales en toda la subregión, con un ligero aumento durante la última SE y una positividad de 1,4%. La actividad del VRS también se mantiene baja y estable en niveles interseasonales, con una positividad de 0,3%. La circulación de SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas dos SE, con una positividad de 3,1%. En **Canadá**, la actividad de influenza permanece por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 1,2% y predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La actividad del VRS se mantiene en niveles interseasonales, con una positividad de 0,2%. La circulación de SARS-CoV-2 continúa mostrando una tendencia ascendente durante las últimas cuatro SE, aunque permanece en niveles bajos, con una positividad de 2,5%. La actividad de otros virus respiratorios aumentó durante la última semana, con una positividad de 7,4%, impulsada principalmente por rinovirus. En **México**, la actividad de influenza permanece estable y por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,4% y predominio de influenza B (78,5%). La circulación del VRS se ha mantenido estable durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 3,1%. La actividad de SARS-CoV-2 mantiene una tendencia descendente durante el último mes, con una positividad de 14,9%. La actividad de otros virus respiratorios continúa disminuyendo desde mediados de mayo, con una positividad de 5,3%. En **Estados Unidos**, la actividad de influenza permanece en niveles interseasonales, aunque mantiene una tendencia ascendente, con una positividad de 2,7%. La actividad del VRS permanece baja y estable, con una positividad de 0,4%, y la circulación de SARS-CoV-2 disminuyó con respecto a la SE anterior, con una positividad de 4,7%.

Caribe: La circulación de influenza se ha mantenido relativamente estable durante las últimas tres SE, con una positividad de 6,8% y cocirculación de influenza B (65%) e influenza A(H1N1)pdm09. La actividad del VRS permanece baja y estable, con una positividad de 2,6%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 continúa elevada, con una positividad de 15,6%.

- **Belice:** La actividad de SARS-CoV-2 permanece elevada, con una positividad de 26,4%, aunque basada en un número reducido de muestras.
- **Cuba:** La circulación de influenza continúa en niveles interseasonales, con una positividad de 10,8% y cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene con una positividad de 4,2%.
- **República Dominicana:** La actividad de influenza disminuyó después de una tendencia ascendente sostenida durante las últimas cuatro SE, con una positividad de 2,5% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad de SARS-CoV-2 y VRS permanece baja y estable, en niveles interseasonales.
- **Barbados:** La actividad de influenza continuó aumentando durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 12,8%, con predominio de influenza B. La actividad del VRS permanece baja y estable. La circulación de SARS-CoV-2 continúa aumentando, alcanzando una positividad de 24,5%.
- **Islas Caimán:** La actividad de influenza aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 6,4%, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La circulación del VRS permanece baja y estable, con una positividad de 1,8%. La actividad de SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia descendente sostenida durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 7,5%.
- **Guyana:** La actividad de influenza mantuvo una tendencia descendente, alcanzando una positividad de 0,7%. La circulación del VRS permanece en niveles interseasonales, con una positividad de 0,7%, mientras que SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia ascendente sostenida durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 15,1%.

Continúa en la siguiente página



- **San Vicente y las Granadinas:** La circulación de influenza aumentó en comparación con la SE anterior, alcanzando una positividad de 30%, aunque basada en un número reducido de muestras. La actividad del VRS permanece baja y estable, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 permanece elevada, con una positividad de 25%, y cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B.

Centroamérica: La actividad de influenza permanece estable, con una positividad de alrededor de 5,5% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS disminuyó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 14,1%. La circulación de SARS-CoV-2 también disminuyó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 7%. Tanto los casos de ETI como de IRAG permanecen bajos y estables.

- **El Salvador:** La circulación de influenza continúa en niveles interseasonales, con una positividad de 5,1% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS permanece baja y estable, con una positividad de 0,6%. La circulación de SARS-CoV-2 disminuyó durante las últimas dos SE después de haber alcanzado posiblemente un pico, con una positividad actual de 12,3%.
- **Guatemala:** La actividad de influenza permanece en niveles interseasonales, con una positividad de 4,5% y cocirculación de influenza A(H3N2) e influenza B. La actividad del VRS disminuyó con respecto a la SE anterior, después de un aumento sostenido durante los últimos dos meses, con una positividad de 16,9%. La actividad de SARS-CoV-2 ha disminuido desde mediados de julio, alcanzando una positividad de 8,6%.
- **Honduras:** La circulación de influenza permanece en niveles interseasonales, con una positividad de 2,3%. La actividad del VRS disminuyó durante las últimas dos SE, con una positividad inferior a 1%. La actividad de SARS-CoV-2 ha continuado disminuyendo durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 2,5% después de un pico observado aproximadamente dos meses atrás. La proporción de detecciones de SARS-CoV-2 entre los casos de ETI e IRAG también disminuyó.
- **Nicaragua:** La actividad de influenza disminuyó en comparación con las dos SE anteriores, pero permanece en niveles epidémicos, con una positividad de 6,5% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS continúa disminuyendo después de alcanzar un pico hace aproximadamente dos meses, con una positividad de 7,8%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuyó con respecto a la SE anterior, con una positividad de 8,7%.
- **Panamá:** La actividad de influenza permanece estable en niveles interseasonales, con una positividad de 5,7% y predominio de influenza B. La actividad del VRS mantiene una tendencia ascendente durante los últimos cinco meses, alcanzando una positividad de 27,6%, con un aumento concomitante de las detecciones de VRS entre los casos de IRAG. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 1,2%.

Subregión Andina: La actividad de influenza permanece estable, con una positividad de 5,6% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS se estabilizó después de una tendencia descendente, con una positividad de 5,5%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 3%.

- **Bolivia:** La actividad de influenza permanece en niveles interseasonales, con una positividad de 3,9%. La circulación del VRS aumentó durante las últimas dos SE, pero se ha mantenido relativamente estable en general durante los últimos cuatro meses, con una positividad de 8,9%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable.
- **Colombia:** La actividad de influenza permanece por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 5,2% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS se mantiene con una positividad de 5,6% durante las últimas dos SE. La circulación de SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con la SE anterior, con una positividad de 4,6%.
- **Ecuador:** La actividad de influenza permanece en niveles epidémicos y continúa aumentando, alcanzando una positividad de 14,7%. La temporada se ha prolongado, impulsada principalmente por la circulación de influenza B. La actividad del VRS disminuyó durante los últimos dos meses y se ha estabilizado durante las últimas dos SE, con una positividad de 7,7%. La actividad de SARS-CoV-2 aumentó durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 4,1%.

Continúa en la siguiente página





- **Perú:** La circulación de influenza permanece estable por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 5,3% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS mantiene una tendencia descendente desde finales de mayo, con una positividad de 4,9%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, en niveles interseasonales, con una positividad de 0,4%. Aunque los casos de ETI e IRAG han disminuido durante las últimas semanas, impulsados por la disminución de la circulación del VRS, la prevalencia de influenza entre los casos de ETI permanece en 20%.
- **Venezuela:** La actividad de influenza alcanzó niveles epidémicos, con una positividad de 24,1% y predominio de influenza A(H3N2). La actividad del VRS permanece elevada, con una positividad de 7,3%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 1,2%.

Brasil y Cono Sur: La tendencia descendente de la actividad de influenza observada durante los últimos tres meses se interrumpió durante las últimas tres semanas, asociada con un aumento de la circulación de influenza B, con una positividad de 8,1%. La circulación del VRS permanece elevada, aunque continúa disminuyendo gradualmente, con una positividad de 11,3%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 0,6%. Los casos de IRAG continúan disminuyendo, al igual que la proporción de detecciones de VRS e influenza entre los casos de IRAG.

- **Argentina:** Después de una temporada de influenza temprana e intensa, caracterizada por el predominio de influenza A(H3N2) y un pico a finales de mayo, actualmente se observa un segundo pico asociado con el aumento de la circulación de influenza B. La actividad de influenza ha aumentado de manera sostenida durante el último mes hasta alcanzar niveles moderados, con una positividad de 15,6%. A pesar del reciente aumento de la actividad de influenza, los casos de IRAG asociados con influenza no han aumentado. La actividad del VRS disminuyó en comparación con la SE anterior, cuando alcanzó su nivel más alto de la temporada hasta la fecha, con una positividad actual de 19,8%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 1,5%.
- **Brasil:** La temporada de influenza se ha caracterizado por una circulación prolongada y moderada, en lugar de un único pico pronunciado. Tras un período inicial dominado por influenza A(H3N2), la circulación de influenza B aumentó durante la última parte de la temporada y contribuyó a mantener la actividad. La positividad de influenza es actualmente de 4,4%, correspondiente a niveles interseasonales. La actividad del VRS continúa mostrando una tendencia descendente durante los últimos dos meses, alcanzando una positividad de 4,9%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 0,7%.
- **Chile:** La actividad de influenza continúa disminuyendo, pero permanece en niveles epidémicos y por encima de la curva promedio. La circulación de influenza B ha aumentado durante la última parte de la temporada, con una positividad general de influenza de 11,7%. La actividad del VRS permanece elevada, con una positividad de 17,8%, el nivel más alto observado esta temporada. La circulación de SARS-CoV-2 permanece baja y estable, con una positividad de 0,1%. Los casos de IRAG permanecen elevados, con detección de VRS en 18% de los casos.
- **Paraguay:** La actividad de influenza alcanzó niveles interseasonales y permanece baja y estable, con una positividad de 1,9%. La temporada estuvo predominantemente impulsada por influenza A(H3N2), aunque influenza B predominó durante las últimas cuatro SE. La circulación del VRS continúa elevada, pero mantiene una tendencia descendente sostenida durante las últimas seis SE, con una positividad de 16%. La actividad de SARS-CoV-2 permanece baja y estable.
- **Uruguay:** La actividad de influenza alcanzó niveles interseasonales, con una positividad de 2,1%, después de una temporada predominantemente impulsada por influenza A(H3N2). La circulación del VRS permanece elevada, con una positividad de 39,6% y sin una tendencia clara. La actividad de SARS-CoV-2 permanece en niveles interseasonales, con una positividad de 2,9%. Los casos de IRAG permanecen elevados, con detección de VRS en 16,6% de los casos.


Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad







Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América



Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América



Caribbean/Caribe




Central America/Centro América









Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2







New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV



ADENO Boca Corona METAPNEU... PARAINFLUE... RHINO




Navigation menu/Menú de navegación






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs/Últimas 4 SE

Pathog... ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV



EW







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de OVR






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWS/Distribucion de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE

No + samples/Nº muestras +

Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA



SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA



SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE





ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

