INMUNIZACIÓN INTEGRAL (CIM)

Consideraciones previas a la formulación de recomendaciones sobre el uso de vacunas contra el chikungunya

Organización Panamericana de la Salud 2026

OPS Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

Pan American Health Organization

World Health Organization
Americas Region

Consideraciones previas a la formulación de recomendaciones sobre el uso de vacunas contra el chikungunya

La Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de su Grupo Asesor Estratégico en Enfermedades Prevenibles por Vacunación, observa que se requiere evidencia e información adicionales antes de que puedan desarrollarse recomendaciones sobre el uso de vacunas contra el chikungunya. Por lo tanto, deberían abordarse las siguientes brechas:

- Desempeño y seguridad de las vacunas: los brotes en las Américas también afectan a lactantes y niños pequeños. Se requiere evidencia adicional sobre inmunogenicidad, seguridad, eficacia, efectividad y seguridad poscomercialización en niños menores de 12 años, así como sobre la protección frente a las cepas del virus chikunguña que circulan en la Región. Es necesario continuar generando evidencia posterior a la autorización, incluido el monitoreo de seguridad a gran escala, para abordar estas brechas y caracterizar mejor la seguridad de la vacuna a la luz de los recientes informes de eventos adversos graves.

- Epidemiología en las Américas: dado que existen indicios de que los patrones de la enfermedad podrían diferir de los tradicionalmente descritos, se alienta a los países a realizar estudios epidemiológicos y secuenciación genómica completa de los virus chikunguña que circulan en las Américas, con el fin de caracterizar mejor la dinámica de transmisión y la carga de la enfermedad en la Región.

- Caracterización clínica: se alienta a los países a recopilar, analizar y publicar datos clínicos para caracterizar mejor los patrones de enfermedad y los desenlaces según edad. Se necesita mejorar la comprensión de las manifestaciones clínicas del chikungunya, particularmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, lactantes y niños.