

NEUMOCOCO



El dato

En los países de bajos y medios ingresos **LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS** como las Neumonías Adquiridas en la Comunidad (NAC) son las **PRINCIPALES CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN Y MUERTE** en los niños **MENORES DE 5 AÑOS**.



La enfermedad

- > El neumococo (*Streptococcus pneumoniae*) es una bacteria que causa neumonía, meningitis y septicemia.
- > El neumococo es el principal agente que causa las meningitis bacterianas en la Región.
- > Entre las causas de muertes por infecciones neumocócicas, la neumonía representa 81% y la meningitis 12%.



Transmisión

De persona a persona mediante la saliva y gotitas respiratorias.



Síntomas

Dependen de la enfermedad que cause el neumococo y de la edad:

NEUMONÍA

Menores de 5 años

- > Fiebre
- > Respiración rápida
- > Retracción de la pared torácica inferior
- > Sibilancia (aunque más común en las infecciones virales)
- > Tos y/o dificultad para respirar

Bebés, además de esos síntomas, pueden presentar:

- > Convulsiones
- > Disminución del apetito o incapacidad para mamar o beber
- > Hipotermia
- > Pérdida de consciencia
- > Quejido respiratorio

LOS BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS son más susceptibles a infectarse. Este riesgo vuelve aumentar en los **ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS**.

Otras condiciones como, el hacinamiento, la exposición al humo del tabaco y las infecciones seguidas de las vías respiratorias aumentan la susceptibilidad a esta enfermedad.

MENINGITIS

>1 y adultos

- > Alteración del estado de conciencia
- > Convulsiones
- > Dolor de cabeza
- > Estado somnoliento, confuso
- > Fiebre
- > Intolerancia a la luz
- > Rigidez de nuca
- > Signos prominentes de hiperactividad
- > Vómitos en proyectil (explosivos)

<1 año

- > Abombamiento en la parte superior de la cabeza (fontanela)
- > Convulsiones
- > Disminución del apetito o incapacidad para mamar o beber
- > Fiebre
- > Irritabilidad sin otra justificación
- > Estado somnoliento
- > Vómitos



Vacunas

- > 37 países y territorios de la región usan la vacuna contra el neumococo (PCV por sus siglas en inglés).
- > Hay 2 vacunas que se usan en la región dependiendo del número de serotipos (PCV10 y PCV13).
- > Una no es mejor que la otra.

CONSULTA CON TU PROVEEDOR DE SALUD PARA VER CUÁL VACUNA USA TU PAÍS.



Calendario

Esquema 1

- > 2 meses (1era dosis)
- > 4 meses (2da dosis)
- > entre 12-24 meses (3era dosis)

Esquema 2

- > 2 meses (1era dosis)
- > 4 meses (2da dosis)
- > 6 meses (3era dosis)