

# Distribución de casos PFA por clasificación final, por país, 2018

País	Pendiente de Clasificación	Poliovirus derivado de la vacuna	Polio asociado a la vacuna	Compatible con polio	Descartado	Total de casos reportados
<b>Antigua &amp; Barbuda</b>					1	1
<b>Argentina</b>	1	1			197	199
<b>Bolivia</b>	1				45	46
<b>Brasil</b>				1	500	501
<b>Chile</b>					64	64
<b>Colombia</b>		1			167	168
<b>Costa Rica</b>					16	16
<b>Cuba</b>					27	27
<b>República Dominicana</b>					15	15
<b>Ecuador</b>	18				21	39
<b>El Salvador</b>	1				41	42
<b>Guatemala</b>	2				56	58
<b>Guyana</b>					2	2
<b>Haití</b>	6				3	9
<b>Honduras</b>					50	50
<b>México</b>					705	705
<b>Nicaragua</b>					19	19
<b>Panamá</b>					16	16
<b>Paraguay</b>					36	36
<b>Perú</b>	13				64	77
<b>Trinidad &amp; Tobago</b>					1	1
<b>Uruguay</b>	2				2	4
<b>Venezuela</b>	15		2		68	85
<b>Región</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2116</b>	<b>2180</b>

Fuente: PESS, ISIS e informes de los países.  
 Datos de la semana epidemiológica 1 a 52, 2018  
 Todos los datos al 20 de mayo del 2019



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas