

Distribución de casos PFA por clasificación final, por país, últimas 52 semanas (2018/45 – 2019/44)

País	Total de casos reportados	Descartado	Compatible con polio	Poliovirus derivado de la vacuna (VDPV)	Polio paralítico asociado a la vacuna (VAPP)	Pendiente de clasificación
Anguila	1	1				0
Argentina	155	135				20
Belice	4	4				0
Bolivia	23	13				10
Brasil	315	254	1			60
Chile	56	52				4
Colombia	90	90				
Costa Rica	6	5				1
Cuba	20	11				9
República Dominicana	16	13				3
Ecuador	38	33				5
El Salvador	32	27				5
Guatemala	49	43				6
Guyana	3	3				
Haití	8					8
Honduras	50	43				7
Jamaica	1	1				
México	816	806				10
Nicaragua	30	22				8
Panamá	5	3				2
Paraguay	28	23				5
Perú	99	68				31
San Vicente y las Granadinas	1	1				
Surinam	1	1				
Trinidad & Tobago	1	1				
Uruguay	9	5				4
Venezuela	88	30	1		1	56
Región	1945	1688	2	-	1	254

Fuente: PESS, ISIS e informes de los países.
 Todos los datos al 2 de noviembre del 2019. Todas las edades.